

3. OBJEKTSKATALOG



METODIK FÖR NATURVÄRDES- INVENTERING

Naturvärdesinventering är en metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer som har en positiv betydelse för den biologiska mångfalden. Syftet har varit att identifiera områden med särskilda värden för den biologiska mångfalden. Metoden är utarbetad efter samma principer och riktlinjer som gäller för naturvårdsverkets, länsstyrelsens och Skogsstyrelsens inventeringar av t ex ängs- och hagmarker och nyckelbiotoper, och den är anpassad så att resultat från dessa inventeringar kan vägas in.

Naturvärdesinventeringen till detta naturvårdsprogram avser endast landmiljöer. Rena vattenmiljöer har inte inventerats eller bedömts. Ett urval av vattenmiljöer i kommunen som bedöms vara särskilt värdefulla finns dock kortfattat beskrivna på sidan 19. Mot bakgrund av vattnets betydelse för biologisk mångfald och den stora förlust av våtmarker som skett genom tidigare utdikningar bör majoriteten vattenmiljöer förutsättas ha påtagligt naturvärde eller högre (se klasser nedan).

Arbetet inleddes med insamling och genomgång av befintligt underlagsmaterial, kontakter med föreningar/organisationer och studier av flygbilder. Ett grundläggande dokument i arbetet har tidigare naturvårdsplan (Hörby kommun, 2001) varit där nästan samtliga tidigare objekt har fältbesökts och bedömts. Tidigare inventeringsrapporter, sammanställningar och inte minst uppgifter från ArtDatabanken har också varit mycket viktiga i arbetet. Till värdefulla underlag hör även data från äng- och betesmarksinventeringen (TUVÅ, Jordbruksverket), nyckelbiotopsinventeringen (Skogsstyrelsen) samt information från naturskyddsföreningen och andra naturvårdskunniga.

En sak som framkom vid genomgången och insamling av uppgifter var att flertalet av de 109 objekten i naturvårdsplanen var stora och de flesta kunde delas upp i mindre, mer avgränsade objekt. Några nya objekt upptäcktes också och bedömdes ha höga värden. Arbetet resulterade efter genomgång i nya gränsdragningar och tillägg av nya områden att 215 objekt ansågs värdefulla. Flertalet objekt inventerades under 2018, 2019 och 2020. Under 2018 inventerades dels alla nyupptäckta men även några gamla objekt. De flesta objekten med ändrad gränsdragning inventerades 2019. Sommaren 2020 besöktes ca 30 objekt för en översiktlig dokumentation. Samtliga 215 objekt bedömdes ha påtagligt naturvärde eller högre, dvs. naturvärdesklass 1–3, och finns presenterade i objektsdelen i detta naturvårdsprogram.

I samband med fältinventeringen har så kallade naturvårdsarter eftersökts och noterats. Totalt har ca 2 700 registreringar gjorts i Artportalen fördelat på närmare 300 arter varav en övervägande del var naturvårdsarter och nästan 100 rödlistade. Med naturvårdsarter avses här sådana arter som upptas i Artskyddsförordningen (bland fåglar i huvudsak rödlistade och minskande arter), rödlistade arter (ArtDatabanken, 2015), signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000) och andra arter som bedöms indikera hög biologisk mångfald. De naturvårdsarter som hittats vid fältinventeringarna har markerats med en asterisk (*). Rödlistade arter presenteras med kategorier (se sidan 10). I vissa fall har även en hög artrikedom för en artgrupp vägts in i objektets artvärde.

Utöver förekomst av naturvårdsarter har även värdefulla förutsättningar, strukturer och element som gamla träd, multnande ved, markfuktighet, kontinuitet, hävdstatus varit viktiga vid bedömningen av ett objekts biotopkvalité och naturvärde. I förekommande fall har även biotopers sällsynthet i kommunen och hot ingått i bedömningen av biotopvärdet för ett objekt. Samtliga objekt som presenteras i naturvårdsprogrammet har besökts och flertalet har fältinventerats. Själva bedömningen i naturvärdesklasser följer i huvudsak Svensk Standard (SS 199000:2014), där objekt värderas i tre klasser utifrån artvärde och biotopvärde.

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1.

Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2.

Stor positiv betydelse för biologisk mångfald.

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3.

Påtagligt positiv betydelse för biologisk mångfald.

Det måste också framhållas att trots omfattande underökningar och inventeringar är det högst sannolikt att det finns ytterligare områden som väntar på att bli upptäckta, något som man måste vara införstådd med vid planering och annan användning av programmet. För att resultatet enklare ska kunna användas i den kommunala planeringen finns respektive objekt inlagt i GIS tillsammans med en kortfattad information.

Förklaring till objektsbeskrivningar

Objektsnummer: Löpande beteckningar ges stegvis från väster till öster, norr till söder.

Objektsnamn: Huvudsaklig naturtyp och/eller lokalsnamn anges för att ge en kortfattad beskrivning av objektets huvudkaraktär och/eller läge.

Naturvärdesklass: En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för bedömningsgrunderna art och biotop. De anges i en tregradig skala enligt SIS standard där 1 är Högsta naturvärde, störst positiv betydelse för biologisk mångfald, 2 är Högt naturvärde, stor positiv betydelse för biologisk mångfald och 3 är Påtagligt naturvärde, påtagligt positiv betydelse för biologisk mångfald. Objekt med naturvärdesklass 4, Visst naturvärde har inte tagits med i detta program.

Objektsbeskrivning: Sammanfattande text över objektets utmärkande drag och innehåll.

Dominerande naturtyp: Indelning anges enligt svensk standard. Skog och träd, Äng och betesmark samt Myr är de vanligaste huvudsakliga naturtyperna för landobjekt i kommunen. / Biotop: Viktigaste typen av skog, ängs och betesmark eller myr som finns inom objektet.

Biotopkvalitet: Förekomst av värdeelement och strukturer som t.ex. förekomst av död ved.

Sällsynthet och hot (Natura 2000): Förekomst av biotop som är regionalt sällsynt. Hotade biotoper är sådana där utbredningsområdet minskar, den totala arealen minskar eller där strukturer eller funktioner som är viktiga för biotopen, sannolikt inte kommer finnas kvar på lång sikt eller bevarandestatus hos biotopen typiska arter inte gynnas. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000 naturtyp så ger det vägledning om att den är nationellt eller internationellt sällsynt. Naturvårdsverket har utrett vilka Natura 2000 naturtyper som är hotade i olika biografiska

regioner i Sverige, vilket är ett underlag för att bedöma om en biotop är hotad. Beteckningen ”9070” betyder t.ex. Trädklädd betesmark, ”9080” Lövsumpskog, ”9180” Ädellövskog i branter. Kan också ange om biotopen är ovanlig i kommunen.


Naturvårdsarter: Med naturvårdsarter avses arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland annat skyddade arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. De naturvårdsarter som hittats vid fältinventeringarna har markerats med en asterisk (*). Övriga naturvårdskategorier som används är, fridlysta art (§), rödlistade arter (NT-CR), signalart för skyddsvärd skog (S) och naturvårdsart i övrigt (N).

Artrikedom: Bedömer artrikedomen utifrån artantal eller artdiversitet och om objektet är artrikare eller mycket artrikare än det omgivande landskapet eller områden av samma biotop i regionen eller Sverige.

Områdesskydd: Anger om objektet helt eller delvis berörs av något utpekad skydd som Natura 2000-område, naturreservat, strandskydd eller djur- och växtskyddsområde. Informationen har till stor del inhämtats från Naturvårdsverkets webbaserade kartverktyg ”Skyddad natur”. / Inventeringar: Avser objekt som förekommer i andra databaser som t.ex. ArtData (rödlistade arter), Artportalen, Ängs- och betesmarksinventeringen (TUVa)

Önskvärd skötsel: Här anges behov av önskvärd skötselriktning för att gynna befintliga naturvärden och biologisk mångfald. Även exempel på ingrepp som kan missgynna naturvärdena anges.





Översiktskarta alla objekt



1.

BERGBRANT VÄSTER OM LUDVIGSTORP

Naturvärdesklass: 2

En halvcirkelformad bergsbrant som är omgärdad av granplanteringar och kalhyggen. Granplanteringen i söder är äldre och tämligen öppen med ett tätt fältskikt av kruståtel. I bergsbranten växer äldre bokar och det finns gott om torrakor och lågor vilket är gynnsamt för enfärgad barksvartbagge som tidigare har påträffats i de gamla bokhögstubbarna. Det finns rikligt med märken efter hackspett. Inom området förekommer det flera naturvärdesarter. Vedsvamp förekommer rikligt. Fältskiktet består i huvudsak av kruståtel, stenmåra och olika arter av mossor. Berggrunden består bl.a. av grönsten. Området ligger i ett annars monotont skogsbrukslandskap och ger ett lyft för landskapet.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Rasbrant

BIOTOPKVALITET

Äldre bok, lövlågor med insektshål, torrakor, hålträd, blockrik mark, tickor, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130).

NATURVÅRDSARTER

Rosa Lundlav VU, bokkantlav NT, bokvårtlav NT, kornig nållav S,

ARTRIKEDOM

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekade objekt / Objekt med naturvärde, Artdata, Riksintresse, Nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik ett rationellt skogsbruk. Spara gamla träd, Öka förekomst av torrakor och lågor.



2.

ALSUMPSKOG VID MISSE RÖD

Naturvärdesklass: 2

Alskog uppdelad av korsande väg i en nordlig alsumpskog och en sydlig allund med småbäckar. Alsumpskogen är högvuxen och alarna har många stora sockelbildningar. Träden är överlag äldre. Inslag finns av gran och björk. Sparsamt med död ved. Allunden är örtrik och arter skogsfräken, kabbleka, harsyra, kärrviol, hultbräken, älgört, vitsippa och ormbunkar var vanliga. Allunden växer intill en meandrande liten skogsbäck. Skogen är gallringspåverkad.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, lövlågor, grova björkrotvältor, högstubbar, vattensamlingar, källmark, översilning, naturliga skogsbäckar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Missne* S, bäckbräsmå* S, skärmstarr* S, rankstarr* S, bokvårtlav NT

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Objekt med naturvärde, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik negativ hydrologisk påverkan och körskador.



3.

MOSSE VID KVESARUM

Naturvärdesklass: 3

En måttligt fuktig igenväxande alsumpskog som är belägen mitt inne i ett område planterat med gran. Genom området rinner en liten bäck. Trädsiktet domineras av al i sumpskogen, men även björk och gran förekommer. Sly av al, rönn och hallon finns i busksiktet. I de nordöstra delarna finns en blandskog som domineras av gran med inslag av bl.a. björk samt en rest av en utdikad mosse där ljung, tuvull, ris- och mossvegetation dominerar fältsiktet. Mossen var så gott som trädfri fram till 1970-talet men där växer numera rikligt med träd, främst tall men även gran och björk. Död ved som högstubbar, rotvältor och lågor finns i måttliga mängder. Området hyser många skogsfåglar och större hackspett, morkulla och nötskrika observerades vid återinventeringen.

Fältsikt: Veketåg, humleblomster, sjöfräken, skogsbräken, kärrtistel, kärrstjärnblomma, stinknäva, blåbär, tuvull, tranbär, skogsstjärna

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Alsumpskog, mosse,

BIOTOPKVALITET

Alsockel, översilning, grov björk, granhögstubbar, björklågor, bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080, 91D0).

NATURVÅRDSARTER

-

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Spara död ved.



4.

KÄRR OCH SUMPSKOG SÖDER OM KVESARUM MOSSE

Naturvärdesklass: 3

En liten öppen mosse med omgivande svårtillgänglig skog. Mossen är relativt opåverkad men viss dikning finns. Några odlingsrösen och stenmurar vittnar om att det tidigare var mer öppen mark i området. Objektets nordöstra del består mestadels av alsumpskog. Objektet har viss betydelse för faunan, speciellt för groddjur och klövvilt. Några hässlebuketter i nordost visar här åter att det förmodligen var mer öppen mark tidigare. I objektets norra delar finns några grova spärrgreniga utmarksbogar. Någon har dött och delar av trädet har fallit till marken. Inom objektet växer även grov gran med en diameter på ca 1 meter. Området nordväst om objektet är slutavverkat och består mestadels av uppväxande björksly.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Myr

BIOTOPKVALITET

Stenmur, rösen, småvatten, fuktsänkor, alsockel, översilning, grov högstubbe, grov gammal gran, grov gammal bok, grov död ved med mulm, rotvältor, hässle, vidkroniga bokar, bokhögstubbe, boklägor, död ved, tickor, klen död ved,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

-

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fornminne (fornåker) / ArtData



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Spara död ved.



5.

BETESMARK NORR OM KVESARUMSSJÖN

Naturvärdesklass: 3

En större mestadels öppen betesmark med i stort sett trivial flora. I objektets nordöstra del finns en liten enefäladsrest. Bl.a. förekommer gökärt, gråfibbla, ärenpris, blodrot och rikligt med stenmåra. I den norra delen av enefäladen finns en del äldre och grövre björk, bok och gran. Strax söder om enefäladen finns ett mindre sankparti. I objektets centrala delar växer en hel del grov ek i en sluttning. Längst i väster finns ett kuperat parti med uppvuxen bokskog samt några solitära bokar i själva betesmarken. I anslutning till bokpartiet finns en dämd damm som har karaktären av en större översvämning. Stengårdsgårdar i bra skick och fragment av en fågata förekommer också.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och Betesmark / Trädbärande hagmark, enefälad, våtmark,

BIOTOPKVALITET

Grova träd, stenmurar, vidkroniga ekar och bokar, grova solbelysta lövträd, torrträd, rötskadade grova träd med mulm.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN

ARTRIKEDOM

-

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, ängs och betesmark, skyddsvärda träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd



6.

LÖVSKOGAR VID SJÖBERGASJÖN

Naturvärdesklass: 2

Lövskogar och lövblandskogar av varierande karaktär, från ask-alskogar i den sydvästra delen via äldre högvuxen alsumpskog med socklar längs norrut till Sjöbergasjön där lövdominerad blandskog växer på den sänkta södra sjöstranden. I de allra nordöstra delarna av objektet mot kommungränsen vidtar i huvudsak ganska vidsträckt högvuxna och medelåldriga alsumpskogar. I kantzonen till alsumpskogen i sydväst växer också mycket avenbok och hassel. Många askar står döda som torrträd efter askskottsjuka i ask-alskogen. I blandskogen utmed sjöstranden finns mycket död ved, särskilt av grov glasbjörk, men även inslag av grov bok och asp. Ung gran växer upp i blandskogen och bör tas bort. I anslutning till lövskogarna finns också utbredda videsnår och sjömader samt smärre bergbranter. Totalt sett ett variationsrikt och värdefullt objekt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp, bokskog av lågörttyp, ask-alskog, lövdominerad blandskog, myr, strandskog

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, grov björkhögstubbe, björklåga, grov asplåga, asphögstubbe, asktorrträd, asklåg, källmark, videsnår, mader, bäckdal, bergbrant, blockbrant,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9130).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, gullpudra* S, bäckbräsm* S, skärmstarr* S, mysk-madra S, lönnlav* S, lundstjärnblomma* S, småvänderot* N, platt fjädermossa* S, , gröngöling* NT, §



ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan i sumpskogarna. Spara död ved. Røj gärna bort gran i strandlövskogarna.



7.

ALSUMPSKOGAR ÖSTER OM SJÖBERGASJÖN

Naturvärdesklass: 3

Större lövskogsområde i terrängsvackor med medelåldrig till äldre alsumpskog, ofta utbildad som alkärr med stora sockelbildningar. Inslag finns av björk, som svarar för huvuddelen av död ved, såsom högstubbar, rotvältor och lågor. Få naturvårdsarter hittades. De södra delarna av objektet ingår i betesfälla och är mer enskiktade. I objektet inryms också smärre partier med annan skog, som inte har några påtagliga naturvärden, som gallrad äldre bokskog och planterad granskog.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalkärr, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, björkhögstubbar, björklågor, björk med bohål, översilning, källmark, damm

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skärmstarr* S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd, delvis / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Spara död ved.



8.

BLANDÄDELLÖVSKOG PÅ KVESARUMSSJÖNS VÄSTRA SIDA

Naturvärdesklass: 2

Blandädellövskog, klibbalstrandskog och lövsumpskog i ett bälte kring sjöns norra och västra sida. I blandädellövskogen dominerar bok och ek, med inslag av stort antal andra trädslag som klibbal, ask, rönn, avenbok, gran och skogslönn, skogsalm, sykomorlönn, asp, exotiska barrträd, vildapel och fågelbär. Partier finns med hasselrik ekskog med inslag av hagtorn. Grova träd förekommer rikligt, främst på en kulle med ansamling av grov vidkronig ek. Skogen är mest flerskiktad och olikåldrig samt innehåller en hel del död multnande ved i olika former. Skogen är påverkad av tidigare avverkningar genom plockhuggning. Klibbalstrandskogen är tidvis översvämmad och inrymmer olikåldriga träd. Lövsumpskogarna med al och björk är mest unga till medelåldriga, också tidvis översvämmade och innehåller enbart måttligt med död ved. Rik flora. Vanliga arter i fältskiktet var kärrsilja, videört, vitsippa, vårfryle, skogstjärna, gulplister, liljekonvalj, stinksyska, älgört, gul svärdsilja och videört. Insektsrikt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövlund, bokskog av örtrik typ, klibbalstrandskog, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Jätteträd av bok, grova bokar och ekar, döda och levande bokhögstubbar, boklågor, solöppna gläntor, tickor på träd, knäckt grov rönn, hackspetthål i grov bok, grov säl, ektorrträd, grov rötskadad bok, stenmur, blockrik mark, asktorrträd, grov ask och skogslönn, hålekar, grova rotvältor, blommande buskar och träd, sjöstrand

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9130, 9080).



NATURVÅRDSARTER

Myskmadra* S, lundstjärnblomma* S, buskstjärnblomma* S, skogsalm* CR, ask* EN, desmeknopp NT, skalbaggen Anitys rubens NT, rosa lundlav VU, guldlockmossa* S

ARTRIKEDOM Relativt hög

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd, Naturvårdsavtal (civilrättsligt avtal) / Nyckelbiotop, sumpskog, skyddsvärda träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationellt skogsbruk. Spara död ved och grova träd. Vid behov brunnsröjning kring grova ekar.



9.

LÖVSKOGAR PÅ KVESARUMSSJÖNS ÖSTRA SIDA

Naturvärdesklass: 3

Lövskogar av skiftande karaktär, vilka ansluter direkt till Kvesarumssjöns östra sida. I trädskiktet klibbal, sälg, rönn, björk, ask, bok, avenbok och hägg. Vassbälten, öppen vattensamling med näckrosor innanför sjöstranden, videbuskage och delvis översvämmad albård. Gott om högvuxna arter i fältskiktet, som älggräs, bredbladiga gräs, starrarter, kråklöver, bladvass och kabbleka. Olikåldrig och relativt flerskiktad skog, men överlag ung till medelåldrig. Pelarsal med äldre bokskog och flera grova stammar.

Förekomst av flera naturvårdarter. Några smärre bryggor och liten badplats på sandstrand.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalstrandskog, sjöstrandsnår

BIOTOPKVALITET

Lövlågor, björkhögstubbar, grova alar, rötskadade alar och videbuskar, sjöstrand, viss alsockelbildning, tidvis översvämning

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

ask* EN, brun kärrhök* §, bokitigerfluga* NT, mindre hackspett* NT, §, lundelm S, tandrot S, gråskimlig fladdermus §

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / Sumpskog



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik ett rationellt skogsbruk.



10. EKMILJÖER VID KVESARUMS SLOTT

Naturvärdesklass: 2

Ekmiljöer i anslutning till Slottsparken. Förekomst av ett stort antal ädellövträd, främst ek, men även skogslönn, lind m.m. Många av ekarna är grova och gamla. Flera är ihåliga och innehåller mulm. I de mer perifera östra delarna är jätteekarna inväxta i uppväxande lövsly, som bör tas bort i etapper, för att inte orsaka ljuschocker för ekarna. Värdefull svamp- och lavflora. Gynnsam miljö för vedlevande insekter. Ett objekt med få motsvarigheter i kommunen.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Hagmark av ek-lindtyp

BIOTOPKVALITET

Äldre ek, grov ek, jätteträd, mulmträd, gamla grova ekstubbar, rötskadade lövträd med håligheter

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt trädmiljö.

NATURVÅRDSARTER

Lind* S, oxtungsvamp* NT. Fler rödlistade arter finns rapporterade på Artportalen i direkt anslutning till objektet.

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel av ekmiljöer, som brunnsröjning kring igenväxta ekjättar.



11.

BOKBACKE SYDÖST OM FUNDERSEDS FRITIDSBY

Naturvärdesklass: 3

Nordvästvänd boksluttning ner mot betesmarker. Bokskogen är genomgållrad, gles och relativt homogen. Det finns dock viss ålders- och storleksspridning. Förekomst av några få gamla biologiskt värdefulla bokar. På en av dessa sågs flera naturvårdsarter, och dessa hittades inte på någon annan bokstam i objektet. Inslag finns av undertryckta klena senvuxna bokar, som kan bli intressanta för epifyter i framtiden. Få värdeelement i övrigt, och mycket sparsamt med död ved. Förekomst av enstaka stammar av avenbok, skogslönn, sykomorlönn och ek.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av örtfattig typ, bokskog av örtrik typ

BIOTOPKVALITET

Gammal bok, senvuxen klen bok, grov bok, brant sluttning

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130).

NATURVÅRDSARTER

Lunglav* NT, bokvårtlav* NT, rosa lundlav VU, lönnlav* S, bokfjädermossa* NT, platt fjädermossa* S, trädporrella* S, kransrams* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla träd, senvuxna stammar och död ved.



12-14. ALSUMPSKOGAR NORR OM HAGSTAD

Naturvärdesklass: 3

Större lövdominerat objekt som innefattar tre olika delobjekt med alsumpskog i terrängsvackor. Det rör sig om medelåldrig till äldre alsumpskog, ofta utbildade som alkärr med sockelbildningar. Inslag finns av främst björk. Död ved, såsom högstubbar, rotvältor och lågor, finns i måttliga mängder. Få naturvårdsarter hittades.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalkärr, klubbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Socklar, alhögstubbar, allågor, björkhögstubbar, björklågor, björk med bohål, översilning, källmark, bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, kärrfibbla* S, småvänderot* N, blåmossa* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Objekt med naturvärde (delobjekt 13).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Spara död ved.



15.

BETESMARK VÄSTER OM HAGSTAD

Naturvärdesklass: 2

Naturbetesmark med en relativt god hävdstatus. Särskilt gäller det den stenbundna marken i norra delen. Frodigare och mer näringspåverkad vegetation kan ses på ömse sidor av den öppna våtmarken i objektets södra del. Förekomst av ett relativt stort antal grova vidkroniga ädellövträd och smärre hässlen, särskilt på backar. Floran är måttligt artrik, men slättergubbe har rapporterats i sen tid. Det är dock oklart om den finns kvar. Det finns också rösen och murar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, enefälad, hässle, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, stenmurar, stenrösen, vidkroniga grova ekar och bokar, levande grov bokhögstubbe, gamla grova ekstubbar, säl, apel, hagtorn, fläder, grov hassel

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe VU, §, lind* S, ask* EN, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR & INTRESSE

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Ingen spridning av konstgödning.



16. SLÅTTERÄNG OCH BETESMARK VID HAGSTAD

Naturvärdesklass: 3

Västvänd sluttning med en smärre nötbetad naturbetesmark och en liten slåtteräng i nedre delen. Genom dessa rinner en mindre bäck, som omges av nyhamlade askar. Påtagliga kulturhistoriska spår, i form av fägata, jordkällare och hamlade träd, finns i objektet. Förekomst också av flera naturvårdsarter.



Violettkantad guldvinge



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Slåttermark, trädbärande hagmark, bäck

BIOTOPKVALITET

Hamlade ädellövträd, vidkroniga ekar, stenbunden betesmark

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

-

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, mänviol NT, violettkantad guldvinge NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt hävd av slåtteräng och betesmark.



17.

BETESMARKER OCH LÖVSUMPSKOGAR VID BASTSLINGAN

Naturvärdesklass: 2

Stort mosaiklandskap av betesmarker och lövsumpskogar på ömse sidor av Bastslingan mellan Hagstad och Ekastorp. Av betesmarker har den nordligaste fällan en god hävdstatus. Stora ytor har där en välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark med lågvuxen vegetation och artrik flora, både på torrbackar som i låglänta fuktängar. Grova solitära bokar breder där ut sina kronor. Det finns också stora ytor i den södra delen som är nötbetad, men där näringspåverkan är tydlig på vegetationen. Mellan betesfällorna finns skapade våtmarker omgivna av mestadels betad och gles ädellövskog. Många torrträd vittnar om en omfattande askdöd.

Alsumpskog, björksumpskog och bäckdråg utbreder sig dels öster om Bastslingan, dels i objektets västligaste delar. Det rör sig om lövsumpskogar av olika ålder och tidigare skoglig påverkan. Sumpskogarna innehåller överlag måttligt med död ved, och hög-stubbar och lågor påträffas mest sparsamt. Grova ädellövträd och lövträd förekommer också, särskilt i brynzoner mellan betesmark och alskog. Sockelbildning förekommer i vissa alskogar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr, björksumpskog, trädbärande hagmark, enefälad, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, asktorrträd, björkrotvältor, grova vidkroniga bokar, våtmarker, grov hassel, bäckdråg

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9070, 9080).



NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, kärrfibbla* S, gullpudra* S, slokstarr* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd i betesmarkerna. Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan i sumpskogarna.



Gullpudra



18.

BETESMARKER OCH LÖVSUMPSKOG VID EKA STORP

Naturvärdesklass: 2

Ett stort område som i nordväst domineras av trädbärande betesmark. De betade markerna i denna del av objektet har generellt sett en god hävdstatus. Floran är trivial med växter såsom svinrot och blodrot. Objektet är ganska kuperat med en markant höjd i västra delen. Här finns gott om kulturhistoriska element som breda stenmurar och odlingsrösen. En del solitära träd växer också här.

Den östra delen är mer skogsbetonad med en delvis öppen myr i nordöstra delen. På myren växer främst björk men även inslag av gran finns. I myrens nordöstra kant finns en ganska kupera del med solbelyst brant med sten och grus. Runt myren består trädskiktet till stor del av olikåldrig bok men här finns även blötare partier med lövsumpskog. Även denna del är ganska kuperad med torrare ryggåsar med främst bok. Det har skett en viss avverkning av gran inom ett område i sydost. Både sumpskogarna och övrig skog innehåller en hel död ved, och högstubbar och lågor påträffas. Grova ädellövträd och lövträd förekommer, särskilt i sydvästra spetsen. Här förekommer även en hel del tickor.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr, Äng och betesmark / Myrmark, trädbärande hagmark, öppen betesmark, myr, våtmark och dammar

BIOTOPKVALITET

Bitvis välbetad grässvål, tuvig betesmark, stenmurar, rösen, vidkroniga lövträd på betesmarken, torrträd, säl, apel, klibbal, lövlågor, tickor, rotvältor, grov bokhögstubbe, björkhögstubbe, torrbackar, småvatten, våtmark, dammar,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (betesmark 4030).



NATURVÅRDSARTER

Svinrot* N, jordtistel * NT

ARTRIKEDOM

Måttligt artrikare än omgivningarna

UTPEKADE OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng- och betesmark, Sumpskog – skogsstyrelsen. Riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av ung björk. Ingen konstgödning bör ske. Spar död ved. Undvik rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan på och runt myren





19. BETESMARKER VID VÄSTANTORP

Naturvärdesklass: 2

Smärre betesmarksrest med enefälader och fuktsänkor samt trädbärande hagmarker med björk och ek. Generellt sett rör det sig om ogödslade marker. En måttlig näringspåverkan på vegetationen kan dock ses främst i lägre delar av objektet. Väster om vägen är beteshävd svag och igenväxning med högt gräs och björksly har tagit fart. Öster om vägen är hävdn bättre, och här kan ännu ses utbredda ytor med lågvuxen ljunng med tillhörande vegetation. Alla fynd av naturvårdsarter gjordes dock i den igenväxande västra delen. Det finns också olika stenstrukturer som rösen och murar. Angeläget objekt att bevara i god hävd.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, öppen betesmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, tuvig betesmark, stenmurar, stenrösen, vidkroniga björkar, ektorrträd, säl, apel, klibbal, hagtorn, gamla enbuskar, igenväxande fuktäng och högtäng

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 6410, 6430).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd av nöt. Rönjning av ung björk. Ingen konstgödning bör ske.



20.

BETESMARKER VID EKASTORP

Naturvärdesklass: 3

Stenbundna betesmarker i söder och mer träd täckt mark i norr med tall och björk. På de öppna tuviga delarna växer en örtrik flora, som liten blå klocka och ängsvädd. Viss näringspåverkan på vegetationen kan dock ses i stora delar av objektet. Inga särskilda naturvårdsarter hittades heller bland kärlväxter. Inslag finns av solitära träd, ibland grova, som asp, björk, bok, klibbal, gran och ek. Talrikast är äldre ganska grov tall. Det finns också rösen och murar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, björkhage, öppen betesmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden tuvig betesmark, stenmurar, stenrösen, vidkroniga björkar, ektorrträd, säl, apel, klibbal, hagtorn, äldre tall, grov gran

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade.

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Rójning av uppkommande sly. Ingen konstgødning bör ske.



21. BÄCKDAL MED ASK-ALSKOG VID ENEVÅNGEN

Naturvärdesklass: 2

Liten bäckdal med naturlig skogsbäck med omgivande ung till medelåldrig askskog med inslag av björk, rönn, ask, gran och ek. Äldst askskog finns i de övre delarna av bäcken, där det även finns partier med askkärr. På övriga delar längs med bäcken dock mest enskiktad ganska lågvuxen askskog på blockrik mark. I buskskiktet hassel, hagtorn och hägg. I fältskiktet mest vitsippa, skogsviol, hultbräken och kabbleka. Totalt sett stora och omfattande ytor av översilade källmarker. Skogen är delvis påverkad av gallring och siktgator för jakt finns på ett par ställen. Måttlig förekomst av död ved och alsocklar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Naturlig skogsbäck, källmark, översilning, lövlågor, alrotvältor, asktorrträd, askrotvältor, björkhögstubbar med lågor, stenbunden mark med block, videsnår, fräkenmader, grova lövlågor, stående vatten vid sidan av bäcken, stenmur

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Kärrfibbla* S, gulsippa* S, skärmstarr* S, ask* EN, gullpudra* S, rankstarr* S, bäckbrämsa S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nyckelbiotop, objekt med naturvärde, sumpskog



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan.



22. BONDEMÖLLA

Naturvärdesklass: 3

Kvesarumsån delar sig här i två armar som innesluter ett sankt parti. Fältskiktet är mycket tätt och högt (1-1,5 m) och älggräset har nästan helt tagit över. Sankområdet omges av blandlövskog med alm, al, ek, björk och rönn. Inom området har forsärla och jungfrusländor noterats.

Fältskikt: Älgört, kaveldun, rörflen, kärrfibbla, humleblomster, sjöfräken, kabbleka, gul svärdsilja.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Vattendrag, lövsumpskog, högrötsäng

BIOTOPKVALITET

Döda träd, vattendrag (å),

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

-

NATURVÅRDSARTER

Skogsalm* CR, kärrfibbla* S,

ARTRIKEDOM

Medel

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / ArtData, Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationell skogsskötsel, negativ hydrologisk påverkan och körskador



23.

KVESARUMSÅN MED ALSUMPSKOG VID BONDEMÖLLA

Naturvärdesklass: 2

Bäckdalgång med alskog. Olikåldrig och flerskiktad skog med en måttlig förekomst av multnande död lövved. Den totala arealen av alskog utmed Kvesarumsån är omfattande. Vattendraget bildar ett nätverk av åfåror, vilket skapar öar av olika storlek. Vattendraget är mest strömmande till forsande. Örtrik flora i alsumpskogen kring ån, bland annat med imponerande "hav" av gulsippor, kabblekor och vitsippor. Andra arter i fålskiktet var älgört, kabbleka, kåltistel, gul svärdsilja och svalört. I buskskiktet kan ses hägg, vinbär och getapel. Flitigt besöksmål där många går den spångade iordningsställda promenaden utmed vattendraget.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalkkärr, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Döda träd, lövlågor, rotvältor, alhögstubbar, äldre alar, källmarker, översilning, vattendrag (å), rännilar, öbildningar i vattendraget, sockelbildningar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt natur- och skogstyper i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, bäckbrämma* S, gulsippa* S, skogsbingel* S, skogsalm* CR, skogslind* S, storrams* S, kärrfibbla* S, gullpudra* S, rutlungmossa* S, västlig husmossa* S

ARTRIKEDOM

Hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekad strandskydd. Alsumpskog i den centrala delen av objektet är biotopskyddat / Nyckelbiotop, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationell skogsskötsel, negativ hydrologisk påverkan och körskador.



24. ODLINGSLANDSKAP VID MANN (BJÄVRÖD)

Naturvärdesklass: 3

Smärre mosaikartat område bestående av öppna gräsmarker, färbetade hagmarker, anlagda våtmarker (fiskdammar), lövdungar (björk, ek, gran) och bryn. Gräsmarkerna är näringspåverkade och har ingen särskild flora, även om det förekommer blommande partier. Solitär sälj, ask och slånbuskage förekommer spritt i området. Inslag finns av smärre igenväxande högörtängar i fuktiga terrängsvackor. I den färbetade hagmarken växer flera flerstammiga mäktiga lindar. Även förekomst av enstaka hasselbuskar, apel, rönn och sälj. Anlagda våtmarker ligger längst söderut i objektet och tillför värden för bland annat fåglar och trollsländor. Kulturhistoriska värden finns med stenmurar och gamla odlingsrösen. Välbesökt friluftsområde med angöringsplatser, informationstavlor och stigar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Frisk gräsmark, trädbärande hagmark, blandlövsog, öppna våtmarker

BIOTOPKVALITET

Betad grässvål, diken, stenmurar, stenrösen, vidkroniga grova lövträd, solitär sälj, apel, hagtorn, slånbuskage i bryn och solitärt, viden

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

-

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, mindre bastardsvärmare NT, duvhök NT, §, mindre hackspett NT, §, spillkråka NT, §, gröngöling NT, §, buskskvätta NT, §, gulsparv VU, §, sävsparv VU, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.



ANSLUTANDE OMRÅDEN

Ansluter direkt till objekt 23 med alsumpskog och vattendrag, där det går en anlagd träbro (Fiskestigen), som utgår från P-platsen i detta objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad hävd av gräs- och betesmarker. Ingen spridning av konstgödnings.



25. LÖVSKOGAR SYDVÄST OM SÖDRA RÖRUM

Naturvärdesklass: 3

Lövskogar av skiftande karaktär i varierande topografiska lägen. Äldre bokskog dominerar på höjder, kullar och i sluttningar, medan äldre ask-alskog växer i en dalgång, där en skogsbäck rinner och översilar mark. Örtrik flora överlag. I de östra obetade delarna är förekomsten av död ved relativt stor, och många träd är rötskadade och/eller senvuxna. Skogen är här olikåldrig och det finns inslag av främst lind, avenbok och hassel samt ek. I den betade västra delen är skogen mer enskiktad och homogen, men innehåller några grova ädellövträd, bland annat en mycket grov ek. Där finns också blockbranter som leder upp till en smärre höjd med äldre bokskog och död ved. Delar av objektet gränsar till högt naturvärde – klass 2.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av örtfattig typ, ask-alskog

BIOTOPKVALITET

Alsoskel, alhögstubbe, allåga, grova bokar, jätteek, rötskadade senvuxna bokar, bäckdal, översilning, blockbranter, stenmurar, rösen, asktorrträd, asklägor, källmark, rötskadad grov avenbok, betad skog

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9130).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, bokvärtlav* NT, halmspindling* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ringbarka träd som konkurrerar med grova ekar i betesskogen. Spara död ved. Undvik negativ hydrologisk påverkan.



26. ÄDELLÖVSKOG PÅ ÅSAR VÄSTER OM SÖDRA RÖRUM

Naturvärdesklass: 2

Äldre ekhagmark och intill nyligen betad blandädellövskog på åsbildningar och höjder. I ekhagmarken växer vidkroniga äldre ekar och enstaka lindar. En viss utgallring har skett, av grova äldre stubbar att döma. Ingen för yngning förekommer och fålskiktet är stadd i igenväxning. På åsen är trädskiktet olikåldrigt och utgörs av bok, lind, avenbok och ek. I de södra delarna tillkommer asp och säl. I buskskiktet finns enstaka buskar av hassel och hagtorn. Förekomst av lite grövre ädellövträd, senvuxna äldre avenbogar och en del lågor. Värdefull svampflora såväl i ekhagmarken som på åsarna.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Igenväxt hagmark av lind-ektyp, blandädellövlund

BIOTOPKVALITET

Äldre ek, grov ek, gamla grova ekstubbar, stenmurar, rösen, rötskadad senvuxen avenbok, lövlågor, betad skog, bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Lind* S, blåsippa* S, oxtungsvamp* NT, ekticka* NT, lundvaxskivling* NT, orangepudrad klotterlav* NT, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / ArtData, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd med nöt.



27.

BETESMARK VID AHLGRENSTORP

Naturvärdesklass: 3

Två smärre sidlänta betes- och hagmarker på långsträckt åsbildning i jordbruksbygd. De sammanlänkas via smärre lövdungar. Stenbunden mark med mycket en och blommande buskar. Även en hel del vidkroniga björkar och ekar. Relativt välbetad grässvål och till viss del örtrik, men näringspåverkad och inga naturvårdsarter av växter påträffades. Det finns dock uppgifter om flera arter av rödlistade fjärilar.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Lövhagmark

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga björkar, ekar, enar, stenbunden mark, rösen, stenmurar, grässvål, säl, apal

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Ängsmetallvinge NT, violett kantad guldvinge NT, bastardsvärmare NT

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivande mark.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekade / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete.



Ängsmetallvinge



28.

LINDSKOG PÅ ÅS NORDVÄST OM SÖDRA RÖRUM

Naturvärdesklass: 2

Linddominerad blandädellövskog på långsträckt åsbildning i jordbrukslandskap. Olikåldrig men ganska enskiktad skog. Förutom lind växer bok, ek, avenbok och skogslönn rikligt. Gallring av ek har tidigare skett, av äldre stubbar att döma, men ingen rationell skötsel har utförts på senare år. Förekomst av bland annat grova bokar och skogslönnar, senvuxna äldre avenbokar och en del högstubbar och lågor. Huvuddelen av objektet är idag obetat, men de nordligaste delarna ingår i nötbetade fällor. Längst i norr ingår smärre torrbackar med artrik flora, hagtorn och vidkronig lågväxt ek. I sluttningarna väster om åsen finns ytor med blockrik mark bevuxet främst av lind. Flera naturvårdsarter av olika organismgrupper noterades. Säreget och värdefullt objekt.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövlund

BIOTOPKVALITET

Äldre ek, grov ek, gammal grov ekstubbe, grov bok, senvuxen rötskadad avenbok, grov gammal skogslönn, lindhögstubbe, lindlåga, ekrotvälta, stenmurar, rösen, blockrik mark, betad skog

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9180).

NATURVÅRDSARTER

Lind* S, kransrams* S, oxtungsvamp* NT, lömsk flugsvamp* S, bokvårtlav* NT, lönnlav* S, platt fjädermossa* S, guldlockmossa* S, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivande skogar.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Gränsar till strandskydd / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt betesdrift i del av objektet.



29.

BETESLANDSKAP ÖSTER OM SÖDRA RÖRUM

Naturvärdesklass: 3

Beteslandskap som hävdas av nöt. Objektet utgörs dels av öppen frisk gräsmark med trädsolitärer, dels betad ekskog, som tidigare gallrats. Fuktig betesmark i lägre liggande terräng. Hävdstatus är generellt god. Näringspåverkan på vegetationen kan dock ses i hela objektet. Floran är därför bara måttligt artrik även om det finns upphöjda små torrbackar med liten blåklocka med mera. Av kärlväxterna hittades inga särskilda naturvårdsarter, men det finns rapporter i sen tid av backsippa. Inslag finns av solitära träd, som ask, björk, ek och klibbal. Det finns också olika stenstrukturer som rösen och murar. Längst i söder finns en anlagd smärre våtmark. Objektet tväras av en smärre och kantas av en större luftledning. En väg korsar också objektet.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, fuktäng, frisk betad gräsmark, betad ekskog, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, stenmurar, stenrösen, vidkroniga ekar, gammal ihålig apel, slån, död solitär björk, gamla ekstubbar, grov ask

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Backsippa VU, §, ask* EN, lind* S, gröngöling* NT, §, ängsmetallvinge NT

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Spara död ved. Gynna grova träd. Ingen tillförsel av konstgödning bör ske.



30. BOKSKOGAR VID HJÄLLEN

Naturvärdesklass: 2

Gammal bokskog med lång skoglig kontinuitet. Riklig förekomst av död ved, ofta grov. Överhuvudtaget gott om värdeelement som gamla bokar, grova bokar, undertryckta senvuxna bokar och rötskadade stammar med håligheter och ibland mulm. Bokskogen är ett gammalt odlingslandskap, med åtskilliga gamla odlingsrösen och stenmurar. Det är ett större bokskogsområde med mellanliggande bäckdalar och sänkor, som bildar sumpskogar. Hedbokskog med obefintligt fåltskikt utom på amfibolitbranterna på Hjällen med rikare flora. Riklig förekomst av naturvårdsintressanta lavar och mossor, särskilt på Hjällen. Där förekommer många exklusiva arter och objektet är en topplokal för bokskogslavar i kommunen. Troligen finns även intressanta vedlevande insekter och svampar. Totalt sett ett mycket värdefullt objekt för biologisk mångfald. Låg sentida skoglig påverkan inom objektet, men skogen omges av produktionsskogar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, klubbaskog av översilningstyp, rasbrant

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, gamla bokar, senvuxna rötskadade bokar, mulmträd bokhögstubbar, boklågor, fnösketickor, bäckdråg, översilning, källmark, stenmurar, odlingsrösen, blockrik mark, alhögstubbar, allågor, grova askar



SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110).

NATURVÅRDSARTER

Jättesvampmal* NT, savlundlav* EN, stiftklotterlav* NT, liten lundlav* NT, rosa lundlav* VU, bokvårtlav* NT, borkantlav* NT, lunglav* NT, gulnål* S, kornig nållav* S, platt fjädermossa* S, grov baronmossa* S, sydlig sotticka* VU, alm* CR, ask* EN

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog och regionalt viktigt objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Naturreservat (stora delar) / ArtData, nyckelbiotop, objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling.

31. FÄLADSMARK OCH BOKSKOG VID SÖDRA RÖRUM

Naturvärdesklass: 3

Smärre betad enefälad som omges av ädellövskogar. Stenbunden mark med mycket en och blommande buskar. Även en hel del vidkroniga äldre bokar och ekar. Fältskiktet domineras av vitsippa. Äldre ljunng på tuvorna. Bokskogen är äldre men överlag enskiktad och relativt homogen med lite död ved. Ingår i naturreservatet Södra Rörum.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga äldre bokar och ekar, gamla enar, hassel, stenbunden mark, betad ogödslad grässvål, blommande sälga, fläder, apel, ljungtuvor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130).

NATURVÅRDSARTER

Mindre bastardsvärmare NT, gullviva*, §

ARTRIKEDOM


Artrikare än omgivande mark.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete av fäladsmark, i övrigt fri utveckling.



32. ALSKOG OCH SMÄRRE SJÖ VID SÖDRA RÖRUM

Naturvärdesklass: 2

Alsumpskogar, bäckar och alkärr i anslutning till smärre sjö. Högvuxen alsumpskog i terrängsvacka med bäckdal i den sydöstra delen av objektet. Den övergår i klibbalkärr med stora sockelbildningar. Artrik blandädellövskog och aldominerad lövskog dominerar skogen öster och norr om sjön. Förutom al växer rönn, ask, bok, asp, avenbok och björk i trädskiktet medan hassel, hägg och benved förekommer i buskskiktet. Artrik flora där följande arter dominerar; svalört, älgört, vitsippa, humle-blomster, kabbleka, brännässla, gulplister, kärrviol och olika starrarter. En smärre bäck ansluter till sjöns östra del. Sjön omges av starr, vide- och sälgsnår som sen övergår i lövsumpskog. Totalt sett värdefulla skogsmiljöer, med än högre värden i förening med sjön och dess närområde.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr, blandädellövlund, hässlen

BIOTOPKVALITET

Översilad källmark, mossblock, lövlågor, alsocklar, rotvältor, bäckdråg, öppen solbelyst göl, vide- och sälgsnår, äldre alar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Skärmstarr* S, kärrfibbla* S, bäckbräsmå* S, gulsippa* S, gullpudra* S, ask* EN, dvärghäxört* S, västlig husmossa* S, kärrbräken* S, skogsbingel* N, mörk lungört* S, storrams* S, aklejruta* S, myskmadra* S, blåsippa* S, hässleklocka* S, småvänderot* N, smådopping* §, blåmossa* §



ARTRIKEDOM

Relativt hög

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nyckelbiotop, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Skogs- och naturtyper som är känsliga för hydrologisk påverkan.



33. SJÖMOSSAHUS

Naturvärdesklass: 3

I objektets östra del finns ett varierande våtmarksområde med mossar, kärr och en skogstjärn. Objektet ligger insprängt i ett skogsområde som består av både blandskog och granskog. Mossarna är bevuxna med björksly och gran och är bitvis igenväxta. I kärret finns en vattenspegel i vars kant det växer mängder av dystarr och tuvull. Flertalet sländor observerade. Mossen med den öppna gölen är den sista resten av den stora mossen som har varit utsatt för omfattande torvtäkt. Objektet genomkorsas av torvdiken och av det gamla laggkärret finns det endast kvar små rester. Andra arter som finns i de våtare partierna av området är tranbär, hjortron, rundsileshår, vitmossa, rosling och ljung. I de torrare partierna växer det blåbär, lingon, kråkbär, skogskovall, harsyra och skogsbräken. Objektet består även av högstubbar, en del rika på tickor samt en del lågor. Skåneleden går rakt genom objektet. På stigen observeras larvgångar av grön sandjägare.

I nordväst består objektet av ett stycke betesmark med spår av det äldre skiftet i form av stengårdsgårdar och odlingsröse i fint skick. Betesmarken är väl hävdad och det glesa fältskiktet består av bl.a. stenmåra, ärenpris, stor blålocka samt gråfibbla. På betesmarken finns även grova gamla träd av ek, ask samt bok.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Mosse, äng och betesmark

BIOTOPKVALITET

Högstubbar och lågor, tickor, småvatten, fuktsänkor, diken, naturbetesmark, stenmurar, stenrösen, grova gamla träd ek, ask samt bok.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen



NATURVÅRDSARTER

Ask* EN,

ARTRIKEDOM

Måttligt artrikt, flertal sländor

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, ängs- och betesmark, Riksintresse för friluftsliv, fornlåker

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling för äldre oskött lövskog med värdeelement, undvik rationell skogsskötsel i objektets lövskogar och ytterligare hydrologisk negativ påverkan på myren. Fortsatt underhåll av skåneleden. Fortsatt bete på betesmarkerna.



Hål i marken med



larv av Grön sandjägare

34.

BETESLANDSKAP VID MANNARP

Naturvärdesklass: 2

Ett variationsrikt beteslandskap söder och väster om Mannarp. Betesmarkerna söder om Mannarp var på 40-talet mer öppna men har fått utvecklats fritt och innehåller idag en betad olikåldrig ädellövskog med mycket död ved. Markskiktet består mestadels av blåbärs- och lingonris. Marken är blockrik med omväxlande öppna partier. Gott om stenmurar och rösen och en välbevarad fågata finns i den mer öppna enbuskmarken i nordost. Gott om värdefulla värdeelement som ett antal grova spärrgreniga lövträd. Bokhögstubbar och boklågor med gott om tickor. Det finns även blötare partier med alsumpskog. I nordväst är marken mer öppen och har karaktären av en fuktigare högrötsäng. Fågellivet är rikt med bl.a. trädpiplärka, trädgårdssångare och gärdsmyg. Sammantaget ett värdefullt mosaiklandskap med betad lövskog, grova ädellövträd och partivis rika kulturlämningar. Skåneleden går genom området.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad skogsmark,

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga äldre bokar och ekar, gamla enar, hassel, stenbunden mark, stenmurar, rösen, grova lövhögstubbar och lågor, betad ogödslad grässvål, rönn, apel. ljungtuvor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (delvis 5130, 4030, 6270).

NATURVÅRDSARTER

Trädpiplärka* §, trädgårdssångare* §, gärdsmyg* §.

ARTRIKEDOM

Bitvis relativ hög



UTPEKADE OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs och betesmark, Riksintresse naturvård & friluftsliv, Fornlämning, fossil åker, röjningsrösen

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete av fäladsmark och skogsmarken, i övrigt fri utveckling. Gynna grova träd. Spar död ved. Undvik rationellt skogsbruk.





35.

BETESMARKER NORR OM GUNNARP

Naturvärdesklass: 3

Betesmarker med mycket varierande hävdstatus och topografi. De nötbetade markerna i den södra delen har generellt en svag hävdstatus, medan hästbetet i de norra delarna är hårbetad. Näringspåverkan på vegetationen kan ses i hela objektet, och tuvtätelängar breder ut sig i lägre fuktigare partier. Floran är därför bara måttligt artrik. Inga särskilda naturvårdsarter hittades heller bland kärlväxter, men det finns flera tidigare sådana rapporter. Inslag finns av solitära träd, som asp, björk, bok, klibbal och tall. Det finns också rösen och murar. Dessutom förekommer rikligt med stora gamla enbuskar på höjdryggen i söder. Längst i norr finns anlagda våtmarker. Naturvärdena kan öka vid insatta skötselåtgärder.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, enefäläd, björkhage, fuktäng, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, stenmurar, stenrösen, vidkroniga löv- och barrträd, torrträd, säl, apel, hagtorn, fläder

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 5130, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe VU, §, backsippa VU, §, jordtistel NT

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd i den södra delen. Rökning av sly. Ingen konstgödning bör ske.



36.

BOKSKOGAR VID GUNNARP

Naturvärdesklass: 2

Stort sammanhängande lövskogsområde på smärre kullar och i dalgångar. På fast mark dominerar högvuxen äldre bokskog. Måttlig täthet av död ved, dock ofta grov. Totalt sett gott om grova bokar, rötskadade lövstammar med håligheter, högstubbar och lågor. I dalgångarna rinner smärre skogsbäckar och översilade bäckdråg på rik mark. Ask, al, björk, lind, avenbok, ek och bok växer här i en mångformig lövblandskog. Variationsrik och naturskogsartad skog med rik flora. Gott om död ved, särskilt av ask. Artrik insektsfauna och ett par intressanta vedlevande blomflugor noterades. Totalt sett ett värdefullt objekt för biologisk mångfald. Tidigare gallringspåverkan och gamla diken, men överlag relativt låg sentida skoglig påverkan inom objektet.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, klibbalskog av översilningstyp, skogsbäck

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, senvuxna bokar, bokhögstubbar, boklågor, fnösketikor, skogsbäck, bäckdråg, översilning, källmark, stenmur, odlingsrösen, blockrik mark, alhögstubbar, allågor (många blöta), alsocklar, askrotvältor, asktorrträd, björklågor



SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110).

NATURVÅRDSARTER

Bokvårtlav* NT, lönnlav* S, platt fjädermossa* S, skärmstarr* S, grönvit nattviol* §, gullpudra* S, mörk lungört* S, lind* S, rankstarr* S, lundstjärnblomma* S, kärrfibbla* S, stor häxört* S, bäckbräsma* S, bokitigerfluga* NT, ängstigerfluga* N, stenknäck* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog och regionalt värdefullt objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling.

37.

BETESMARKER VID ARUP

Naturvärdesklass: 3

Öppen betesmark med förekomst av solitära grova vidkroniga ekar och bokar. Fläckvis är marken stembunden. De nötbetade markerna har generellt en relativt svag till måttlig hävdstatus med knähögt gräs som följd på stora ytor. Näringspåverkan på vegetationen kan ses i hela objektet, och florin är bara måttligt artrik. Inga särskilda naturvårdsarter hittades heller bland kärlväxter. Däremot finns många värdefulla värdeelement, särskilt nämnda ekar och bokar samt rösen och murar. Vissa röjningsinsatser har skett nyligen inom objektet. I kantzoner av betesmarken förekommer uppslag av lövsly, som också bör tas bort.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark

BIOTOPKVALITET

Betad mark, djurspillning, fuktsänka, diken, stenmurar, stenrösen, stembunden mark, vidkroniga grova ekar, ektorrträd, enstaka hagtorn, apel och enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade.

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av lövsly bör fortsätta ske på platser med uppslag. Ingen konstgödning bör ske.



38. ALSUMPSKOGAR NORR OM GUNNARP

Naturvärdesklass: 3

Sammanhängande stråk av alsumpskogar och alkärr, ofta längs smärre vattendrag, av olika ålder och tidigare skoglig påverkan, från medelåldrig till äldre alskog. Varierande inslag av död ved, men högstubbar och lågor påträffas mest sparsamt. Grova bokar och död ved förekommer fläckvis. Sockelbildning förekommer, och några är mycket stora. Inslag finns av anlagd våtmark och smärre dypöl. Viss förekomst av naturvårdsarter. Alsumpskogen omges ofta av ett rationellt skogsbruk med hyggen och granskogar i olika ålder.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Alhögstubbbar med bohål, altorrträd, björkrotvältor, alsocklar, alrot-vältor, vattendrag, tidvis stillastående vatten, grova bokhögstubbbar, grova boklågor, våtmark

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Fransfladdermus VU, §, kärrfibbla* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Spara gamla träd och död ved.



39.

BETESMARKER VID GUNNARP

Naturvärdesklass: 3

Betesmarker med varierande hävdstatus och topografi. De betade markerna i den södra delen har generellt en god hävdstatus, medan betet i de mer kuperade norra delarna varit mer extensivt på sistone, med knähögt grässkikt som följd. Näringspåverkan på vegetationen kan ses i hela objektet, och florin är bara måttligt artrik. Inga särskilda naturvårdsarter hittades heller bland kärlväxter. Däremot finns många värdefulla värdeelement, från grova granar, ekar och bokar samt gamla tallar till rösen och murar. Dessutom förekommer rikligt med stora hassel- och gamla enbuskar. Äpel, säl och asp förekommer mer enstaka men spridd. Naturvärdena kan öka om ytterligare skötselåtgärder görs.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, enefälod

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuggig mark, diken, stenmurar, stenrösen, vidkroniga grova löv- och barrträd, ektorrträd, säl, ädel, äldre hassel, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade.

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekade / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökade beteshävd. Rönning av lövsly och ung gran. Träd är redan stämplade för utglesning av trädskiktet. Ingen konstgödning bör ske.



40. STASS MOSSE

Naturvärdesklass: 3

Objektet består av en mosse, där ingen storskalig torvbrytning sker längre. Runt mossen, i främst östra och norra delen, finns spår av den omfattande torvtäkt som bedrivits här förr. Denna f.d. mosse saknar mossekaraktärer och området kan beskrivas som en blandskog med mestadels björk i trädskiktet samt tall och gran. Död ved av björk förekommer rikligt. Fältskiktet domineras nästan helt av blåbärsris, men även björnmossa och lingon finns. I de fuktigare partierna, däribland några mindre torvgravar, växer missne, vitmossa, topplösa samt vattenklöver. I främst söder har området karaktär av laggkärr där vide växer tätt. Området i väster är mer ett kärr med hedkaraktär där fältskiktet består av stagg, vitag, flaskstarr, klockljung, tranbär samt blåtåtel. Det finns gott om spår av klövvilt i området och betydelsen för den lokala ekologin är stor. Rikt fågelliv med bl.a. trädpiplärka, svartvit flugsnappare, lövsångare, gransångare och trana.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Myr, sekundär lövskog, björkmosse

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björklågor, björkhögstubbar, tickor, klen död ved, småvatten, fuksänkor, diken, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen,

NATURVÅRDSARTER

Svartvit flugsnappare* NT, §, trana §,

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet) och lokalt ett viktigt objekt.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling för lövskog med värdeelement. Undvik rationell skogsskötsel i dessa lövskogsområden och ytterligare hydrologisk negativ påverkan.



41.

ÖPPEN MARK ÖSTER OM GUNNARP

Naturvärdesklass: 3

Ett kuperat stenbundet objekt uppe på Linderödsåsen i anslutning till en mindre gård. Objektet genomkorsas av en kraftledningsgata. Den öppna betesmarken har ett fältskikt bestående av bl. a blålocka, blodrot, gråfibbla och ärenpris. Objektet har ingen eller ringa kvävepåverkan och betesmarken har karaktären av rödvensäng. Kulturhistoriska spår finns i form av stengårdsgårdar och odlingsrösen. Finns även en fågata i bra skick i nära anslutning till området. Purror och en del gamla utmarksträd finns också. I södra delen av objektet finns ett parti med uppvuxen bok.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng, högörtäng, betad skogsmark, trädklädd betesmark

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, stenmurar, rösen, blockrik tuvig mark, bitvis välbetad grässvål, fuktsänkor, solitära lövträd, grova vidkroniga lövträd, enbuskar, grov högvuxen gran, klen död ved

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270)

NATURVÅRDSARTER -

ARTRIKEDOM

Tämligen artrikt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng- och betesmark, Fornminne (fornåker), Riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd i betesmarkerna, undvik rationell skogsskötsel i lövskogspartierna



42. ÅS VID ÄLVHEM

Naturvärdesklass: 2

En bäckravin som på sluttningssidan består av en ur geologisk synpunkt intressant rullstensås med ädellövskog bestående av t ex. bok, ek, lind och björk. I botten av ravinen löper Kvesarumsån och området finns en anlagd damm. Hassel, ask, avenbok, bok och ek förekommer i buskskiktet. Det finns en del spärrgreniga grova träd och en mycket riklig förekomst av stubbskottsföringrad lind. Arter som trivs på den kalkrika marken är grönvit nattviol, tandrot, kärrfibbla, vänderot och hagfibbla. Norr om sluttningen finns en örtrik äng som är en gammal inägomark som idag kan betecknas som en svagt hävdad betesmark med arter som gråfibbla, gulmåra, jungfrulin, tjärblomster, gökärt och åkervädd. Området hyser förutom ett rikt fågelliv även ett bra habitat för klövvilt och rikligt med jungfrusländor. Området är även intressant för det rörliga friluftslivet. Vanliga arter i fältskiktet var svärdsilja, humleblomster, hallon, skogsklöver, skogskovall, ärenpris, teveronika, blåmunk. På sluttningarna var liljekonvalj och skogsbingel vanliga.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellöv, grusås, igenväxningsmark

BIOTOPKVALITET

Grova spärrgreniga bokar, död ved, vattendrag (å), tickor på högstubbar och träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, grönvit nattviol §, kärrfibbla* S, skogslind* S, tandrot* S, backsippa S §, skogsbingel S

ARTRIKEDOM

Måttlig



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom strandskyddsområde / ArtData, Nyckelbiotop, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återinsatt beteshävd, undvik rationell skogsskötsel



43. HÄGGENÄSOMRÅDET

Naturvärdesklass: 3

En trädklädd kulle i ett omgivande öppet beteslandskap. Kullen har ett nästan parkliknande utseende. I gränsen åt öster flyter Kvesarumsån förbi. Kullen hyser ett stort antal stora ekar och lindar men även andra lövträd förekommer. De flesta ekarna är vitala och saknar skador som gör dem biologiskt värdefulla för exempelvis insekter och kryptogamer. Gott om hässle. Det verkar inte bedrivits något bete på marken i senare tid. Floran är ganska trivial. Ett rikt fågelliv noteras.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog

BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, död ved, rönn, apel, rinnande vattendrag (å), solbelysta gamla träd, främst ek, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp -

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN.

ARTRIKEDOM

-

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekad strandskydd / Riksintresse naturvård & friluftsliv

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel, spar gamla träd och död ved.



44.

FÄLAD VID LUDVIGSBORG

Naturvärdesklass: 2

En fäladsmark som i de västra delarna består av delvis stenbunden och kuperad hagmark. Trädskiktet består av ek, björk, ask, asp och rönn. Buskskiktet består av en, björksly, hagtorn, hassel, slån och enstaka fläder. I fältskiktet finns t.ex. gökärt, jungfrulin, blåklocka, ängsvädd, blodrot, brunört, blåtåtel, luddtåtel, gråfibbla, backtimjan, gulmåra, käringtand, ärenpris, borsttåg och humleblomster. På de högst belägna delarna finns en torrängsdominerad flora. Hävden är god och kvävepåverkan är ringa. Den östra delen består av en igenväxande, stenbunden, före detta betad al- och björksumpskog med representativt fältskikt.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, igenväxningsmark, torräng

BIOTOPKVALITET

Odlingsrösen, stenmurar, stenbunden mark,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030, 6270)

NATURVÅRDSARTER -

ARTRIKEDOM -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fornlämning fossil åkermark / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd på igenväxande marker, röjning av uppväxande lövsly



45.

ODLINGSLANDSKAP VID RINGSBORG

Naturvärdesklass: 3

Öster och sydost om Ringsborg finns ett odlingslandskap med ekhagar, sumpskogar, trädfria betesmarker och våtmarker. Det finns gott om ekar, men de flesta är vitala och saknar skador och strukturer som gör dem biologiskt värdefulla för exempelvis insekter och kryptogamer. En handfull gamla ekar med biologiskt intressanta skador och håligheter finns spridda i området, ibland inväxta i tätare vegetation. Från ängs- och betesmarksinventeringen anges flera naturvårdsintressanta växter, bland annat backsippa, svinrot och knägräs. I våtmarkerna finns förutsättningar för grodor och salamandrar samt andra vattenanknutna djur och växter. Närmast Ringsborg finns en nyckelbiotop med ek och gamla lindar.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Betesmarker, svåmlövskog, våtmarker, ädellövskog.

BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, gamla björkar, bete, ihåliga ekar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ris- och gräshedar nedanför trädgränsen 4030, fuktängar med blåtåtel och starr 6410, trädklädd betesmark 9070.

NATURVÅRDSARTER

Backsippa VU, §, skogslind S, storrams S, svinrot N, knägräs N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekade / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd, friställning av gamla träd som står inväxta.



46.

EKHAGE VID ENEBACKSVÄGEN

Naturvärdesklass: 2

En stenbunden och välhävad ekhage finns söder om Enebacksvägen. Flera av träden är gamla men inte så grova. Några av dem har håligheter och skador som är gynnsamma för vedlevande arter. Utöver ek finns även hagmarksbjörkar, aspar och enbuskar. Norr om vägen finns en igenvuxen betesmark där det åtminstone tidigare funnits backsippa.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädklädd betesmark, svämlövskog, sandstrand.

BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, gamla björkar, död ved av ek och björk, sandblottor, bete, exponerad strand med fuktig sand och organiskt material.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000): -

NATURVÅRDSARTER

Philonthus rubripennis VU, gulsparv VU, bokarv VU, Thanatophilus dispar NT, oxtungssvamp NT, ekticka NT, mindre hackspett NT, gröngöling NT, spillkråka NT, §, större vattensalamander §, skärmstarr S, vattenbi N, knägräs N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fulltofta gård Naturreservat, Fulltofta Natura 2000 habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA) / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan.



47.

STRANDSKOG VID FULLTOFTA-HÄGGENÄSET

Naturvärdesklass: 2

Strandskog som sträcker sig utmed Ringsjön från Fulltofta upp till Häggenäset. Trädskiktet utgörs i huvudsak av klibbal, björk, ask, sälg, ek, asp, rönn och i mindre utsträckning skogsalm. I buskskiktet finns bland annat hassel, brakved och vide. Det finns gott om död ved, bland annat av alm och ask, men också av klibbal och björk. Huvuddelen är klen, men det finns även grov död ved av olika slag. Bland ask och ek finns även ett antal grova och gamla träd, men huvuddelen av träden är klena till måttligt grova. Jordmånen är åtminstone fläckvis näringsrik med skogsbingel, gulplister, storrams och lundelm (gräs). Kring Häggenäset finns fynd av den mycket sällsynta växten gullstånds. På några grova ekar växer grå skärelav och ett par av ekarna är ihåliga med förutsättningar för hålträdslevande arter. Det finns goda förutsättningar för svampar och insekter knuten till död ved. Området har även ett värde för fågelfaunan.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Svåmlövskog, ekskog



BIOTOPKVALITET

Stor areal, gamla ekar, ihåliga ekar, gamla björkar och klibbalar, grova askar, död ved av ek, ask, klibbal, skogsalm och björk, näringsrik jordmån.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Svåmlövskog 91E0.

NATURVÅRDSARTER

Skogsalm* CR, ask* EN, gullstånds EN, grå skärelav* S, storrams S, myskbock S.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom Fulltofta gård Naturreservat och delvis inom Fulltofta Ringsjön Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), Strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Friställa grova hagmarksträd i övrigt främst utveckling genom naturlig dynamik.

48. NUNNÄS GRAVFÄLT

Naturvärdesklass: 2

Säregt gravfält från järnåldern med domarringar, skeppssättningar och andra resta stenar. På gravfältet växer flera mycket gamla ekar varav ett antal är ihåliga med mulm. Jordmänen är sannolikt ganska mager för träden är tillsynes senvuxna och krumma. På de gamla trädens bark växer sällsynta lavar och i trädens håligheter lever den ovanliga läderbaggen tillsammans med andra sällsynta skalbaggar som bland annat gulbent kamklobagge och den mycket sällsynta klubbhornsbaggen *Batrisodes adnexus*. Tårticka är en sällsynt svamp som också finns på de gamla ekarna. Området betas av får.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Trädbärande betesmark.

BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, ihåliga ekar med mulm, blottad ved, beteshävd.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070.

NATURVÅRDSARTER

Tårticka* EN, *Batrisodes adnexus* VU, oxtungssvamp* NT, läderbagge* NT, §, gulbent kamklobagge NT, grå skärelav* S, gulpudrad spiklav S, blankknäppare N, rödpalpad rödrock N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Malmqvist 2002.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Friställa grova hagmarksträd i övrigt främst utveckling genom naturlig dynamik.



Ett stort och mycket varierat beteslandskap med ekhagar, alsumpskogar, betesmarker, kärr och våtmarker, där den stora tillgången på äldre ekar ger karaktär åt området. Förutom ek finns det också gott om grova hagmarksbjörkar och även andra grova lövträd. Åldern på ekarna varierar och majoriteten av träden har ännu inte utvecklat de mest viktiga strukturer som mycket grov bark, håligheter med mulm, blottad ved och annat som är typiskt för mycket gamla träd. Särskilt fina och gamla ekbestånd finns dock bland annat strax norr om storkhägnet och på backarna i den centrala norra delen av området. På de äldsta ekarna växer arter som oxtungssvamp och gulpudrad spiklav. Vid en gård några hundra meter VNV om Nunnäs finns också flera gamla och ihåliga ekar med bland annat läderbagge. I buskskiktet finns hagtorn och hassel, den senare ibland gammal och grov med goda förutsättningar för vedlevande svampar och insekter. Även flera av de ingående alsumpskogarna hyser gott om död ved. I de öppna eller glest trädbevuxna betesmarkerna finns en fläckvis artrik flora med backsippa, baktimjan, borsttåg och knägräs, men även ytor som trivialiserats på grund av igenväxning. Ett litet orkidékärr med bland annat majnycklar finns i området liksom en anlagd våtmark söder om storkhägnet med ett artrikt fågelliv.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Betesmarker, svämlövskog, ekskog, våtmarker.

BIOTOPKVALITET

Lång kontinuitet, stor areal, beteshävd, grova och gamla ekar, grov ekbark, naken ved, ihåliga träd med mulm, solexponering, grova eklågor, grova björkar, lågor och högstubbar av björk, klibbal och ask, grov hassel med död ved, stenmurar, odlingsrösen, gott om blommande buskar, stenbundna betesmarker.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ris- och gräsheddar nedanför trädgränsen 4030, fukthedar med blåtåtel och starr 6410, artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 6270, artrika stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen 6230, trädklädd betesmark 9070, svämlövskog 91E0.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, stare VU, gulsparr VU, §, backsippa* VU, brokig barksvartbagge VU, gröngöling NT, §, spillkråka NT, §, baktimjan NT, majnycklar NT, §, borsttåg NT, oxtungssvamp* NT, ekticka* NT, korallticka* NT, blekticka* NT, orangepudrad klotterlav* NT, läderbagge NT, §, dvärgbägarlav* NT, gulbent kamklobagge NT, kardinalfärgad rödrock NT, grå skårelav* S, rostfläck* S, gulpudrad spiklav* S, kornig nållav* S, guldlockmossa* S, fällmossa* S, kransrams* S, skärmstarr* S, jungfrulin N, knägräs* N, stagg* N, smalknäppare N, rödpalpad rödrock N.

ARTRIKEDOM: -


OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Till stora delar inom Fulltofta gård Naturreservat, Fulltofta Natura 2000 habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), inom utpekade strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan. Friställ trängda ekar samt förbättra hävd.





Backtimjan

50.

FULLTOFTA KOHAGE MED
OMGIVNINGAR

Naturvärdesklass: 1

Ett varierat område som är påtagligt hävdpräglat med en stor förekomst av gamla och mycket gamla ihåliga och mulmfyllda ekar. Utöver ek finns björk, ask och i fuktiga delar även askklubbalkärr. I buskskiktet finns gott om hagtorn och gammal hassel, men även rikligt med hägg i fuktiga delar. Objektet omfattar både skog, ohävdade ekhagar och betade ekhagar. Några av träden tillhör Skånes grövsta och äldsta med Gäddeken, intill vägen genom området, som en av de mer kända. De gamla ekarna hyser en mycket artrik fauna och kryptogamflora med många ovanliga arter. Hit hör exempelvis saffransticka, tårticka, läderbagge, brokig barksvartbagge, kardinalfärgad rödbeck, rödbrun blekspik och matt pricklav. Området har även en rik fågelfauna med gott om hålträdlevande arter som hackspettar och stare. Även bland kärlväxter finns en del sällsyntheter som skogsveronika och bokarv. Ett antal jätteeckar av hagmarkstyp står idag invuxna i skogsmiljö och behöver friställas. Området har sannolikt ett stort värde för fladdermöss. Det finns delar av området som inte når upp till högsta klass.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädklädd betesmark, svämlövskog, ekskog.

BIOTOPKVALITET

Lång kontinuitet, grova och gamla ekar, grov bark, naken ved, ihåliga träd med mulm, solexponering, grova eklågor, grova björkar, lågor och högstubbar av björk, klibbal och ask, grov hassel med död ved, stenmurar, odlingsrösen, gott om blommande buskar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070, svämlövskog 91E0, näringsrik ek- eller avenbokskog 9160,



Gulsippa

NATURVÅRDSARTER

Saffransticka CR, §, tårticka* EN, ask* EN, sydlig blekspik EN, brokig barksvartbagge VU, skogsveronika VU, stare VU, bokarv NT, ekträdlöpare* NT, sexfläckig blombock* NT, skeppsvarfsfluga* NT, läderbagge* NT, §, gulbent kamklobagge NT, kardinalfärgad rödrock NT, rödbrun blekspik NT, matt pricklav* NT, liten söderfallslav* NT, dvärgbägarlav* NT, elegant sköldlav NT, oxtungssvamp NT, ekticka NT, mindre hackspett NT, §, gröngöling NT, §, spillkråka NT, §, skärmstarr* S, sotlav* S, guldlockmossa* S, storrams S, gulsippa S, blodsopp S, trädporella S, platt fjädermossa S, grå skärelav* S, gulpudrad spiklav* S, kornig nållav* S, gulnål* S, smalknäppare R, rödpalpad rödrock R.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fulltofta gård Naturreservat, Fulltofta Natura 2000 habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), Delvis strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan. Friställ trängda ekar!



Oxtungssvamp

51.

EKHAGE OCH STRANDSKOG VÄSTER OM GÄDDÄNGEN

Naturvärdesklass: 2

Ekhage och strandskog mellan Ringsjön och Gäddängen, där ekhagen till stora delar betas. Hävden är dock ganska svag och det finns gott om uppväxande sly. Ekarna är tämligen gamla, men flerhundraåriga ekar, sådana som finns i Kohagen nordost om detta objekt, saknas här. Flera träd har dock grov bark och skador vilket gynnar den biologiska mångfalden. Det finns även såväl stående som liggande döda ekar. Förutom ek finns även grova solexponerade björkar och grov björkved. I buskskiktet finns bland annat hassel och hagtorn. Det finns få naturvårdsintressanta kryptogamer på de gamla träden, men oxtungssvamp har noterats. Fältskiktet är överlag trivialt med undantag av delen sydost om Gäddängen. Där finns ängsvegetation med bland annat ängsvädd och knägräs. I strandskogen växer främst klibbal, björk och ask tillsammans med olika vide. En hel del död ved förekommer. På de sandiga stränderna lever den ovanliga kortvingen *Philonthus rubripennis* och asbaggen *Thanatophilus dispar*. Båda lever som rovdjur och den förstnämnda har sin enda aktuella förekomst i landet vid Ringsjön. I området, liksom i hela Fulltoftatrakten, finns gott om hackspettar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädklädd betesmark, svämlövskog, sandstrand.



BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, gamla björkar, död ved av ek och björk, sandblottor, bete, exponerad strand med fuktig sand och organiskt material.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000): -

NATURVÅRDSARTER

Philonthus rubripennis VU, gulsparr VU, §, bokarv VU, *Thanatophilus dispar* NT, oxtungssvamp NT, ekticka NT, mindre hackspett NT, §, gröngöling NT, §, spillkråka NT, §, större vattensalamander §, skärmstarr S, vattenbi N, knägräs N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Fulltofta gård Naturreservat, Fulltofta Natura 2000 habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), Delvis inom strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan.

52. GÄDDÄNGEN

Naturvärdesklass: 2

En anlagd cirka 25 hektar stor våtmark med mycket stort värde för både häckande och rastande våtmarksfåglar som måsar, tärnor och olika simfåglar. I de omgivande vassarna och buskagen häckar bland annat vattenrall, sävsparv och olika sångare. Bland särskilt intressanta häckfåglar finns svarthalsad dopping och ärta. Vattennivån sjunker ofta under sommar och höst och erbjuder tidvis fina stränder för bland annat rastande vadare. Över vattnet och de omgivande markerna jagar gott om fladdermöss.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Grund sjö / Anlagd våtmark

BIOTOPKVALITET

God solinstrålning, varierande vattendjup, bra läge nära stor sjö, förekomst av vattenvegetation.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000): -

NATURVÅRDSARTER

Arter med säkerställd eller trolig reproduktion:
Svarthalsad dopping EN, §, ärta VU, §, brunand VU, §, storspov VU, §, sävsparv VU, §, fisktärna §, trana §, törnskata §, brun kärrhök §, nordfladdermus §, vattenfladdermus §, större brunfladdermus §, trollpipistrell §, dvärgpipistrell §, gråskimlig fladdermus §.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Fulltofta gård Naturresevat, Fulltofta Natura 2000 habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA) / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan.



53.

EKHAGE ÖSTER OM GÄDDÄNGEN

Naturvärdesklass: 2

Gles ekhage med flera mycket grova ekar varav några med håligheter och mulm. Ett par träd är döda och står kvar som torrträd. I den östra delen ligger ett par mycket grova eklågor. Träden står solexponerat och har mycket goda förutsättningar för eklevande arter bland insekter och kryptogamer. På den grova barken växer ekspecialister som skuggorangelav, gulpudrad spiklav och brun nållav tillsammans med den i Skåne mycket ovanliga hjämbrosklaven. Andra ovanliga eklevande arter är oxtungssvamp och skeppsvarvsfluga. I buskskiktet finns nypon, fläder och hagtorn vilket bidrar som en värdefull pollen- och nektarkälla. Fältskiktet är inte fullt så intressant men det finns bland annat sparsamma förekomster av jordtistel och stagg.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Grova och gamla ekar, grov bark, naken ved, ihåliga träd med mulm, solexponering, grova eklågor, lång kontinuitet, stenmurar, odlingsrösen, gott om blommande buskar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070 (delvis).

NATURVÅRDSARTER

Hjämbrosklav NT, skuggorangelav* NT, dvärgbägarlav* NT, oxtungssvamp* NT, skeppsvarvsfluga* NT, jordtistel NT, mindre hackspett* NT, gulpudrad spiklav* S, brun nållav* S, grå skärelav* S, guldlockmossa* S, stagg N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och bete, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och gärna utökad beteshävd samt se till att de kommer nya efterträdare till de gamla ekarna.



54.

BETESMARKER MELLAN BLOSSEHUSEN OCH RINGSJÖN

Naturvärdesklass: 3

Omväxlande beteslandskap där stora delar tidigare varit odlingsmark. Markerna är huvudsakligen kultiverade. Längre beteskontinuitet finns främst längst i sydväst och längst i öster. Bland hävdgynnade kärlväxter finns i dessa delar förekomster av ljung, gråfibbla, liten blåklocka, backtimjan, revig blodrot, stagg och knägräs. I övrigt är florin mer trivial. Betesmarkerna är mosaikartade med öppna gräsmarker, betad klibbalskog, solitära björkar och ekar, våtmarker samt betade strandängar. I de betade skogarna finns bland annat hagtorn och gott om död ved som båda utgör goda förutsättningar för vedlevande organismer. Både hagtorn och nypon är vanliga i de öppna betesmarkerna. Jordmånen är överlag sandig och det finns fläckar med blottad sand. Området har även ett värde för fågellivet.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Fuktäng, gräshed, betesmark

BIOTOPKVALITET

Betesmark med kontinuitet (delvis), betesmark, blottad sand, död ved av klibbal, odlingsrösen, stenmurar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ris och gräsheddar nedanför trädgränsen 4030, fuktängar med blåtåtel eller starr 6410. Dessa förekommer i mindre utsträckning.

NATURVÅRDSARTER

Revig blodrot* VU, pilblad* NT, backtimjan* NT, stagg* N, knägräs* N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd längs sjön / -



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd med prioritering på betesmarkerna med lång kontinuitet.



55.

GROVA EKAR NORR OM HÖRBY RINGSJÖSTRAND

Naturvärdesklass: 2

Gamla grova ekar och askar på sandig strandnära mark. Huvuddelen av dem står i en öppen och hävdad betesmark, men ett mindre antal, varav även några grova bokar, står i mer skogdominerad mark i sydväst, strax norr om sommarstugorna. Träden har grov bark och några av dem är ihåliga med mulm. Det finns även lågor av några gamla ekar som nyligen fallit. På träden växer flera ovanliga kryptogamer, bland annat den starkt hotade arten sydlig blekspik på en ask i norr. Det finns goda förutsättningar för en intressant insektsfauna knuten till de gamla träden. Värdet är knutet till de gamla träden medan fältskiktet har ett begränsat värde.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Grova, gamla och solexponerade ekar, grova och gamla askar, grova bokar, lågor av ek, grov bark, naken ved, ihåliga träd med mulm, blottad sand.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, sydlig blekspik* EN, ekticka* NT, grå skärelav* S, guldlockmossa* S, brun nållav* S, gulnål* S, kornig nållav* S, guldlockmossa* S, bålgetingkortvinge* N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekad strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Friställning av inväxta ädellövträd norr om sommarstugorna samt fortsatt beteshävd.



56.

STRANDSKOG NORR OM RINGSJÖSTRAND Naturvärdesklass: 3

Strandskog med al, ask, björk, pil, ek och hägg utmed Ringsjön. Fläckvis rena klubbalsbestånd annars blandat. Det finns gott om död ved av i första hand al men även en del ask. Veden ger förutsättningar för vedlevande arter. På alved växer den rödlistade svampen stor sotdyna. Floran på den sandiga jordmånen är frodig med vinbär, humle, kirskål, blekbalsamin, nejlikrot och älggräs. Värdet är främst knutet till den naturliga dynamik som finns i skogen och förekomsten av naturvårdsarter.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Återkommande översvämning, lågor och högstubbar av al, lågor och högstubbar av al, mycket gott om klen ved, alsocklar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Svämlövskog 91E0

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lundelm* S

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekad strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling.



57.

GROVA ÄDELLÖVTRÄD NORR OM OSBYHOLM

Naturvärdesklass: 2

Varierat lövträdsområde med rikligt av grova ädellövträd av i första hand ek. Särskilt grova och högvuxna träd finns i den södra delen, där det också finns gott om grova träd av bok, ask, lönn och lind. Där finns också ihåliga träd med mulm och gott om grov lövträdsved, både liggande och stående. I norra delen, som till stora delar betas, är skogen mer igenväxt, bland annat med gott om hassel. Här finns också grova ekar. Längst i norr finns en liten ekhage med flera gamla ekar. Jordmånen är överlag näringsrik och det växer gott om både storrams och kransrams, särskilt i söder. Bland arter knutna till gamla ekar finns bland annat korallticka och gulpudrad spiklav. På avbarkade gamla ekar finns utgångshål av den rödlistade skalbaggen skeppsvarvsfluga. Det finns gott om gamla ekstubbar i området.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Hassellund, ädellövskog, trädbärande betesmark.

BIOTOPKVALITET

Grova och gamla ekar, grova och gamla askar, grova och gamla lönnar, grova och gamla bokar, lågor av ek, grov bark, naken ved, ihåliga träd med mulm, blottad sand, beteshävd.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070 (delvis)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, stiftklotterlav* NT, korallticka* NT, ekticka* NT, skeppsvarvsfluga* NT, dvärgbägarlav* NT, guldlockmossa* S, grå skärelav* S, lundelm* S, tvåfläckig smalpraktbagge* N.



ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd i norr / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Friställning av inväxta jätteeckar, fortsatt och gärna utökat bete.



58.

ÄDELLÖVSKOGAR VID FULLTOFTA NATURCENTRUM

Naturvärdesklass: 2

Ädellövskogar och hagmarker kring Fulltofta Naturcentrum, som är ett besökscentrum för friluftsliv i området. Många stigar utgår härifrån till omgivande skogsområden. Inom objektet finns flera värdefulla ädellövskogar. Ofta rör det sig om grov ädellövskog av bok och ek med förekomst av en del grov död ved. Det finns också askkärr, alkärr och bäckdalar (Brinkesholmsravinen) med rikare flora. Totalt sett är variationen stor i mängden av olika skogsbiotoper. Nyckelbiotoperna innehåller många grova gamla bokar och en del ekar samt död ved. Askarna håller på att dö av, med många torrträd och lågor som följd. Dessa värdekärnor är också trädslagsrika, mer olikåldriga och skiktade. Överlag är fältskiktet örtrikt. Längst i väster finns en relativt välbetad men gödslad stenbunden trädklädd hagmark med ek och hassel. Förekomst av flera naturvårdsarter, bland annat av kärlväxter, lavar, svampar och inte minst skalbaggar på grova rötskadade bokar. Det finns också kulturspår med gamla rösen och fågata.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, hagmark av ek-lindtyp, askkärr, klubbalkärr, våtmark

BIOTOPKVALITET

Allsockel, alhögstubbe, allåga, grova bokar och ekar, jätteträd, grova högstubbar och lågor, rötskadade grova ädellövträd, grov hassel, bäckdal, diken, stenmurar, rösen, asktorrträd, asklågor, källmark, hagtorn, rönn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9130).



NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skogsalm* CR, lind* S, stor häxört* S, gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, sårlåka* S, bäckbräsma* S, dvärgbägarlav* NT, stiftklotterlav* NT, guldlockmossa* S, blågrå spindling VU, dustersopp NT, liten stinksvamp* S, mindre hackspett NT, §, Plectrophloeus nubigena NT, större sågsvartbagge NT, Erotides cosnardi VU, Synchronita variegata NT

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Natura 2000-område (delvis) / ArtData, nyckelbiotoper, objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete av hagmark. Spara död ved och gynna grova träd.

59.

VÅTMARKSOMRÅDE VID MJÄLASTRÖ

Naturvärdesklass: 2

Mosaikartat våtmarksområde med svärgenomträngliga videsnår, vasshav, igenväxande högörtängar och lövsumpskog i kantonerna. Centralt finns också en anlagd våtmark (viltvatten) med vattenspeglar och talrika öbildningar. Värdefullt objekt för häckfåglar och trollsländor. Talrika viltstigar och legor vittnar också om ett vilttrikt objekt.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Småvatten / Våtmark, videsnår, björksumpskog

BIOTOPKVALITET

Öppna vattenytor, öar, videbuskar, ytor med kaveldun, säv och vass, diken, björkhögstubbar, lövtorrträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6430, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Kungsfiskare* VU, §, sävsparv VU, §, gröngöling NT, §, buskskvätta NT, §, hartmanstarr VU

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehålla öppna vattenytor i våtmarken. Spara uppkommen död ved.



60.

BETES- OCH LÖVSKOGLANDSKAP VID MJÄLASTRÖ

Naturvärdesklass: 3

Variationsrikt betes- och lövskogslandskap. De nötbetade markerna är mest igenvuxna med björnbärssnår och unga alar. Det finns dock smärre ytor kvar med mer öppen enefälad och stenbunden relativt välbetad mark. Vegetationen är dock tydligt näringsgynnad och florin ej särdeles artrik. I objektet finns också betad medelåldrig alskog, och i den nordöstra delen ett skogsobjekt med mycket grova ädellövträd, främst gamla bokar. Inga särskilda naturvårdsarter noterades. Sammantaget ändå ett värdefullt mosaiklandskap av betesmarker, grova ädellövträd och partivis rika kulturlämningar.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, trädbärande hagmark, betad alskog, bokskog av örtrik typ

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova vidkroniga bokar och ekar, grova ektorrträd, enbuskar, grov rötskadad björk, solitär apel och hagtorn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9070, 9130).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Röjning av björnbärssnår och uppkommande lövsly.



61. KÄLLMARK OCH ÄDELLÖVSKOG SÖDER OM MJÄLASTRÖ

Naturvärdesklass: 2

Örtrik frisk till fuktig blandädellövskog på rik mark samt askkärr och bäckdal i svag sluttning. Översilad källmark och en kanaliserad bäckfåra är objektets kärnområde med många värdelement och en mycket hög artrikedom vad avser krävande lundväxter. Så växer gulsippa och skogsbingel rikligt täckande stora delar. Vitsippa, svalört, gulplister, skogsstarr, dvärgvårlök, skogsbingel är vanliga arter i fältskiktet. Blandädellövskogen är skogligt påverkad, men där finns äldre ädellövträd och flera värdefulla värdeelement som grova lågor och högstubbar av bok. Rik trädslagsblandning med förekomst av ask, bok, avenbok, lind, ek, vårtbjörk, klibbal, säl, skogsalm, ap, och vårtbjörk. Hassel, benved och hagtorn i fältskiktet. Förekomst av rödlistade svampar, lavar och kärlväxter. Mycket högt artvärde. Området korsar en smärre grusväg som utgör bland annat promenadväg för friluftslivet.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Askkärr, blandädellövlund, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Översilad källmark, grov död lövved, blöta lågor, torrträd, mossblock, bäckdrag, bäckdal, dike vid grusväg, grova röttskadade bokar, grova asklåg, bok- och björklåg

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt skogstyp i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Sydlig sotticka* VU, lindsål* S, dvärgbägarlav* NT, desmeknopp* NT, skogsbräsa* S, ask* EN, skogsalm* CR, lind*, tvåblad* S. §, storrams* S, gulsippa* S, myskmadra* S, tandrot* S, ormbär* S, lundstjärnblomma* S, kärrfibbla* S, västlig husmossa* S, gullpudra* S, bäckbräsa* S, mörk lungört* S, skärmstarr* S, blåsippa* S, vätteros* S, strutbräken* S, skogsduva* S, §, nötkråka* NT, §, liten brunbagge NT, grönvit nattviol §

ARTRIKEDOM

Mycket hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationell skogsskötsel och negativ påverkan på hydrologin samt körsador.



Gullpudra



Variationsrikt större ädellövskogsområde som domineras av äldre och tidigare gallrade pelarbokskogar i de centrala och norra delarna, medan blandädellövskog, hässlen och fuktiga ask-alskogar finns mest i de västra och norra delarna. Pelarbokskogen är högvuxen och ganska homogen, ställvis med rikliga uppslag av bokföryngring. Bokhögstubbar med lågor finns spritt men ganska sparsamt. Talrikt med gamla rösen, och fågata. Nyckelbiotoperna innehåller många grova gamla bokar och en del grova vidkroniga ekar samt död ved. Askarna i fuktskogarna håller på att dö, med många torrträd och lågor som följd. Dessa värdekärnor är också artrika i trädskiktet, mer olikåldriga och skiktade. Förutom ask ingår även lind relativt rikligt medan alm förekommer endast sparsamt. Grov hassel förekommer på smärre ytor. Överlag kännetecknas skogarna av en örtrik vegetation. Objekt med förekomst av ett antal naturvårdsarter, bland annat kärlväxter och vedsvampar. De norra delarna med nyckelbiotoper kan bedömas ha ett högre naturvärde än genomsnittet i objektet. Betydelsefullt strövområde med flera stigsystem.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, blandädellövlund, ask-alskog, askkärr

BIOTOPKVALITET

Alsoskel, alhögstubbe, allåga, grova bokar och ekar, jätteträd, rötskadade lövträd, grov hassel, bäckdal, diken, stenmurar, rösen, asktorrträd, asklågor, källmark,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9130, 9160).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skogsalm* CR, lind* S, stor häxört* S, gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, korallticka* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Naturresevat, Natura 2000-område / ArtData, nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Lämna stora delar av objektet för fri utveckling. Delar av objektet kan utredas för småskalig veteranisering, som redan utförts i ekskogen västerut.





63.

FÄLADER VID LANDERÖD

Naturvärdesklass: 2

Ett stort och mosaikartat beteslandskap med ekhagar, träd fria betesmarker, enefälader, alsumpskogar, små bäckar och våtmarker. Stora sammanhängande arealer med beteshävdad mark är idag sällsynt och därför särskilt värdefullt. Vissa av markerna har lång beteshistorik medan andra har kultiverats eller påverkats på annat sätt under senare tid. Huvuddelen av markerna hävdas genom bete, men det finns även ohävdade delar exempelvis vissa alsumpskogar och ekdominerade skogar i de centrala delarna. Det finns gott om äldre lövträd av ek, ask och al. Längst i norr finns en svagt hävdad ekhage med flera mycket grova ädellövträd med artrik kryptogamflora, men med en trivial kärlväxtflora. På de äldsta träden växer rödlistade kryptogamer som oxtungssvamp och skuggorangelav. I andra betesmarker finns exempelvis jungfrulin, backtimjan, hirsstarr, stagg och knägräs. Förekomsterna är dock ofta små och glesa. Spår av de sällsynta skalbaggarne skeppsvarvsfluga och tvåfläckig smalpraktbagge har också påträffats på gamla ekar. En nyckelbiotop finns i nordost.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, alsumpskog, kultiverad betesmark, småvatten

BIOTOPKVALITET

Grova och gamla ekar, grov bark, naken ved, ihåliga träd med mulm, solexponering, gammal och grov ask, låga av ask, klibbalsockel, död ved av klibbal, lång kontinuitet, stenmurar, odlingsrösen, stor betesmark.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070 (delvis).



NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, oxtungssvamp* NT, liten sönderfallslav* NT, skuggorangelav* NT, dvärgbägarlav* NT, skeppsvarvsfluga* NT, backtimjan NT, guldprad spiklav* S, rostfläck* S, grå skärelav* S, lönnlav* S, kornig nållav* S, jungfrulin N, kransrams* S, storrams* S, hirsstarr N, stagg* N, knägräs* N, blågetingkortvinge* N, tvåfläckig smalpraktbagge* N, gulringad vedharkrank NT, rödhornad mulmstyttfluga VU, Carphacis striatus VU, Thamiaraea hospita NT, skeppsvarvsfluga NT, Triplax rufipes NT, silversmygare NT, smådopping* N, §, mindre hackspett NT, §

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom strandskydd / Äng och bete, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och gärna utökad beteshävd samt se till att de kommer nya efterträdare till de gamla ekarna.



64.

GAMLA EKAR VID BLOSSEHUSEN-LAGNEHUS

Naturvärdesklass: 2

Ett trettiotal grova ekar utmed landsvägen och i angränsande betesmark samt trädgård. Träden är mycket gamla med grov bark, håligheter och mulm. Flera sällsynta arter är påträffade på och i de gamla träden. Hit hör exempelvis de hålträdlevande skalbaggar kardinalfärgad rödrock och gulbent kamklobagge samt kryptogamerna oxtungssvamp och gulpudrad spiklav. Kärnväxtfloran i betesmarken är av mer begränsat värde.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, jätteträd

BIOTOPKVALITET

Grova och gamla ekar, grov bark, naken ved, ihåliga träd med mulm, solexponering.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070 (delvis).

NATURVÅRDSARTER

Kardinalfärgad rödrock NT, gulbent kamklobagge NT, skalbaggen Aniyus rubens NT, oxtungssvamp* NT, ekticka* NT, gulpudrad spiklav* S, grå skärelav* S, blankknäppare N, skalbaggen Nemadus colonoides N, rödpalpad rödrock N, smalknäppare N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom strandskydd / Malmqvist 1999, Malmqvist 2004.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel av de gamla träden, fortsatt beteshävd samt se till att de kommer nya efterträdare till de gamla ekarna.



Oxtungssvamp



65. SKÄLÄNGEN OCH SKILJEHUSEKEN

Naturvärdesklass: 2

En ädellövskog på kalkrik mark bestående av bl.a. ek, lind, avenbok och bok som till en viss del är spärrgreniga och bukettväxande. Ett visst inslag av trivallöv som björk förekommer. Området är fuktigt till karaktären och fläckvis bestående av mindre alsumpskogar. Några bäckar rinner igenom området. Det finns gott om högväxta hasselskogar i det bitvis täta buskskiktet. Fältskiktet består bl.a. av storrams, kransrams, skogbingel, liljekonvalj, skogsnycklar, humleblomster, humle m.fl. Ett rikt fågelliv med bl.a. gransångare, gärdsmyg och svarthättv förekommer. Dessutom finns ekoxe i området. Ett antal stengårdsgårdar ramar in området som bl.a. gränsar mot granplanteringar. Förmodligen har marken varit gammal hagmark som fått växa igen. I nordost finns en liten skog av hassellundskaraktär. En grov, döende ek som är lämnad som naturminne finns i östra hörnet av området. Eken är minst 250 år gammal och har stor betydelse för den lägre faunan även som döende och får inte röras. Nedfallna grenar och stamdelar får heller inte upparbetas eller på annat sätt förstöras. Den ovanliga sotlaven förekommer på trädet.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog, klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Grov gammal ek, rötskadade träd, torrträd, klen död ved, högstubbar, rotvältor, lågor, lövsocklar, hässle, stillastående vatten,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura-2000 naturtyp (9020)

NATURVÅRDSARTER

Lind* S, kransrams S, skogsnycklar* S, §



ARTRIKEDOM

Tämligen artrikt (fågelliv)

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd / ArtData, Skyddsvärda träd, nyckelbiotop naturminne, nyckelbiotop ädellövskog,

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk negativ påverkan, friställning av inväxta ädellövträd (ek)





Skiljehuseken

Mosaiklandskap av alsumpskogar, betade björk- och ekhagar samt enefälader under kraftledning. Rik förekomst av vidkroniga grova ekar och bokar. Åtskilliga gamla björkar och även en spridd grupp av grova solitära tallar i hagmarken. Många blommande buskar av hagtorn och rosor samt väl utvecklade solexponerade bryn. Rikligt med enbuskar på enefäladen och väl utvecklad tuvad grässvål i betesmarkerna. Blomrika marker av backtimjan, rotfibbla och stenmåra. I alsumpskogar korsande smärre vattendrag och partier med översilade källmark. Gott om hagtorn i alskogarna. Förekomst av flera intressanta naturvärdarter. Förekomst av granplanteringar, men bara i smärre ytor inom objektet.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalskog av översilningstyp, björk- och ekhagmark, enefälader, vattendrag, källmark

BIOTOPKVALITET

Grov vidkronig bok, ek och tall, gammal vidkronig björk, ektorrträd, grova solexponerade björk – och eklågor, blomrika bryn med olvon, hagtorn, hassel, enbuskar, blomrika välbetade grässvålar, blockrik tuvig mark, översilad källmark, blöta lågor, vattendrag, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9020).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, kärrfibbla* S, bäckbräsmå* S, skärmstarr* S, rankstarr* S, humlekortvinge* VU, lackticka* N, hagtornsfjäril* N, backsippa VU, § (troligen utgången), slättergubbe VU, § (troligen utgången), fiskgjuse* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Röjning av igenväxta delar av betesmarken.



67.

HAGMARKER VID SKOGAHUSET-BODDAHUS

Naturvärdesklass: 2

Smärre mosaikområde och topografiskt småbrutet objekt bestående av betes- och våtmarker med ingående lövskogar. De betade markerna i den sydöstra delen har generellt en god hävdstatus. Stora ytor utgörs av välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark med lågvuxen ljung, stagg och gökärt samt till och med enstaka slättergubbar. Det finns också stora ytor i den centrala och norra delen som är igenväxande med buskar, björnbär och högt gräs. Lövsly etablerar sig där snabbt och gräset samt örnbräken är högvuxet. Få ytor med tydligt näringspåverkad vegetation, och då främst i den norra delen. Inslag finns av smärre betade fuktängar och högörtängar i terrängsvackor. Totalt sett förekommer många solitära grova träd av en mängd olika trädslag, främst ek, gran och tall. Även förekomst av grova hasselbuskar, apel, rönn och sälg. En anlagd våtmark ligger längst söderut i objektet och tillför värden för fågellivet och trollsländefauan. Gott om stenmurar och gamla odlingsrösen.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, trädbärande hagmark, betad alskog och aspskog, fuktäng, högörtäng, öppen våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, stenmurar, stenrösen, vidkroniga grova löv- och barrträd, grov eklåga, talltorrträd, sälg, äldre hassel

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 6430, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §



ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och putsning av igenvuxna partier av örnbräken och täta utbredda björnbärssnår. Ingen konstgödning.



Ett varierande område med bitvis stenbunden betesmark. Området har ett stort antal välbevarade odlingsrösen samt några välbevarade stengårdsgårdar och en fågata. I den nordöstra delen finns en gammal torvvandring - ett redskap som härstammar från tiden då man bröt torv. I den stenbundna delen av betesmarken förekommer bl.a. jungfrulin, stenmåra, ärenpris, brunört*, liten blålocka* och gökärt. I betesmarken finns en del solitära björkar samt några enstaka bokar. I områdets norra del finns en mosse med ett välutvecklat laggkärr med arter som ängsull*, kärrsilja*, flaskstarr*, vitmossa*, småsileshår*, ljung, tranbär och dystarr. Större delen av mossen är fortfarande öppen men björksly börjar växa in. I de torrare delarna av laggkärret har snärjmåra, trådtåg och buskviol noterats. Även kärrspindel har observerats. Fågelrikt område med bl.a. stenskvätta och hackspett. Områdets belägenhet precis intill väg 22 och i en annars barrskogsdominerad region gör att det har ett värde för landskapsbilden.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Björkmosse

BIOTOPKVALITET

Stenbunden betesmark, rösen, stenmurar, fågata, solitära träd, bokhögstubbar, torrakor, död ved

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i landskapet och förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 6270)

NATURVÅRDSARTER

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet) och lokalt ett viktigt objekt



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fornlämning, fossil åker / ArtData, Ängs- och betesmark,

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd, undvik rationell skogsskötsel i objektets lövskogar och hydrologisk negativ påverkan



69.

FÄLAD NORR OM STAVRÖD

Naturvärdesklass: 3

Liten igenväxande fälad som ligger mellan odlade marker i utkanten av gamla Stavröds by uppe på Linderödsåsen. Objektet har troligtvis slåttrats tidigare. De betade markerna varierar till sin karaktär, från ganska sluten björkhage till helt öppen mark. För övrigt finns det en del nypon och några frivuxna ekar och björkar. En del ganska grova hässlebuketter förekommer. Det lilla området är inringat av stengårdsgårdar i sämre skick. Slätter- och hävdberoende arter som svinrot, slättergubbe och jungfrulin har noterats. Bland övriga arter kan nämnas ängskovall, gökärt och gråfibbla.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Igenväxningsmark / Trädbärande betesmark, björkhage, hässlebuketter

BIOTOPKVALITET

Delvis välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, diken, stenmurar, rösen, hässlebuketter,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe VU, §, ask* EN,

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helts utökad beteshävd. Röjning av igenvuxna partier.



70. ODLINGSLANDSKAP VID EKERÖD

Naturvärdesklass: 2

Välbetade betesmarker med inslag av bokskog och våtmarker i kuperad terräng. Förekomsten av grova torrakor är förhållandevis stor. En hel del odlingsrösen och stengårdsgårdar i varierande skick förekommer inom området samt en älvkvarn från forntiden i söder. Betesmarken har i norr karaktären av en enefälad med enbuskar och björk. Marken har en representativ flora där bl.a. blåtåtel*, slåttergubbe, grönvit nattviol, gökärt*, liten blåklocka*, borsttåg* och stagg* har noterats. I området finns en hel del fuktstråk och en igenväxande mindre mosse där mossvegetation, kråklöver, frossört, vattenklöver, strandlysning, älggräs, tuvull och gräsull förekommer. Marken är ogödslad. Trädskiktet är glest och innehåller främst ek och björk. En hel del gamla och spärrgreniga utmarksbokar förekommer. I öst finns en fin äldre bokskog med lite inslag av gran som nyligen gallrats och bokföryngring växer fram i täta bestånd. En del smårönnar förekommer också. Arterna i fältskiktet växer glest och är av trivial sort. En hel del våtmarker, bäckar förekommer inom objektet.

Längst i söder finns det ett mindre område med bokskog i varierande ålder samt mindre betesmarker med trivial flora. I bokskogen är de största träden i 100-årsåldern. Området har utvecklats fritt och i det blyga fältskiktet förekommer bl. a. gulplister och ekorrbär. Här har den rödlistade laven kupig skrynkellav tidigare noterats. Här finns också en äldre stenlagd valvbro och en gammal jordkällare. Området är fågelrikt och det observerades mycket rovfågel (glada och ormvråk), nötskrika, hackspett, stenskvätta, morkulla samt klövvilt. Skåneleden går i anslutning till områdets norra delar vilket ökar områdets rekreations- och fritidsvärde.





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Björkmosse, blandskog, träd bärande hagmark, enefälad, öppna våtmarker

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, spärrgreniga bokar, grova torrakor, stenmurar, rösen, betad skog, våtmark, mosse,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270, 5130, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Stare VU, hussvala VU, gröngöling NT, sånglärka NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningen

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Artdaten, ängs- och betesmark, objekt med naturvärde,

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd i betesmarkerna. Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan på mossen

71. ÄDELLÖVSKOG NORR OM EKERÖD

Naturvärdesklass: 2

Högvuxen äldre och grov bokskog på långsträckt åsbildning. Skogen är påverkad av gallringar, men är ändå relativt olikåldrig och ställvis flerskiktad. Inslag finns av ask, ek, lind, skogslönn och sykomorlönn. Fältskikt av fryletyp, men där finns spridda ytor även av lågört med vitsippa. Överlag sparsam förekomst av död ved, men inslag finns av rötskadade stammar och några riktigt grova bokhögstubbar med tillhörande lågor. Småskalig täktverksamhet har påverkat åsen på flera platser, och en väg korsar den västra delen. Åsbildningen vetter söderut mot öppna åkrar, och brynen är där solbelysta, vilket kan gynna insektslivet. I svacka norr om åsen ansluter fuktigare blandlövskog med ställvis mycket död ved. Den hasselrika askdominerade bland-lövskogen är medelåldrig till äldre och högvuxen. Trots tidigare dikningar finns höga värden och mängder med lågor och torrträd, främst av ask, men även björk, sälg och rönn. Viss översilning förekommer ännu. Floran är dessutom rikare med skogsbingel, lungört och lundstjärnblomma. Inslag finns av grövre bokar och ekar i de friskare kantzonerna. Sammantaget ett värdefullt lövskogsområde vars naturvärden kan bli än högre med frånvaro av skogsbruk.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, askkärr



BIOTOPKVALITET

Grova bokar, senvuxna bokar, grova bokhögstubbar, boklågor, ektorrträd, eklågor, fnösketickor, asklågor, asktorrträd, stenmurar, odlingsrösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, lundstjärnblomma* S, mörk lungört* S, skärmstarr* S, mindre hackspett* NT, §, skogsduva* N, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Spara död ved och låt skogsdiken växa igen.

72.

KULTURLANDSKAP VID KYLESTORP

Naturvärdesklass: 3

Mosaiklandskap av alsumpskogar, alkärr, björkhage samt enefälad med öppen stenbunden mark. Alsumpskogen är äldre och har lövsocklar. Där förekommer död ved och några signalarter för skyddsvärd skog. De betade markerna varierar till sin karaktär, från ganska sluten björkhage, via glest hässle och mer öppen enefälad till helt exponerade fuktsänkor och gammal åker. Generellt välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark. Tydligt näringspåverkad vegetation och inga särskilda hävdgynnade arter noterades, varför naturvärdet inte bedöms vara högt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmarker, björkhage, hässle, klubbalkärr

BIOTOPKVALITET

Vidkronig ek, grov hassel, solexponerade bryn med hagtorn, slån och enbuskar, välbetad grässvål, blockrik tuvig mark, fuktsänkor, diken, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 9070, 9080), men med överlag låg bevarandestatus.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, missne* S, rankstarr* S, vanlig groda* §

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.



73.

BETESMARKER VID SATSERUP

Naturvärdesklass: 2

Beteslandskap norr om Satsrup. De betade markerna varierar till sin karaktär, från ganska sluten björkhage via öppen enefälad till helt exponerade fuktsänkor och gammal åker. Generellt välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark. Tydligt näringspåverkad vegetation i de norra delarna och något lägre naturvärde där, men i princip ogödslad naturbetesmark i de södra mest värdefulla delarna med rik flora och förekomst av flera hävdgynnade arter. Sammantaget ett värdefullt objekt.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, enefälad, björkhage, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, torrbackar, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, enebuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, granspira* NT, backtimjan* NT, borsttåg* NT, jordtistel* NT, gröngöling* NT, §, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Rójning av igenvuxna partier, främst i fuktigare enbuskmarker.



74.

BETESMARKER SÖDER OM KYLEGÅRDEN

Naturvärdesklass: 2

Betesmarkslandskap med anslutande vattendrag och omgivande alskogar. De betade markerna är generellt sett mycket välbäddade. Stora ytor har välbäddad grässvål och stenbunden tuvig mark med lågvuxen ljung. Tillsammans med den lätt kuperade topografin, från små björkkullar till fuktsänkor, och de många solitära grova träden är det ett mycket naturskönt objekt. Vegetationen i delar av betesmarken verkar dock vara näringsgynnad med en trivialare flora. Hävden är dock god. Här finns potential att hitta fler naturvårdsarter, bland annat av insekter och svampar.

DOMINERANDE NATURTYP / BITOP

Äng och betesmark / Enefälad, björkhage, fuktäng, högörtäng

BIOTOPKVALITET

Välbäddad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, asktorrträd, grova vidkroniga bokar och ekar, gammal solitärall, grova hasselbuskar, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN, skogsalm* CR

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Rójning av lövsly och putsning av igenvuxna partier. Ingen konstgödning.



75. ALSKOGAR VID KYLE

Naturvärdesklass: 3

Äldre alskog utmed vattendrag, tidvis översvämmad. Låg sentida skoglig påverkan på alskogen, men ändå en ganska likåldrig och enskiktad skog. Varierande inslag av död ved, men högstubbar och lågor påträffas mest sparsamt. Viss sockel-bildning förekommer. Örtrik alskog med inslag av ask. Ömsom rinnande vattendrag ömsom mera lugnflytande. På ett par platser finns kvillar, där fåran delar upp sig med öbildningar som följd.



Gullpudra



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Strandalskog, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Alhögstubbbar, asktorrträd, kvill, blockrikt

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skogsalm* CR, kärrfibbla* S, gullpudra* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Inga åtgärder.



76. SKOGS- OCH VÅTMARKSMOSAİK ÖSTER OM STAVRÖD

Naturvärdesklass: 3

Större område med lövsumpskog i mosaik med öppna våtmarker, några med vattenspeglar, samt avvattande vattendrag av olika bredd. Objektet är variationsrikt och inrymmer olikåldrig alsumpskog, björksumpskog, blandsumpskog, äldre blandskog, videsnår, starrmader och smärre vattenytor. I skogsområdena förekommer död ved i måttlig omfattning. Få naturvårdsarter hittades. I objektet ingår partier med smärre granplanteringar och gallrad lövskog, som inte har några påtagliga naturvärden idag. Objektet kan vid fördjupade biologiska inventeringar visa sig ha högt naturvärde.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp, öppna våtmarker, kärr

BIOTOPKVALITET

Allhögstubbe, allåga, björkhögstubbe, björklåga, björk med bohål, grov ekrotvälta, översilning, vattendrag, videbuskage, öppen starrmad, högörtäng

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, småvänderot* N, missne* S, rutlungmossa* S

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Spara död ved.



Beteslandskap öster om Stavröd. De betade markerna i den södra och sydöstra delen har generellt en god hävdstatus och flora, medan den sydvästra och västra delen av objektet generellt har sämre hävdstatus. Stora ytor har välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark med lågvuxen ljung, blandat med betesfällor med tydligt näringspåverkad vegetation och som då ofta är igenväxande. Fuktigare marker är ofta igenvuxna högväxtängar. Här har nötbetet inte kunnat hålla högvuxen vegetation i schack. Genom de centrala och södra delarna av objektet rinner flera vattendrag, delvis i diken, delvis nära naturligt. Sammantaget ett betesmarkslandskap med inslag av värdefulla naturbetesmarker.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, högväxtäng, dike, stenmur, röse, solitär sälj, grov ask, asktorrträd, enbuske, vattendrag

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, jordtistel* NT, ask* EN, kärrfibbla* S, småvände-rot* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Rökning av sly och putsning av igenvuxna partier. Återupptagen hävd på igenväxande delar. Ingen spridning av konstgödsel.



78.

BETESMARKER NORR OM ÄSPINGE

Naturvärdesklass: 2

Nötbetade gamla fäladsmarker, delvis välhävda, delvis stadda i igenväxning med uppväxande al och björk. Ogödslade naturbetesmarker med enbuskar, finns främst på smärre höjdsträckningar. Inom objektet finns enstaka äldre alsolitärer, grova lindar och döda högstubbar. På välbetad frisk gräsmark med ljungtuvor är florin speciellt örtrik. Slättergubbe och borsttåg förekommer där i stora populationer. Även fågel- och fjärilsfaunan är artrik och värdefull. Våtmarkssänkorna domineras av högörtvegetation som älggräs.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmark, trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad ogödslad grässvål, torrbackar, fuktsänkor, stenbunden mark, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, enbuskar, rötskadade lövträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, jordtistel* NT, darrgräs* N, lind* S, gulspurv* VU, §, gröngöling* NT, §, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM


Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Helst utökad beteshävd av nöt. Rökning av uppväxande al och björk.



79. SATSERUPS HALL

Naturvärdesklass: 1

En äldre bokskog med ett litet inslag av ek. I objektet finns en drumlinliknande urbergsknalle med en brant mot sydöst. Objektet är rikt på torrakor och vedsvamp. Lågor och högstubbar förekommer relativt rikligt. Inom objektet har flera ovanliga och rödlistade lavar observerats; lunglav, bokvårtlav, stiftklotterlav och objektet är välinventerat när det gäller lavar, mossor och insekter. Objektet är betydelsefullt för fåglar och insekter, bohål av hackspett observerades. I buskskiktet finns självföryngrad bok och en del rönn. Fältskiktet består av bl.a. kransrams, skogsstjärna, ängskovall, ekorrbär, örnbräken, skogsbräken, majbräken, trädtåg, liljekonvalj och skogsbingel. En del stengärdsgårdar i bra till mindre bra skick. I objektets västligaste del finns en renoverad brydestuga.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog i branter

BIOTOPKVALITET

Gammal bok, grov bok, blommande träd, brant sluttning, rasbrant, block, död ved, torrträd, torrakor, rötskadade spruckna träd, klen död ved, tickor, lågor,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130)

NATURVÅRDSARTER

Platt fjädermossa S,

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd, nyckelbiotop / ArtData, skogligt biotopskydd, nyckelbiotop berghäll

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel, friställ och spara gamla träd, spara död ved



80.

AL- OCH BLANDÄDELLÖVSKOG VID LJUNGSTORP

Naturvärdesklass: 2

Sammansatt område bestående av alsumpskogar, alkärr och fragment av artrik allund samt olikåldrig och flerskiktad blandädellövskog vid vattendrag. Alskogarna har olika ålder, från yngre till äldre. Inslag finns av björk, bok, lind, ek, ask, gran. I buskskiktet växer hägg, hassel, hagtorn och benved. I fältskiktet dominerar arter som älgört, gulplister, kärrviol, kabbleka, liljekonvalj, vitsippa, kirskål och bunkestarr. Förekomst av ytor med stora sockelbildningar och periodvis stillastående vatten. Vattendraget bildar öar, som ger upphov till så kallade kvillar. Varierande mängd död ved, men överlag sparsam. I området finns yngre granplanteringar och även ett öppet nyupptaget hygge.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp, klubbalkärr, blandädellövlund

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, översilning, mossblock, bäckdråg, bäck, rotvältor, lågor, blockrik bäck, döda stående askar, grova alar, stenmur

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, myskmadra* S, grönvit nattviol* §, aklejruta* S, ask* EN, lind* S, blåsippa* S, storrams* S, gulsippa* S, kransrams* S, ormbär* S, desmeknopp* NT, bäckbräsma* S, hässleklocka* S, småvänderot* N, rutlungmossa* S

ARTRIKEDOM

Ställvis hög, för övrigt måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Ingår i utpekad strandskydd. Delar är biotopskyddade (2 delobjekt) / Nyckelbiotop, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Känsliga skogsmiljöer för hydrologisk påverkan och körskador.



81.

HAGMARK NORDOST OM SATSERUP

Naturvärdesklass: 3

Välhävdade betesmarker i ett kuperat landskap med stengärdsgårdar i bra skick. En viss kvävepåverkan märks och florán är trivial. Bland annat noterades gråfibbla, brunört och liten blåklocka. Även dessa förekommer dock sparsamt. Buskskiktet består framför allt av en som växer vid stengärderna. I objektet finns en mindre, välbetad och torrare alsumpskog med medeltätt trädskikt av företrädesvis al, men även med inslag av björk. I fältskiktet förekommer bl. a. kärrtistel, blodrot, veketåg och mossvegetation. I övrigt finns det en hel del grova ekar samt en anlagd damm som ytterligare berikar landskapets värden.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Alsumpskog, trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, stenbunden mark, blockrik tuvig mark, fuktsänkor, våtmark, alsumpskog, död ved, eksolitär

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030)

NATURVÅRDSARTER

-

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark, fossil åker

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Helst utökad beteshävd, spar död ved



82. SATSERUPS MOSSE

Naturvärdesklass: 3

Satserups mosse är belägen på Linderödsåsen ca 160 m.ö.h. och ligger i en långsträckt sänka som består av jordbruksmark. Sänkan består i övrigt av skogsmark och granen är särskilt framträdande. Mossen har varit utsatt för torvtäkt i flera olika omgångar, vilket har lett till att den ursprungliga tuv- och höljevegetationen i princip är försvunnen. I stället dominerar risvegetation med blåbär, odon, kråkbär, lingon, klockljung, ljung, tuvull, tuvsäv och lavar. Detta beror på att dräneringsdikena fortfarande har sådan kapacitet att mosseplanet får torrare betingelser. En kraftig invandring av träd har skett på mosseplanet, framför allt av björk men även tall och gran förekommer. I djupa torvgravar har lösbottnenvegetation kommit in och ockuperat stora ytor. Laggkärr saknas nästan helt. Resterna av mossen är dock värdefull för den lokala faunan och det har noterats orre på senare tid. Vid återinventeringen noterades blågull samt brakved.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Björkmosse, sekundär lövskog, blandskog

BIOTOPKVALITET

Björkhögstubbar, björklågor, torrakor, tickor, död ved, småvatten,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

--

ARTRIKEDOM

--



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekta / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel i objektets lövområden och ytterligare hydrologisk negativ påverkan på myren. Lägg igen diken.



83.

HAGMARK NORR OM RÅSET

Naturvärdesklass: 3

Objektet delas av en väg i två mindre områden med betesmarker och två mindre alsumpmarker. Objektet ligger i en relativt flack och småbruten bygd som har en lång kontinuitet i hävden. Ingen synlig kvävepåverkan finns. Väster om vägen är mer öppen och det finns relativt rikligt med smörboll, slättergubbe och även orkidé, stenmåra och ärenpris i området. I sumpmarken finns bl. a gökblomster. I den västra delen finns även ett parti lite grövre, äldre ekar. I sumpmarkerna har alsly etablerat sig. Stengärdsgårdar och odlingsrösen förekommer. Väster om vägen har mer karaktären av betad skog. Men även här finns öppna partier. Stora ytor i omgivningen domineras av skog.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och Betesmark / Trädbärande hagmark, betad lövskog

BIOTOPKVALITET

Tuvig blockrik mark, vidkronig ek, solitär apel och hagtorn, sumpmark, stenmurar, rösen, död ved, klen död ved, torrakor, tickor, enbuskar,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 6410, 9070)

NATURVÅRDSARTER

Smörbollar*S, slättergubbe VU,

ARTRIKEDOM

Artrikare är omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och helst utökad beteshävd, undvik konstgödning, undvik negativ hydrologisk påverkan på de blöta partierna, undvik rationellt skogsbruk





Smörbollar

84.

HAGMARKER SYDÖST OM RÅSET

Naturvärdesklass: 3

En igenväxande enefälad som ligger i en relativt flack och småbruten bygd. Stora ytor i omgivningen domineras av gallrad skog och röjd då trädskiktet var glest. Marken i skogspartiet är friskt – fuktigt och fältskiktet består av bl.a. älgräs, kärrtistel, hallon, veketåg och knapptåg. Objektet har fläckvis kvarvarande rester av den ursprungliga floran. Arter som noterades vid återinventering var prästkraige, gökblomster, stagg, stenmåra, gåsört, nysört, luddtåtel, blåttåtel och ärenpris. Objektet var tidigare bara delvis stängslat och bara lite av den öppna hagen var hävdad, resten var igenväxande. Vid återinventeringen var större delen av området stängslat och färbete hade bedrivits. Bland de centralt belägna täta enbestånden var betingelserna torrare där ljung, lingon, blåbär, kråkbär och odon förekom. I busk- och trädskiktet förekommer förutom en, även rönn, ben- och brakved, björk, al, enstaka granar, ekar och tallar. I de östra delarna förekommer ett par, för området, grova ekar. En bäck rinner genom området som bitvis är försumpad. Trädskiktet vid bäcken domineras av al. Stengården och odlingsrösen finns. En mindre del av den öppna hagen har tidigare varit åker och området är något kvävepåverkat.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Igenväxningsmark, enefälad

BIOTOPKVALITET

Stenbunden ogödslad grässvål, högörtängar, bäck, stenmurar, rösen, enbuskar, klen död ved, rönn, damm, grova ekar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410)

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe VU §, borsttåg NT,



ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen hävd på igenväxande enbuskmarker och röjning av uppväxande lövsly.





85.

BOKSKOG VID TIMAN

Naturvärdesklass: 2

Gammal högvuxen bokskog med lång skoglig kontinuitet. Riklig förekomst av död ved, ofta grov. Överhuvudtaget gott om värdeelement som grova gamla bokar, undertryckta senvuxna bokar och rötskadade stammar med håligheter och ibland mulm. Relativt liten bokskog men variationsartad, från mer enskiktade partier med stora gläntor till flerskiktad mer sluten bokskog. Hedbokskog med obefintligt fältskikt. I den norra delen korsar ett översilat bäckstråk, som kantas av gammal klibbal, även den med innehåll av död ved. Sparsam men spridd förekomst även av björk, ek och rönn i skogen, liksom enstaka granar. Gott om jättesvampmal, som är knuten till fnöskticka, och flera rödlistade lavar på rötskadade gamla bokar. Troligen finns även specialiserade vedlevande insekter och svampar. Totalt sett ett värdefullt objekt för biologisk mångfald. Låg sentida skoglig påverkan inom objektet, men skogen omges av ett rationellt skogsbruk, och kalhyggen ansluter på tre sidor. Tidigare ett domänreservat, numera skyddat som naturreservat.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, gamla bokar, senvuxna bokar, bokhögstubbar, boklågor, fnösketickor, bäckdråg, översilning, källmark, stenmur, blockrik mark, alhögstubbar, allågor, alsocklar



SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av hotad Natura 2000-naturtyp (9110).

NATURVÅRDSARTER

Jättesvampmal* NT, rosa lundlav* VU, bokvårtlav* NT, bokkantlav* NT, orangepudrad klotterlav* NT, gulnål* S, kornig nållav* S, platt fjädermossa* S, skärmstarr* S, gullpudra* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog och lokalt viktigt objekt.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat, Natura 2000-område / ArtData, nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling.



86. HULTA MOSSE

Naturvärdesklass: 3

Skogsbevuxet stort och svårtillgängligt mossområde omgivet främst av skogsmarker av olika slag. Mossen är kraftigt påverkad av tidigare dikningar och torvtäkter, som indelade området i parceller. Det finns därför inget helt ostört öppet mosseplan på myren. Odon, klockljung och kråkris är vanliga ris på kvarvarande mossepartier mellan torvgravar. I den gamla torvtäktens sänkor finns stillastående vattensamlingar, ofta med vattenklöver eller starr. Översilade dråg och fuksänkor med intressantare flora förekommer i de norra och västra delarna av objektet. Varierande skogsmiljöer i området, men lövskogar dominerar. Längs med den södra delen av mossområdet finns ett bälte med äldre bokdominerad ädellövskog, med inslag av avenbok, ek, björk, rönn, ask och hassel. Denna skog är mest gallrad, men det finns partier med äldre oskött bokskog med död ved.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling för äldre oskött lövskog med värdeelement. Undvik rationell skogsskötsel i objektets lövskogar och ytterligare hydrologisk negativ påverkan på myren.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Björkmosse, sekundär lövskog, blandskog, bokskog av örtfattig typ

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, videsnår, säl, asktorrträd, bokhögstubbar, boklågor, tickor, klen död ved, småvatten, fuksänkor, diken, stenmurar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, revlumner* §, blåmossa* §, bäckbräsa* S, lind* S, tofsvipa* §, matt rörbock NT

ARTRIKEDOM

Ej artrikare än omgivande landskap.



87.

BETESMARKER VID HULTA

Naturvärdesklass: 3

Lätt kuperat beteslandskap vid Hulta öster om Svensköps mosse. De nötbetade markerna är såväl ogödslade och välbetade som igenvuxna med tydlig näringspåverkan. Det finaste partiet finns i den nordvästra delen, med en stenbunden tuvig enbuskmark och artrik flora. Det finns dock ytor där betet varit svagt och som är igenvuxna med högt gräs. I terrängsvackor finns betade fukt- och högrötsängar med en riklig förekomst av fjärilar. Spritt finns solitära blommande buskar och vidkroniga äldre lövträd av olika trädslag. Inom objektet ingår några gödslade gräsmarker med trivial flora samt ett par hyggen. Kulturhistoriskt rikt landskap med fågator, stenmurar och rösen. Sammantaget ett värdefullt mosaiklandskap.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefäläd, betad lövskog

BIOTOPKVALITET

Välbetad gräsvål, stenbunden mark, fuktäng, högrötsäng, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova vidkroniga lövträd (oxel, rönn), hagtorn, grov en, våtmark, alhögstubbe, alsockel, dammar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 6430).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Utglesning av igenvuxna partier med enbuskar.



Borsttåg

88. NORRESKOG

Naturvärdesklass: 3

En mosaikartad fäladsmark med bok- och björkbackar med inslag av gran, tall och al. I objektets nordöstra hörn finns ett öppet mosseplan med ljung och kråkbär. Mossen är påverkad av tidigare dikning och torvtäckt. Söder om mossen har det skett en del slutavverkning av gran. Mycket klen död ved täcker marken här. Fäladsmarken omges av fuktiga partier med kärrtistel och vecketåg. Fältskiktet domineras av arter som borsttåg, blåklocka, knägräs och ärenpris. Enbuskar förekommer rikligt. Estetiskt tilltalande småvatten, ett ganska nyanlagt. Ett dike går genom objektet. Gott om torrakor i objektet och ett par skadade bokhögstubbar med mulm och bohål. Det finns goda förutsättningar för ett rikt insektsliv, främst trollslända men även viktigt ornitologiskt objekt. Gott om spår från klövvilt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark, myr / Trädbärande betesmark, björkhagmark, mosse

BIOTOPKVALITET

Blockrik tuvig mark, betad mark, stenmurar, lövtorrträd, bokhögstubbar, spärrgrenig bok, rönn, tickor, klen död ved, dammar och småvatten, fuktsänkor, gungfly, mjuka mattor,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

Trana* §, trädgårdssångare §, svartvit flugsnappare* §, grönvit nattviol* N, §

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet) och ett lokalt viktigt objekt



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd, undvik rationell skogsskötsel och en negativ hydrologisk påverkan.



Ett mycket blockrikt och kuperat betes- och odlingslandskap som är intressant ur kulturhistorisk synpunkt. Här finns en gammal välbevarad kyrkoruin från 1200-talet som troligen var en stavkyrka. En jordkällare och en brydestuga förekommer också. Betesmarkerna är omgärdade av stengårdsgårdar i mycket fint skick och marken innehåller en del odlingsrösen. I sänkor förekommer det en del fuktstråk. Några fuktstråken är igenväxande med bl.a. sly och älggräs. Fältskiktet är relativt trivalt med tydlig antydning om kvävepåverkan. Arter som brunört och stånds förekommer. I de södra delarna var det något artrikare med arter som bl. a. ärenpris, stenmåra, ljun, gråfibbla, mjukdån, blodrot, åkervädd*, åkerviol* och liten blåklocka. På åkervädd sågs bredbrämad bastardsvärmare. Det förekommer nästan inget buskskikt med undantag från de fuktigare partier där sly har börjat växa fram. Trädskiktet består av gammal apel, körsbär, bok, asp, lind, björk, rönn och en hel del ek. Grova ekar förekommer i mindre bestånd framför allt i de norra delarna av området och bör bevaras. I öst finns nu en liten granplantering som inte förekom vid förra inventeringstillfället. Precis norr om denna förekommer det ett bestånd av ek som bör frihuggas.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Igenväxningsmark, trädbärande betesmark,

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, rösen, fuktsänkor, blockmark, torrbackar, grova ekar, apel, rönn, fläder

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030, 6270, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Bredbrämad bastardsvärmare* NT, lind* S, blodrot* S

**ARTRIKEDOM**

Något artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fornminne / ArtData, ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd, röjning av sly och frihuggning av ekar



Mosaikartat och variationsrikt landskap med äldre bokskog, alsumpskog, trädklädda betesmarker och dammar. Bokskogen är äldre, grovvuxen och naturskogsartad, dvs. olikåldrig, flerskiktad och med en hel del grov död ved. Bland annat är det gott om högstubbar och lågor med fnöskticka. Inslag finns av andra trädslag som björk, ek, klibbal, gran och rönn. Strukturen och mängden av värdeelement är tilltalande, men arter som visar på skoglig kontinuitet saknas. I den södra delen finns en översilad örtrik men gallrad alsumpskog. Där växer harsyra, vitsippa, kabbleka, brännässla. Stråk av översilad klibbalskog med bäckdråg och blockrika partier finns mellan bokskogen och den trädklädda betesmarken i den norra delen av objektet. Betesmarken är igenväxande med enbuskar och måttligt näringspåverkad. Vidkroniga solexponerade björkar, bokar och ekar växer i betesmarken.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, klibbalskog av översilningstyp, trädklädd betesmark

BIOTOPKVALITET

Grova bokhögstubbar, boklågor, fnösktickor på bokar, grov högvuxen gran, vattensamlingar i svackor, grova bokar med hackspetthål, bäckdråg med al, vidkroniga solexponerade björkar, stenmur, dammar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Bäckbräsmå* S, rankstarr* S, tandrot* S, gullpudra* VU, småvänderot* N, gröngöling* NT, §, gulsparv* VU, §, porellor S, gulsippa S

ARTRIKEDOM

Generellt sett relativt låg till måttlig.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Objekt med naturvärde, sumpskog, ängs- och bete

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling i skogsmiljöerna. Restaurering och återinförande av bete önskvärt i den trädklädda igenväxande betesmarken.



91. SUMPMARK VID MAABÄCKEN

Naturvärdesklass: 2

Längs gränsen mot Kristianstad kommun meandrar sig Maabäcken genom ett ursprungligt område. Bäckens har mycket höga naturvärden med bl.a. öring. I den centrala delen av objektet finns en större alsumpskog med inslag av grovstammig ask. Här delar bäcken upp sig i ett stort kvilleområde. I sumpskogen har bestånd av bl.a. kabbleka och enstaka exemplar av S:t pers nycklar och smörboll noterats. De två senare bekräftades inte vid återinventeringen, däremot gökblomster, kärrfibbla, vänderot, flenört och humleblomster förekom. Älggräs förekommer rikligt. Den södra delen av sumpmarken har tidigare varit öppen och betad och här har bestånd av gul svärdslilja noterats. Längst ner i sydväst är betingelserna torrare. Här förekommer fem till tio grövre ekar och bl.a. humleblomster, svinrot, ängsbräsmå, jungfrulin och knägräs noterades vid original inventeringen. Vid återinventeringen var det fortfarande öppet i de södra delarna men dålig hävd hade resulterat i ett 1,5 m högt fältskikt dominerat av älggräs och hundkex. Objektet som helhet har lång kontinuitet och är mycket varierat.



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Röjning av uppväxande sly och återupptaget bete. Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Spar gamla träd och död ved.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Vattendrag, alsumpskog, grövre ekar, torrakor, liggande död ved, rotvältor, tidvis stillastående vatten,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080)

NATURVÅRDSARTER -

ARTRIKEDOM -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / Ängs- och betesmark



En rest av det ålderdomliga och småbrutna odlingslandskapet. Inom det mosaikartade området finns enefälader, hagmarker, en utmarksbok med en grov och fragmenterad grenlåga, björk- och bokhagar och mindre sumpmarker med öppna vattenspeglar vid fuktig väderlek. Inom området har bl.a. Jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, gökärt, jungfrulin, krypfloka och backtimjan noterats. Vid återinventering noterads slättergubbe, blodrot, gråfibbla, ärenpris, gökblomster och rotfibbla. Utöver tidigare nämnda träd växer här även ek, al och någon enstaka tall. Objektet genomkorsas av ett flertal välbevarade stengårdsgårdar och det förekommer odlingsrösen. I den östliga gränsen rinner en bäck. Vissa tendenser till igenväxning finns, framförallt i anslutning till bäcken men också inom några enbestånd. Objektet hyser ett rikt fågelliv.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Fuktäng, enefälad, trädbärande hagmark, högörtäng, öppet vatten,

BIOTOPKVALITET

Bitvis välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, vattendrag (bäck), stenmurar, rösen, utmarksbok

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 5130)

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, krypfloka EN, §, backtimjan NT

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningen

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, ängs- och betesmark



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och putsning av igenväxande partier med björnbärssnår



93. FÄLAD NORDOST OM SVENSKÖP

Naturvärdesklass: 2

Ett äldre mosaikartat odlingslandskap med värdefulla betesmarker och tydliga kulturhistoriska spår i form av välbevarade stengårdsgårdar, troligen både från tiden före och efter skiftet, skålgropar och odlingsrösen. Objektet ligger i slutningen av en sydvästlig-nordostlig sprickdal, alldeles norr om Vrånge mosse på Linderödsåsen. Omgivande höjder täcks av skog där gran dominerar. Flera vegetationstyper förekommer, bl.a. hedartad vegetation och alsumpskog. Objektet har en lång kontinuitet som betesmark men är i akut behov av restaurering. I fältskiktet har tidigare noterats kattfot, jungfrulin, ögontröst, Jungfru Marie nycklar och liten blåklocka. Vid återinventeringen noterades kärrsilja, kärrfibbla, slättergubbe, darrgräs, gökblomster, ärenpris, kabbeleka, blåsstarr, grönvit nattviol, svärdsilja och humleblomster. I alsumpskogen tenderar älggräs och brännässlor att dominera. På den mer hedartade marken förekom bl. a. lingon, ljung, blodrot, ärenpris och slättergubbe. Enstaka träd och grupper med al, asp, björk, rönn, pil och en förekommer. Vissa enebestånd håller på att växa igen med framför allt björksly. Efter restaurering och fortgående lämplig skötsel har objektet potential att nå högsta naturvärde. Området fortsätter in i Kristianstads kommun.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, alsumpskog



BIOTOPKVALITET

Grova björkhögstubbar, stenbunden tuvig mark, stenmurar, rösen, hög förekomst av lågor och rotvältor, fuktdrag, dike, rönn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp --

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, darrgräs* S, grönvit nattviol* §, blodrot* S, borsttåg NT, stagg S,

ARTRIKEDOM

Måttligt hög

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd, buskröjning och naturvårdsbränning, Stora och omedelbara behov.

94.

ÄDELLÖVTRÄD PÅ SVENSKÖPS KYRKOGÅRD

Naturvärdesklass: 3

Kyrkogård med vårdträd som växer i kantzonen av hela kyrkogården. Det rör sig främst om lågvuxna hamlade äldre lindar, men några skogslönnar finns också. Totalt sett finns en hel del stammar med rötskador och håligheter. Få träd med en artrik epifytflora.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Kyrkogård med vårdträd

BIOTOPKVALITET

Rötskadade träd, stamhåligheter, gamla träd, grova träd, hamlade träd, torrträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Regionalt ovanlig naturtyp.

NATURVÅRDSARTER

Guldlockmossa* S, stare VU, §

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Skyddsvärda träd.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt hamling. Sörj för återväxt av lind. Nertagna träd kan läggas i faunadepå i solexponerat läge.



95. VRÅNGE MOSSE

Naturvärdesklass: 2

Vrånge mosse är belägen på Linderödsåsens plåtå ca 175 meter över havet. Mosseplanet är öppet och av hedkaraktär, med tuvor och höljor och har ett skogsbevuxet laggkärr. Mossen är en koncentrisk mosse med 5 m djupa lager av låghumifierad vitmossetorv. Ett antal äldre torvtäkter samt några öppna vattenspeglar finns i området. Rester av tidigare verksamhet finns fortfarande kvar i form av räls och motorer. Som de flesta mossmarker är den styckad i många små remsor och äldre ortofoto avslöjar att det bedrivits verksamhet på de flesta av dessa. Mosseplanet är dock till stor del intakt. Mossen har stor betydelse för områdets hydrologi och klimat och täktverksamheten har inte påverkat dessa faktorer. Mossen har representativ flora med vitmossa, ljung, tuvull, vitag, kråkbär, renlav, tranbär och silesår. Laggkärrret har varit utsatt för dikning så att det har fått torrare betingelser, vilket har gynnat träd som björk, rönn och tall. En del inslag av död ved och vedsvampar förekommer här. Fältskiktet består av odon, lummer, kransrams, ekorrbar, kruståtel, skogsbräken och ljung. Vid vattenspeglarna växer missne. Faunan utgörs bl.a. av klövvilt, groddjur och ödlor. Även tranor noteras. Mossen ligger på vattendelaren för Linderödsåsen och avvattnas av små bäckar både mot söder och norr och anses ha en betydande reglerande effekt på avrinningen i området. Mossen angränsar i norr till Kristianstads kommun.



Söder om mossen finns betesmarker med kulturhistorisk prägel i form av stengårdsgårdar i varierande skick, äldre stenlämningar och hasselpurror. Betesmarkernas östra delar har fäladskaraktär och de västra delarna har mer hagmarkskaraktär. Det förekommer en del lågor och äldre gallringsrester bevuxna med vedsvampar. Kvävepåverkan är ringa och området är välbetat. Arter som liten blåkllocka, gökärt, stagg, blåtåtel och jordtistel förekommer i fältskiktet. Det finns även ett mindre område med några grova bukettformiga bokar med tickor. Lite död ved finns också. Fältskiktet är väldigt glest med arter som stensöta, kruståtel och harsyra.

I nordost finns det en del alsumpskog. Inom objektet förekommer det en del granplanteringar.





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Mosse, björkmosse, sekundär lövskog, betad mark

BIOTOPKVALITET

Bäckdråg i laggen, öppen mosse, öppna vattenspeglar, gungfly, mjukmattor, döda björkar, lövved, björkhögstubbar, björklågor, klen död ved, vidkroniga bokar, tickor, småvatten, fuksänkor, diken, alsumpskog, socklar, stenmurar, rösen, stenbunden mark, fågata, hässlebuketter.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (91D0, 6230)



NATURVÅRDSARTER

Jordtistel NT, Göktyta* §, trana* §, gök* §, skogsduva* §,

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Gränisar till biosfärområde Kristianstads vattenrike / ArtData, Ängs- och betesmark, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan.

Högvuxen alsumpskog med sockelbildningar och inslag av alkärr med stillastående vatten i terrängsvackor kring kullar med medelåldrig till äldre bokskog. I trädskiktet även björk, rönn, oxel, gran, bok och hägg. Alsumpskogen är örtrik med arter som kärrviol, svalting, svalört, älgört, kabbleka. Förekom av stora ytor med översilad källmark, som bildar rännilar och smärre bäckar. Nyupptagna hyggen gränsar till alsumpskogen västerut.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp, klubbalkärr, bokskog av fryletyp

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, mossblock, stillastående vatten, blöta allågor, översilad källmark, bäckdrag, rännilar, småbäckar, bokhögstubbar, grov bok med fnöskticka

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Gullpudra* S, bäckbräsmå* S, skärmstarr* S, rankstarr* S, alsidenmossa* N, scharlakansvårskål S

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd för en del av alsumpskogen, Strandskydd i söder / Nyckelbiotop, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik hydrologisk påverkan och körskador.



97.

BETESMARK VID BRUNSTORP

Naturvärdesklass: 2

En mindre betesmark precis intill väg E22. Buskskiktet är bitvis tätt och uppträder fläckvis, p.g.a. att kreaturen tidigare varit tjudrade. Buskskiktet består av nypon och hagtorn. I sydväst finns en äldre stendeponering som hyser ett tätare trädskikt av bl.a. lind, avenbok, hassel och en äldre apel i en annars öppen betesmark. Här finns även resterna av en husgrund ("skomakarens"). I betesmarken finns en gammal och knotig al och en flerstammig ask. Strax utanför betesmarkens inhägnad och intill E22 växer stora ekar som bör beaktas samt bevaras. Floran är representativ med bl.a. jordtistel, orkidéer och humleblomster. Tidigare observerades även gullviva. Inom objektet förekommer de rödlistade lavarna matt pricklav, flikig sköldlav och grå skårelav. Gulärta, stenskvätta samt sånglärka observerades och är representativa för landskapet. Utöver naturtypen är området även viktigt med avseende på landskapsbilden eftersom den omges av konventionellt jordbruk samt E22.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Träbärande betesmark,

BIOTOPKVALITET

Stenmur, röse, stenbunden mark, hässle, apel, solitära lövträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp -

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, sånglärka* NT, ask* EN, orkidé §, matt pricklav NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd, röjning av buskskikt



Skogs- och beteslandskap kring Sextorp slott. Högvuxna bokskogar dominerar, men alsumpskogar och alkärr utgör också betydande arealer. Det rör sig om mest enskiktade likåldriga lövskogar, som mer eller mindre är påverkade av skogsbruk. En bäckravin i den östra delen är bland de mest intressanta delobjekten. Där förekommer en hel del grov död ved, bäck och källmark tillsammans med inslag av andra trädslag, naturvårdsarter och solöppna gläntor. Igenväxande enefälader växer i mosaik med alsumpskogar i objektets södra del. Här förekommer rikligt med enbuskar, torrbackar och buskrika bryn, även stora ytor av ljungtuvar med fjärilsrik fauna. I objektet ingår också delar med yngre produktionsbokskog, vilka har lågt naturvärde. Naturvärdet varierar således betydligt inom objektet, från högt naturvärde – klass 2 i ett par skogsobjekt till lågt naturvärde i den skötta unga bokskogen. Totalt sett ändå ett värdefullt objekt med varierande naturtyper och en mångfald av naturvårdsarter. Särskilt månviolett har här en stor och utbredd population.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågört- och högörttyp, klubbaskog av översilningstyp, klubbalkärr, igenväxande enbuskmarker

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova bokar och ekar (även jätteträd), döende askar och ekar, källmark, översilning, blomrika bryn med slån, björnbär, grova enbuskar och hasselbuketter, blomrika men igenväxande grässvålar, flera delobjekt ansluter delvis till dammar eller vattendrag,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 9080, 9130).



NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, månviolett* NT, kransrams* S, bäckbrämsa* S, strutbräken* S, gullpudra* S, lundstjärnblomma* S, räsvansmossa* S, jordtistel NT, revig blodrot VU, gulsparv* VU, §, silversmygare* NT, brandticka* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återuppta beteshävderna på ännu öppna men igenväxande enefälader. Spara grov död ved, rötskadade och grova träd samt gamla träd i lövskogarna.





99. NORRTOU FÄLAD

Naturvärdesklass: 2

Småbrutet odlingslandskap med fina betesmarker och enefälader med kulturhistoriska spår i form av stengårdsgårdar, lyckor, fågator och odlingsrösen i bra skick. Trädskiktet består av bl. a. enstaka grova ekar och sälgar. Vissa delar av objektet är fuktiga där det tidigare har noterats bl.a. stjärnstarr, medan det i de torrare delarna har noterats ärenpris, liten blåklocka, nysört och kärrtistel. Vid återinventeringen noterades gökblomster, ängsull, kärrtistel, vecketåg, frossört, kabbleka och blodrot. Nattviol observerades bland enbeståndet i väst. I objektets nordöstra del finns ett litet och tätt albestånd. Tecken på kvävepåverkan förekommer i öst. Buskskiktet består av en, fläder, slån och nypon som på vissa platser tenderar att ta över. En del konformiga enar förekommer. I den nordöstra delen av objektet växer också ett tätt bestånd av yngre granar som bör tas bort. I den nordvästra delen förekommer ett granskogsparti med äldre och grövre granar som är ett trevligt och värdefullt inslag i detta heterogena område. Trots att objektet är relativt litet är fågelfaunan rik, inom objektet har noterats häckande törnskata, steglits och stenskvätta.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad

BIOTOPKVALITET

Stenbunden tuvig mark, grov ek, fuktdråg, stenmurar, rösen, fågata, torrakor, död ved, blommande buskar och träd som fläder, slån, nypon, oxel och körsbär

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

-

NATURVÅRDSARTER

Gökblomster* S, nattviol* §, jordtistel NT, blodrot* S



ARTRIKEDOM

Måttligt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållet bete, buskröjning och avverkning av ung gran





Akleja



Nattviol

100. ASKEBACKEN OCH LYBY STUBBSKOTTSSÄNG

Naturvärdesklass: 1

Variationsrik natur med artrika betesmarker, slåtterängar, våtmark och ädellövskogar i nordvänd sluttning. Kärnområdet är reservatet Askebacken, men anslutande mark utanför reservatet har liknande naturtyper och endast något lägre naturvärde. Vålhävdade askhagmarker med fin värfloa, rikligt med hålnunneört. Våltutvecklad struktur av ängsmarken med många hamlade lövträd av olika trädslag. Hagtornsbuskar växer spritt. Ädellövskogen, dominerad av ask, innehåller en exceptionellt stor mängd död ved, som följd av trädjukdomar. Mängden av liggande grov död ved är så stor att området är mycket svårframkomligt. Även alm, ek, lind och asp kan nämnas från området, som korsas av ett par smärre bäckar. Mycket rik flora, där ramlök stundtals täcker stora ytor liksom gulsippa. Tandrot, vätteros, skogsbingel är också vanliga, medan månviol och mörk lungört var mer sparsamma. Svampen prakttagg växer på död almved. Här finns potential att hitta mer vedlevande svampar under hösten. Artrik fågelfauna med häckande röd glada, ormråk och stare, särskilt i den översilade alsumpskogen i objektets östligaste del. I östra delen av objektet finns en långsträckt enkelradig dubbelsidig gammal skogslönnallé. Totalt omfattar den ca 100 trädstammar. Många träd är grova, rötskadade och med håligheter, ofta med fågelbon eller mulm. Enstaka träd har savstråk. Artrik epifytflora, där allélav, kyrkogårdslav och guldlockmossa är exempel på arter som är vanliga. Naturvårdsarter av lavar och mossor påträffades. Sannolikt kan rödlistade vedinsekter hittas i håligheterna. Totalt sett ett mycket värdefullt naturområde med få motsvarigheter i kommunen.





DOMINERANDE NATURTYP / BITOP

Skog och träd / Askskog, askhagmark, stubbskottsäng, klibbalskog av översilningstyp, allé

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova askar, grova ekar, hamlade lövträd, betessvål, stenmurar, källmark, översilning, fuktsänkor, Grova lönnar, rötskadade träd med håligheter och mulm, tickor, savstråk, fågelbon i stamsprickor, gamla träd, döda träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanliga naturtyper i landskapet. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6510 m.fl.).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, gullpudra* S, gulsippa* S, blåsippa* S, mörk lungört* S, tandrot* S, prakttagging* VU, stare* VU, §, vättersos* S, hålnunneört* NT, månviol* NT, platt fjädermossa* S, trubbfjädermossa* S, liten baronmossa* S, trädporella* S, guldlockmossa* S, almskruvmossa* EN, sydlig blekspik VU, grynig rosettlav* NT, lönnlav* S, silverlav* N, kärnäva* EN, ängsskära* NT m.fl.

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat (stora delar) / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt hävd av gräsmarker och stubbskottsäng. Ädellövskogen lämnas för fri utveckling.

101. HÖRBYÅNS DALGÅNG VÄSTER OM HÖRBY

Naturvärdesklass: 2

Hörbyån slingrar sig fram genom ett öppet odlingslandskap. Närmast ån växer främst äldre blandädellövskog och alskog samt både igenväxande gräs- och hagmarker. Luckigt olikåldrigt trädskikt, som domineras av ask och klibbal. Rikliga inslag finns främst av ek, kastanj, hägg och hassel. Tämigen rikligt med död ved i form av döda torrträd, högstubbar, lågor och rotvältor. Partier finns med äldre alar och askar på öar i ån. Strömsträckor varvas med lugnare partier. Ån har fina bottnar, och öring noterades. På södersidan finns avsnitt med rasbranter och översilade källmarker. Tyvärr rikligt med den invasiva växten jätteloka utmed vattendraget. Objektet korsas av högspänningsledning och E22:an innan ån rinner ut i Östra Ringsjön. Totalt sett ett värdefullt naturvärdesobjekt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Askskog, igenväxt betesmark av ask/ almtyp, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova askar, källmark, översilning, blomrika bryn med olvon, hagtorn, hassel, stenmur, ansluter till vattendrag, blöta lågor, strömmande partier, grus och sand på åbotten, skogsklädda öar i ån, luckigt trädskikt, rasbranter, mossblock

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)


Ovanlig naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, kärrfibbla* S, bäckbräsm* S, platt fjädermossa* S, trubbfjädermossa* S, lönnlav* S, öring* N

ARTRIKEDOM

Artikare än omgivningarna.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekad strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd av de gräs- och hagmarker som är igenväxande. Ädellövskog och alskog kring ån lämnas för fri utveckling. Bekämpning av jätteloka är aktuellt.



102. HÖRBY FÄLAD OCH VÅTMARK

Naturvärdesklass: 1

Betade enefälader och björkhagar med förekomst av flera andra biotoper bildar ett mosaikområde av olika miljöer. Överlag stenbunden ljunghmark på flack mark, men även på långsträckt åsbildning. Mycket en, blommande buskar och träd. Även förekomst av ett par vidkroniga grova ekar. Blomrika gräs- och ljunghmarker med mycket fibblor dominerar fältskiktet. Frisk och något näringsgynnad flora, men intrycket är ändå ogödslade marker. Troligen finns intressanta ängssvampar. Värdefullt fågelliv i våtmarken med skrattnåskoloni. Området korsas av väg. Den östra sidan av objektet är det mest värdefulla och har de högsta värdena. Tätortsnära område och mycket värdefullt för friluftslivet. Flera stigar går genom objektet.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad björkhage, fågelsjö

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga grova ekar, grova aspar, stenbunden mark, betad ogödslad grässvål, blommande säl, fläder, apel, rosor, hagtorn, slånbuskage, brynmiljöer, rösen, stenmurar, kortvuxna ljunghmarker, liten sjö, vattendrag, högrötsäng, fuktsänkor, åsbildningar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6270, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Backsippa* VU, §, jordtistel* NT, backtimjan* NT, slättergubbe VU, §, bäckbrämma S, alleäggslav* EN, skrattnåskoloni* N, §, rapphöna NT, §, sävsparv* VU, gulsparv VU, §, §, brudbröd* N, darrgräs* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande mark.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete.



103. ÄDELLÖVTRÄD PÅ HÖRBY KYRKOGRÅRD

Naturvärdesklass: 3

Stor kyrkogård i sluttningar och på höjder. Kyrkogården är varierad och har olika karaktär på olika platser. Totalt sett finns en hel del hamlade lindar, dock ej särdeles grova, och en del äldre och grövre vidkronig ek. Bok, ask och hästkastanj kan också nämnas. Enstaka träd har håligheter, rötskador och savstråk. Artfattig epifytflora, men troligen mer värdefullt för vedlevande insekter.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Kyrkogård med vådräd

BIOTOPKVALITET

Hamlade träd, grova träd, grov skorp bark, vidkroniga ekar, hålträd med mulm, savande träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, stare* VU, §, gröngöling* NT, §, gulsippa S, korallticka NT

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, skyddsvärda träd.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Vård av hamlade träd. Beskär skadade träd för att behålla dem så länge som möjligt. Lagg gärna avsågade grenar som solexponerade faunadepåer.



104. ÄDELLÖVSKOG VID ÄNGAKILSMOSSEN

Naturvärdesklass: 2

Område med ädellövskog och igenväxande ännu öppna gräs- och hagmarker. Ett par dammar ingår i områdets norra del. Ädellövskogen, dominerad av ask, innehåller en stor mängd död ved, som följd av trädskjudomar. Mängden av liggande död ved är så stor att området är ställvis svårframkomligt. Även alm, ek och asp kan nämnas från området, som korsas av ett par smärre bäckar. Rik mulljord med heltäckande fältskikt av ramslök. Trädskiktet är överlag medelåldrigt men till viss del ändå olikåldrigt och flerskiktat. En stor mängd av ännu levande grova askar finns spritt i objektet. Grov hassel växer på stora ytor, och nederst i slutningarna högvuxen klubbaskog. Artrik fågelfauna. Totalt sett ett värdefullt naturområde som bör få ändamålsenlig skötsel och skydd.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Askskog, igenväxt betesmark av ask/ almtyp, klubbaskog av översilningstyp, hässle

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova askar, grova ekar, källmark, översilning, fuktsänkor, blomrika bryn med olvon, hagtorn, grov hassel, stenmur

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, blåsippa* S, ramslök* S, kärrfibbla* S, bäckbräsa* S, skärmstarr* S, platt fjädermossa* S, trubbfjädermossa* S, lönnlav* S

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd av igenväxande gräs- och hagmarker. Ädellövskogen lämnas för fri utveckling.



105. LYBY MOSSE

Naturvärdesklass: 3

Sumpskogs- och skogbevuxet mossområde omgivet av helåkersbygd. Mossen är kraftigt påverkad av tidigare dikningar och torvtäcker. Varierande skogsmiljöer i området, men fuktig-blöt björkskog dominerar. Inslag finns av videsnår och unga- medelåldriga granplanteringar, som sköts rationellt. Naturvärdet är högst i östra och västra delen, där det finns stora ytor med lövskog som fått sköta sig själv i decennier. Dessa partier är svårframkomliga på grund av täta videsnår, vass, död lövved, diken och vattensamlingar. Här finns rikligt med död ved, och inslag av rikare flora med enstaka alm och ask. Även gott om asp, sälg och hägg samt enstaka spridda hagtorn och hassel. Skogens slutenhet och skiktning är där mer naturskogsartad. De centrala delarna är överlag fattigare, med ljung, blåbär och blåtåtel i fåltskiktet, och är mer skogligt skötta. Gott om blåmossa och ställvis revlumner i artfattigare björksumpskogar/ mossepartier. Fågelrikt område med bland annat röd glada samt ormråk.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Sekundär lövskog, klibbalskog av översilningstyp, björkmosse

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, alsocklar, alhögstubbar, videsnår, blommande sälg, asplågor, tickor, klen död ved, småvatten, översilning, fuksänk

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i landskapet.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, revlumner* §, blåmossa* §, gullpudra* S, gulsippa* S, lundstjärnblomma* S



ARTRIKEDOM


Delvis artrikt (fågellivet) och lokalt ett viktigt objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling för lövskog med värdeelement. Undvik rationell skogsskötsel i dessa lövområden och ytterligare hydrologisk negativ påverkan.





106. HÖRBYÅN INOM HÖRBY TÄTORT

Naturvärdesklass: 3

Natur i tätortsmiljö. Åns karaktär är varierad med snabbare strömmar, mindre forsar och mer lugnflytande höljor. Bitvis fina bottenar och öring noteras. Variationen borgar för stor artrikedom av djur och växter som lever i eller intill vattnet. Träden längs ån domineras av 10-15 arter lövträd, mestadels al, samt enstaka granar. Buskarna består av bl.a. hassel, slån, syren och sälge. Långa sträckor längs ån har tämligen trivial högörtflora med inslag av kulturväxter. Strandpromenaden går delvis genom rena parkområden. Bitvis är ån kanaliserad med stensatt strandkant. En äldre valvbro av sten ligger centralt i objektet. I centrala delen finns en ö, mellan huvudfåran och kvarndammen, med avverkade träd som ligger som faunadepå. Tidigare vandringshinder uppströms kvarndammen har tagits bort. I anslutning till kvarndammen finns rester från kvarnverksamhet. I sydost finns en park där man via en bro kan vandra på en skogsstig längs med ån. I detta skogsparti finns bl. a. ask, värdefulla ekar och rikligt med död ved. Buskskiktet består av framför allt rönn, lönn och hassel. Längre söderut finns en tämligen brant ravin med tre dammar som ligger inom Naturreservatet Råby Höllor. Vid dammarna noterades vitkindad gås och rikligt med trollsländor. Vid återinventeringen noterades den sällsynt naturaliserade morgonstjärnan vid sidan av en stig vid dammarna i söder. Vidare observerades även forsärla. Objektet har ett stort värde för friluftslivet. På vissa platser inom objektet växer den invasiva växten jätteloka.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Vattendrag,

BIOTOPKVALITET

Lövträdlågor, dammar, död ved, grus och sand på åbotten, luckigt trädsikt, trädklädda öar i ån,



SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, forsärla* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beskugga ej beskuggade område, Ädellövskog och alträd längs ån lämnas för fri utveckling med undantag för bekämpning av jätteloka. Undvik negativ hydrologisk påverkan



107. RÅBY HÄLLOR

Naturvärdesklass: 1

Bäckravin söder om tätorten Hörby som söderut delar upp sig i två dalgångar omgivna av öppna jordbruksmarker. Objektet omfattar ett betat skogs- och hagmarkslandskap i mosaik med öppna frodiga gräsmarker. Närmast ån växer äldre till gammal blandädellövskog. Rik förekomst av vidkroniga grova ekar, döda och döende träd. Partier med grova hasselbuskar i sluttningarna. Även en hel del grova askar. I övrigt bok, alm, björk, fågelbär m.m. Många blommande buskar av hagtorn och rosor samt väl utvecklade solexponerade bryn. Blomrika sluttningar av rotfibbla i den västra dalgången. Nederst i dalgångarna fuktigare alskog, bland annat på översilad källmark med tuvor. Stor ansamling av naturvårdsarter från olika organismgrupper. Vattendraget ökar objektets värde än mer. Det finns såväl strömsträckor som lugnare partier med mycket fina grusbottnar. Totalt sett ett mycket värdefullt naturvärdesobjekt.



Sotnätfjäril



Skogslysing



Violettekantad Guldvinge





Majviva

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Askskog, klibbalskog av översilningstyp, ekhagmark, hässle, vattendrag, källmark, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova ask och ek, savande grova döende ekar, källmark, översilning, blomrika bryn med olvon, hagtorn, hassel, blomrika grässvålar, exponerad jord, ansluter till vattendrag, blöta lågor, strömmande partier, grus och sand på åbotten, skogsklädda öar i ån, mossblock

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanliga naturtyper i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080 m.fl.).



Jordtistel

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, kärrfibbla* S, bäckbräsa* S, ängsnycklar §, lönnlav* S, skogslysing* NT, sotnätfjäril* NT, violettekantad guldvinge NT, desmeknopp* NT, bokarv* VU, jordtistel* NT, brudbröd* S, majviva NT, ängsskära NT, ormbär S, gulsparr* VU, §, stare* VU, §, försärla* N, §, mindre hackspett NT, §, åkerkoppmossa NT, forsmossa NT, trådkällmossa S, slät rutlungmossa S, trubbfjädermossa* S m.m.

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat, ingår utpekad strandskydd / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd

108. HÖRBYÅNS DALGÅNG ÖSTER OM HÖRBY

Naturvärdesklass: 2

Bäckdalgång med omgivande äldre blandädellövskog partvis blandat med äldre alskog. Längre bort från ån mer medelåldrig homogen och enskiktad alsumpskog. Längs med vattendraget olikåldrigt trädsikt, som domineras av ask och klibbal. Rikliga inslag finns av ek, hästkastanj och hägg. Även inslag av alm och lind. Tämigen rikligt med död ved i form av döda torrträd, högstubbar, lågor och rotvältor. Även grova blöta ädellövlågor och partier med trädklädda öar i ån. Strömsträckor varvas med lugnare partier. Mycket fina bottnar och vattendragssträckor, och vattenmyrlejonslända noterades. Totalt sett ett värdefullt naturvärdesobjekt. Tyvärr rikligt med den invasiva växten jätteloka i hela objektet.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ask/alskog, klibbalskog av översilningstyp, hässle, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova askar, källmark, översilning, stenmur, ansluter till vattendrag, blöta lågor, strömmande partier, grus och sand på åbotten, skogsklädda öar i ån, luckigt trädsikt

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, kärrfibbla* S, bäckbräsm* S, trubbfjäder-mossa* S, vattenmyrlejonslända* NT, rutlungmossa* S, aklejruta* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd längs med ån / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd av igenväxande gräs- och hagmarker. Ädellövskog och alskog kring ån lämnas för fri utveckling med undantag för bekämpning av jätteloka.



Vattenmyrlejonslända



109. LÖVLANDSKAP ÖSTER OM HÖRBY

Naturvärdesklass: 3

Landskap öster om Hörby som varierar mellan lövskogar, igenväxningsmarker och betesmarker (hjorthägn). Värdefullast är partier med alsumpskogar och bäckar med omgivande översilningsmark. Där finns naturvärdesarter knutna till denna miljö. Även igenväxningsmarker med mycket slån, fläder och hagtorn samt solexponerade brynmiljöer är värdefulla. Dessutom finns ek-hasselskog med förekomst av kransrams längst i öster. Partier av lövskogen är dock ung och tät utan nämnvärda naturvärden. Närmast tätorten är lövskogen nyligen gallrad. Tyvärr finns rikligt med jätteloka i objektet. Tätortsnära skogsområde.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, hasselrik ekskog, igenväxningsmarker, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga medelåldriga ekar, björklåga, solexponerad grov björkhögstubbe, ektorrtärd, buskar och bryn, hassel, översilning, stenmur, bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Kransrams* S, kärrfibbla* S, bäckbräsa* S

ARTRIKEDOM

Inte artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd av igenväxande gräs- och hagmarker. Ädellövskog och alskog kring än lämnas för fri utveckling med undantag för bekämpning av jätteloka.



110. LÖVSKOG VID EBBAMÖLLA

Naturvärdesklass: 2

Smärre blandlövskog i sluttning och svacka kring stensatt smärre vattendrag. Artrikt busk- och trädskikt med bok, ask, ek, lind, klibbal, björk, avenbok och rönn. Ställvis rikligt med hassel, hägg, benved och skogstry. Markfuktigheten varierar från fuktig till frisk. Överlag relativt gott om död ved, mest som lågor, vindfällen och torrträd av ask, alm, ek, al och lind. Olikåldrig och flerskiktad skog, men inga gamla träd. Rik örtflora med ormbär, lungört och vårärt kan ses på flera platser. Ett ovanligt objekt i dagens skogslandskap.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandlövskog, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, ektorrträd, alhögstubbe, björklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, kärrfibbla* S, mörk lungört* S, vårärt* S, ormbär* S, aklejruta* S, rutlungmossa* S

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekad strandskydd / Nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling.



111. BETESMARKER OCH ALSUMP- SKOGAR SÖDER OM STAVRÖD- ÄSPINGE

Naturvärdesklass: 2

Betes- och lövskogslandskap vid Stavröd-Äspinge. De betade markerna varierar till sin hävdstatus och flora. Stora ytor utgörs av välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark, men det finns också stora ytor som är igenvuxna med älggräs, kärrtistel, vecketåg och tuvtåtel. Det verkar som om beteshävden minskat på senare år. Vegetationen är tydligt näringspåverkad i de norra delarna, men i princip ogödslad på delar av den södra öppna stenbundna betesmarken. Alsumpskogar växer mellan betesmarkerna och är överlag högvuxna, medelåldriga och täta. Viss sockelbildning förekommer. I fuktigare partier nära bäck växer också alm och ask, men också stora mängder av den invasiva växten jätteloka. Sammansatt objekt med varierande karaktär, men totalt sett många rödlistade arter.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, enefälad, björkhage, klubbaskog av översilningstyp, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, torrbackar, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, enebuskar, slänbuskage, solitära grova granar, rötskadade sälgar, bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6270, 9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, borsttåg* NT, jordtistel* NT, gröngöling* NT, §, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Rönjning och putsning av igenvuxna partier, främst i fuktigare stråk. Bekämpning av jätteloka.



112. BETESMARK VID EBBAMÖLLA

Naturvärdesklass: 2

Ett varierande objekt i ett småbrutet område som erbjuder många naturtyper och en hel del kulturhistoria. De betade markerna varierar till sin hävdstatus och flora. Inom objektet finns såväl blöta som torrare partier. De kulturhistoriska spåren består bl.a. av en mängd stengårdsgårdar, utmarksträd samt hässlebuketter. Buskar av en, hagtorn och slån förekommer också. Flertalet av förekommande ekar är rapporterade som skyddsvärt träd.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark,

BIOTOPKVALITET

Torrbackar, fuktsänkor, solbelyst småvatten, tuvig mark, diken, stenmurar, husgrund, torrträd, grov död ved, klen död ved, fläder, apel. solitära lövträd,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410)

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg NT, gulspurv* VU, §

ARTRIKEDOM

Viss artrikedom

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs och betesmark, riksintresse (naturvård)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Rójning och putsning av igenväxande partier. Undvik konstgödning.



113. BETESMARKER OCH RIKKÄRR VID KVARNBERGA-ÄSPINGE

Naturvärdesklass: 2

Stort betes- och lövskogslandskap vid Kvarnberga upp mot Äspinge. De betade markerna varierar till sin hävdstatus och flora. Stora ytor består av välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark, men det finns också delar som är igenvuxna med älggräs, vecketåg, kärtistel och tuvtåtel. En omfattande gallring har nyligen utförts i ekhagmarken, så att många av de äldsta ekarna tagits bort och trädskiktet glesats ut. Tydligt näringspåverkad vegetation finns i stora delar av objektet, men det finns också fläckvis ogödslade partier på öppen stenbunden betesmark. På sådana marktyper finns en värdefull hävdgynnad flora. Mest värdefullt inom objektet är dock ett rikkärr i en terrängsvacka (Södergårdskärret). Såväl vegetation som flora håller där högsta naturvärde. Där finns också mängder med insekter och en skyddsvärd snäcka. Totalt sett ett objekt med varierande karaktär och naturvärden, med förekomst av en rad naturvårdsarter.



Slätterblomma

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, rikkärr, björkhage, klubbalskog av översilnings-typ, sekundär lövskog

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, torrbackar, stenbunden mark, grova utmarksbokar, lövlågor, rikkärr, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, enebuskar, rötskadade sälgar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 7230, 9070, 9080).



NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, jordtistel* NT, mindre hackspett* NT, §, gröngöling* NT, §, majviva* NT, ängsstarr* NT, slätterblomma* N, vildlin* N, ängsnycklar* §, kärrknipprot* §, loppstarr VU, kalkkärrgrynsnäcka NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna, framför allt rikkärret.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd längs med ån / ArtData, äng och betesmark, nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning och putsning av igenvuxna partier, främst i fuktigare stråk. Grova ekgrenar från gallringen samlas ihop i högar till faunadepåer. Rikkärret ägnas särskild uppmärksamhet. Uppväxande albuskar röjs bort.



114. ÄDELLÖVSKOGAR SÖDER OM ÄSPINGE

Naturvärdesklass: 2

Mosaik av betade och obetade blandädellövskogar omgivna av öppna betesmarker med trädsolitärer. Artrikt trädskikt med bok, ask, ek, lind, klibbal, björk, avenbok och rönn. Ställvis rikligt med hassel. Markfuktigheten varierar från fuktig till frisk. På fuktiga partier dominerar ask och klibbal. Skogen är mestadels skogsbetad av nöt, och är då glesare än normal produktionsskog. Överlag relativt gott om död ved, mest som lågor, vindfällan och torrträd av ask, alm och lind. Tidigare gallringspåverkan kan ses här och var i objektet. Vissa delar av ädellövskogen betas inte. Där är lundfloran som mest utvecklad. Rik örtflora med blåsippa, lungört och vårärt kan ses på flera platser. Även förekomst av ett flertal rödlistade arter. Ett ovanligt objekt i dagens skogslandskap. Sammantaget ett värdefullt naturvärdesobjekt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövlund, klibbalskog av översilningstyp, ädellövhogmark, hässle

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grov ask, bok, lind och ek, savande ek, grov bokhögstubbe, lindrotvältor, blomrika bryn, hässle, betade grässvålar, stenmurar, glest trädskikt, artrikt trädskikt

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i dagens skogslandskap. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9020, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, kärrfibbla* S, grönvit nattviol* §, trubbfjädermossa* S, desmeknopp NT, mörk lungört* S, vårärt* S, ormbär* S, blåsippa* S, skärmstarr* S, hässleklocka S, tvåblad S, §, skogsduva* S, korallticka NT



ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (merparten) / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.



115. BETESMARKER VID KVARNBERGA

Naturvärdesklass: 2

Ett varierande och småbrutet objekt som erbjuder många naturtyper och en hel del kulturhistoria. Området öster om Kvarnberga, utgörs till stor del av hag- och enefäladsmarker samt en del ädellövskog. De kulturhistoriska spåren består bl.a. av en mängd stengårdsgårdar, odlingsrösen och en husgrund. Inom objektet finns betad lövskog med ekar samt mer öppna betesmarker med trädsolitärer. Det har skett en hel del utgallring i de centrala torrare, lätt kuperade delarna. Här finns gott om död ved. Ställvis rikligt med hassel. Kvävepåverkan är ringa och hävden är god till måttlig. Ett blötare område med små björk finns i objektets nordvästra hörn.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, trädbärande hagmark, öppen betesmark,

BIOTOPKVALITET

Bitvis välbetad grässvål, stenbunden tuvig mark, torrbackar, stenmurar, rösen, husgrund, ektorrtäd, eklågor, apel, blommande träd, död grov ved, hässle, enebuskar, solitära lövträd, grova vidkroniga lövträd, fuktsänkor,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030, 9070)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, borsttag NT, darrgräs N, skogsduva* S, §, kärrfibbla* S, ängsbräsmå* S, trädgårdssångare* §,

ARTRIKEDOM

Ganska påtaglig



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, naturvärde, riksintresse (naturvård)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Ingen konstgödning bör ske. Undvik rationell skogsskötsel. Fortsatta röjningsinsatser behövs.



116. BETESMARK VID ROSENTORP

Naturvärdesklass: 2

Ett mosaikartat landskap med mycket ädellövskog och ängs- och hagmarker som ligger i ett stråk av öppen mark längs vägen till Svensköp uppe på Linderödsåsen. Objektet är främst intressant ur kulturell och landskapsmässig synvinkel. Norr om vägen mellan Äspinge och Svensköp finns en del betesmarker där mycket örter tidigare noterats. Markanvändningen tycks ha förändrats och de flesta av de stenbundna öppna markerna visar tecken på kvävepåverkan och innehåller få biologiska värden. En mark var upptrampad av nötkreatur och där förekom knappast någon växtlighet alls, en var odlad med vall och några var otillräckligt hävdade. I detta objekt finns däremot många kulturhistoriska spår i form av t.ex. en brydestuga från 1857, odlingsrösen, gravar och gamla fågator. Hägnet mellan ut- och inmark är välbevarat. I nordost finns en alsumpskog med al och ask. Floran består där av arter som frossört, kärrfibbla, hallon, älggräs, kabbleka, kåltistel och kärrsilja. I objektet har det tidigare noterats en kalkfuktäng med bl.a. majviva och svinrot men denna identifierades inte vid återinventeringen. I anslutning till alsumpskogen finns skogspartier där man tydligt kan se spår av en f.d. enefälad och grova och spärrgreniga utmarksekar. I de nordligaste delarna av objektet förekommer en något kvävepåverkad men väl hävdad betesmark med grova exemplar av bok och ek. Fältskiktet består av bl. a. liten blå klocka, blodrot, gökärt och kråkvicker. Här förekommer stengärdsgårdar och fågator i bra skick. Söder om denna betesmark finns ett lövskogsparti som starkt gallrats. I väster finns en ädellövskog med bok och ek som tidigare varit betad. Här förekom vid återinventeringen bitvis ett tätt buskskikt. I kanten av objektet rinner en bäck. Objektet har ett rikt fågelliv.





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, öppen betesmark, alsumpskog, igenväxande enefäläd

BIOTOPKVALITET

Stenbunden betesmark, stenmurar, rösen, fågator, grova spärrgreniga ekar, hässle, död ved, enefäläd, solitära lövträd, vattendrag (bäck), björksocklar, alsocklar, asktorrträd, lövlågor, vedsvamp, tickor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270, 9070, 9080)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel NT, ask* EN, kärrfibbla* S

ARTRIKEDOM

Rikt fågelliv

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, nyckelbiotop, ingår i riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och putsning av igenväxande partier.

117. BENARPS HALL OCH BENARPS BY

Naturvärdesklass: 3

Objektet är främst intressant ur kulturell och landskapsmässig synvinkel, men det är även en geologisk intressant lokal med en urbergsdrumlin. Ängsslåtter har tidigare bedrivits på vissa marker i objektet. I sydväst finns en ädellövskog på kalkrik mark med framförallt bok, avenbok, björk och stora hasselsnår. De södra delarna av denna skog var mer sumpig och mer igenväxt än de norra delarna. Där större bestånd av grov bok förekom var buskskiktet obefintligt. Fältskiktet är trivalt med skogsbingel, hässleklocka, hallon, ekorrbär, strandlysing, ormbär, gulplister, kransrams, hultbräken och harsyra. En del stenmurar och odlingsrösen finns. Öster om skogspartiet finns en igenväxande enefälad med många fuktiga partier. En del enstaka ekar växer också här. Nordost om Bostället (söder om vägen till Killhult) finns en ädellövskog med bok, ek och lönn. Buskskiktet består mest av sly av hallon, lönn och rönn. I fältskiktet har tidigare noterats bergdunört, lungört, hässleklocka, murgröna och bergslök. Delar av skogsparti har gallrats och består framför allt bokföryngring. Väster om detta område finns det en del äldre bokar och mycket lönn och arter som stinknäva och skogssallat förekommer.



I östra delen av objektet ligger Benarps gamla by i en vacker omgivning, med flera ruiner av gamla husgrunder och minst 2 gamla brunnar och en allé av lönn. En del spärrgreniga ekar förekommer, bl. a. i ek-, björk- och aspbeståndet i nordöst. Floran är trivial och kvävegynnad. Betesmarken som vid tidigare inventering var välbetad visar tecken på igenväxning. Konsekvensen är ett högt fältskikt dominerat av få arter. Brännässlor, kärrtistel, älggräs och hundäxing förekommer rikligt. Några gamla äpple- och plommonträd visar markens forna bruk. Den gamla bydammen översvämmar betesmarkerna på våarna. Dammen dikades ut för länge sedan, men grävdes upp igen för drygt 15 år sedan. I och vid dammen förekommer bl. a. bredkaveldun, veketåg, gäddnate, blås Starr och vattenpilört. Det noterades rikligt med fjärilar och en mängd sländor har noterats vid denna och andra dammar i objektet. Andra arter som noterades vid var bl.a. kråkvicker samt några enstaka exemplar av brunört och johannesört.





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövskog, igenväxande enefälad,

BIOTOPKVALITET

Grov bok, stenmurar, rösen, våtmarker, spärrgreniga ekar, hässle, död ved, lönnallé, blommande träd och buskar,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9180)

NATURVÅRDSARTER

-

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, nyckelbiotop, naturvärde, ingår i riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling, vid behov röjning kring grova ekar och på enefälad, återupptagen beteshävd, undvik rationellt skogsbruk

118. BETESLANDSKAP VÄSTER OM KÖINGE

Naturvärdesklass: 2

Beteslandskap med varierande hävdstatus och näringspåverkan. De centrala delarna är minst påverkade och har betats med nöt intill nyligen. Där finns en blomrik stenbunden mark med naturvärdsarter av växter och mycket fjärilar. Övrig mark är mer eller mindre näringsgynnad och mer högvuxen med gräs även betade fällor. I terrängsvackor finns betade fuktängar med artrik flora och riklig förekomst av fjärilar. Spritt finns äldre lövträd av olika trädslag. Inom objektet ingår också ytor med ung björkskog, som verkar omvandlas till betesmark. Värdefullt om hela objektet kan hävdas mer optimalt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Grässvål, stenbunden mark, fuksänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, enbuskar, damm

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER


Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, krypfloka* EN, §, jordtistel* NT, ask* EN, granspira NT, ängsnattviol NT, §, gröngöling* NT, §, silversmygare* NT, ängsmetallvinge NT

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Utglesning av igenvuxna partier med enbuskar.



119. BETESMARKER OCH ALSUMPSKOGAR VID HÄRRÖD

Naturvärdesklass: 2

Mosaiklandskap av öppna stenbundna enefälader med ljung och medelåldriga mest betade alsumpskogar. I terrängsvackor finns fuktigare mark bevuxen mest av högört. Betesmarken varierar stort i djurslag (nöt, häst, får), hävd och näringspåverkan. Den är mestadels välhävdad och ogödslad, men det finns också stora ytor som både är sämre hävdade och med tydlig näringspåverkan. Igenväxta fällor ses på flera platser inom objektet. Fläckvis är dock floran artrik. Det finns även naturvårdsintressanta fåglar, och troligen även fjärilar och svampar. Sammantaget ett värdefullt objekt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klubbalskog av översilningstyp, ask-alskog

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, grova solitära ihåliga alar, stenbunden välbetad grässvål, högörtängar, diken, stenmurar, rösen, enbuskar, asktorrträd, asklågor, hagtorn, rönne, damm

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6430, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, jordtistel* NT, ask* EN, alm* CR, lind* S, gullpudra* S, kransrams* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, gröngöling* NT, §, gulsparv* VU, §, törnskata* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete, främst med nöt. Återupptagen hävd av fällor med igenväxande enbuskmarker och av uppväxande lövsly.



120. UTMARKSBOKAR VID BENARP

Naturvärdesklass: 2

Ett område med grova och spärrgreniga utmarksbokar, varav de äldsta är över 200 år gamla, i ett olikåldrigt bokbestånd med en del enstaka ekar. Området är relativt rikt på död ved med en hel del tickor och vedsvampar vilket i sin tur gynnar bl. a insekter. Lågor och torrakor förekommer relativt rikligt. En del av träden är också rika på både mossor och lavar. Det finns en del odlingsrösen och stengärdsgårdar i gott skick, samt spår av stembearbetning. I sydvästra delen av objektet finns en mindre alsumpskog. Området norr och nordväst om objektet är slutavverkat.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av örtfattig typ, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Jätteträd av bok, grova bokar, grov rötskadad bok, boklågor, torrakor, solöppna gläntor, brant sluttning, tickor på träd, stenmurar, rösen, blockrik mark, sumpskog, socklar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130, 9080)

NATURVÅRDSARTER

Bör inventeras

ARTRIKEDOM

-

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad objekt / Nyckelbiotop (skogsstyrelsen)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Undvik negativ hydrologisk påverkan i sumpskogen.





121. ODLINGSLANDSKAP VID TIMAN

Naturvärdesklass: 2

Ett stort och varierat kulturlandskap med enefälader, hagmarker, enstaka alsumpskogar och bokskogar, som ligger i ett flackt landskap uppe på Linderödsåsen alldeles norr om Viss mosse. I området finns många stengårdsgårdar och ett antal odlingsrösen i bra skick. Hässlebuketter och utmarksbokar förekommer också. Marken har troligtvis varit inägomark. Några små tegar i närheten av gården i norr var planterade med gran. I de norra delarna finns en mycket blockrik och välbetad liten hagmark med ett par grova ekar, grov gran, några hässlebuketter och små betade bokplantor. Här finns även bokskog i varierande ålder.

I söder dominerar enefälader, bitvis med viss kvävepåverkan, framför allt i de öppnare partierna. Fäladerna är välbetade med tuvig vegetation och med mindre fuktstråk insprängda. Stora delar av trädskiktet höll på att avverkas vid inventeringstillfället. Viss hänsyn togs till de kvarvarande utmarksbokarna som nu fick en mer framträdande roll. Efter flera decenniers igenväxning skulle marken enligt uppgift återföras till betesmark. Längs ett dike som går i öst-västlig riktning har träden avverkats på båda sidor. En- och hasselbuskar finns i buskskiktet. I fältskiktet hittar man en representativ flora med bl.a. slättergubbe, knägräs, stagg och borsttåg. En betad al- och björksumpskog finns i anslutning till enefäladerna. En del av alarna växer på sockel. Fältskiktet är representativt.





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Betesmarker, svåmlövskog,

BIOTOPKVALITET

Beteshävd, grova gamla lövträd, spärrgreniga gamla bokar, stora gamla fruktträd, grov död ved, stenmurar, rösen, diken, sumpmark, stembunden tuvig betesmark.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130, 6430)

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe VU, borsttåg NT, knägräs N, stagg N,

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, ängs och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd på betesmarkerna, undvik rationell skogsskötsel i bokskogarna, bekämpning av parkslide som förekommer längs grusvägen i norr, låt diket som rinner öst-västlig riktning i södra delen åter beskuggas.

122. SUMPSKOG VÄSTER OM VISS MOSSE

Naturvärdesklass: 3

Hydrologiskt störda rester av Viss mosse som är belägen på Linderödsåsens platå ca 170 möh. Själva mossen är för tillfället utsatt för omfattande täktverksamhet och hela mosseplanet är ödelagt. Objektet är mosaikartat med torrare partier, med ett fältskikt där ljung är dominerande men även klockljung förekommer och blötare partier (de gamla torvgravarna) med mossvegetation. De många små vattenspeglarna bidrar i hög grad till objektets naturvärden, inte minst för amfibier. Varierande skogsmiljöer i objektet. Björk har vandrat in och objektet är bitvis att betrakta som olikåldrig björkskog. Laggkärr saknas i stort sett helt då dikningar i kantområdena varit särskilt omfattande. En del död ved förekommer, mest av klenare dimension och i fältskiktet förekommer mest blåbär, lingon och ljung. Norra delen består till största delen av blandad sumpskog. En del partier domineras helt av björk och andra av till exempel gran. I buskskiktet förekommer stundvis täta bestånd av rönn. Objektet är intressant ur zoologisk synvinkel, då det är rikt på fågel, insekter (bl.a. sländor) och klövvilt. Sjungande tranor kan höras från mossen och klagande korpar från skogen. Objektet gränsar i öster mot torvtäkten. Området avvattnas mot väster via två mindre bäckar, som är biflöden till Hörbyån.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Sekundär lövskog, björkmosse,

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, klen död ved, tickor, småvatten, fuktsänkor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

-



ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet & sländor) och lokalt ett viktigt objekt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, fornminne, våtmarksinventeringen, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel i dessa lövområden och ytterligare hydrologisk negativ påverkan





123. MOSAIKLANDSKAP AV LÖVSKOG OCH BETESMARK VID TIMAN

Naturvärdesklass: 2

Större mosaikartat landskap bestående av alskogar och öppna men glest trädklädda betesmarker. Alsumpskogar och alkärr utgör främst av äldre alskog med inslag av bok, ek, björk och gran. Det finns ofta en hel del död multnande ved i olika former. Mellan alskogarna rinner smärre bäckar eller rännilar. Partier med stillastående vatten finns om våren. De trädklädda betesmarkerna har i huvudsak en låg näringspåverkan och hävdgynnad flora är artrik med bland annat förekomst av slättergubbe. Enbuskar och hagtorn finns i buskskiktet.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr, trädbärande hagmarker

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, periodvis stillastående vatten, högstubbar, lågor, torrträd, rotvältor, ogödslad grässvål, blockrik mark, vidkroniga solexponerade lövträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Gullpudra* S, kärrfibbla* S, grönvit nattviol* §, skärmstarr* S, rank-starr* S, slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, ängsmetallvinge* NT, gröngöling* NT, §, gulspurv* VU, §, bokvärtlav NT

ARTRIKEDOM

Måttligt till relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Sex av alsumpskogarna är biotopskyddade / Nyckelbiotoper, sumpskogar, ängs- och bete



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bete med helst nötkreatur på nuvarande betesmarker. Undvik rationellt skogsbruk och en negativ hydrologisk påverkan.



124. SUMPSKOG NORR OM VISS MOSSE

Naturvärdesklass: 3

En hydrologiskt starkt störd rest av Viss mosse, som är belägen på Linderödsåsens platå ca 170 meter över havet. Objektet är mosaikartat med torrare partier med ett fältskikt där ljunng och klockljunng är dominerande och blötare partier med mossevegetation. Även tuvull förekommer. Laggkärr saknas. Björk och tall växer på mossen och objektet är bitvis under igenväxning. De norra delarna av objektet är att betrakta som sumpskog, dominerad framför allt av björk, men även partier med gran, asp, bok och rönn förekommer. I nordost förekommer till exempel ett mindre bestånd (<1 ha) av grövre bok och asp som omges av ett tätt bestånd av föryngrad rönn som buskskikt. Väster om detta bestånd finns en gammal rest av en husgrund som är i dåligt skick. I fältskiktet förekommer bl. a. blåbär, lingon, tranbär, odon och skogskovall. Andra arter som noterades i skogspartierna var kärrsilja, kransrams och tibast. En hel del död ved förekommer men mest av klenare dimension. Området är rikt på fågel och klövvilt vilket gör det intressant ur zoologisk synvinkel. Området har också ett rekreations- och fritidsvärde då skåneleden (Etapp 12, Tåman - Rebbetuaröd) slingrar sig genom de norra delarna av objektet. I söder gränsar objektet mot torvtäkten. Mossen avvattnas mot väster via två mindre bäckar, som är biflöden till Hörbyån.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Björkmosse

BIOTOPKVALITET

Grov björk, grov tall, grov bok, grov asp, rönn, död ved, klen död ved, tickor, torrhögstubbar, vattendrag (bäck), småvatten, fuktsänkor, gyngfly, blöt ved, blommande träd och buskar,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen



NATURVÅRDSARTER

Klockljunng* S, kransrams* S, tibast* S, tuvull* S, skogssalm CR,

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågelliv) och lokalt viktigt objekt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel i dessa lövområden och ytterligare hydrologisk negativ påverkan



125. BETESMARK VID ÄLMHULT

Naturvärdesklass: 2

Hästbetad gammal och variationsrik betesmark, delvis välhävdad, delvis stadd i igenväxning med uppväxande lövsly. Stora arealer med ogödslad naturbetes-mark dominerar med gamla enar i buskskiktet. I fältskiktet dominerar ljungtuvor och blåtåtel. Inom objektet finns också många äldre tallsolitärer. Rik trädslagsblandning sammantaget inom objektet. På välbetad frisk gräsmark med ljungtuvor under korsande ledning är florans speciellt örtrik. Borsttåg förekommer i en stor population och troligen finns fler intressanta växter. Förekomst av värdefull fågelfauna.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmark, trädbärande betesmark, björkhage, fuktmark med blåtåtel och ljung

BIOTOPKVALITET

Välbetad ogödslad grässvål, fuktsänkor med blåtåtel, stenbunden mark, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, gamla enebuskar, rötskadade lövträd, gamla solitärträd, björk- och sälglågor, grov bok och ek

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, knägräs* N, gröngöling* NT, §, fiskgjuse* §, gulsparr VU, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Helst utökad beteshävd av häst eller nöt. Röjning av uppväxande löv har påbörjats, men behöver göras mer.



126. BETESMARKER VID SKOGSDALA

Naturvärdesklass: 2

Nötbetad gammal fäladsmark, delvis välhävad, delvis stadd i igenväxning med uppväxande albuskar och björnbär. Stora arealer med ogödslade naturbetesmarker dominerade av enbuskar och stagg med ljungtuvor. Inom objektet finns också många äldre, grova och vidkroniga boksolitärer. Rik trädslagsblandning som helhet i objektet. På välbetad frisk gräsmark med ljungtuvor under korsande ledning är floran speciellt örtrik. Naturvårdsarter som slättergubbe och borsttåg förekommer där i stora populationer. Våtmarkssänkor domineras av högörtvegetation som älggräs, veketåg, fackelblomster och kärrtistel.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmark, trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad ogödslad grässvål, torrbackar, fuktsänkor, stenbunden mark, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, enbuskar, rötskadade lövträd, grova boksolitärer, solitär apel och säl

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6430, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Helst utökad beteshävd av nöt. Röjning av uppväxande löv och björnbär.



127. ALSUMPSKOG VID SKÅNINGSBODA

Naturvärdesklass: 3

Alsumpskog vid gränsmur mot Kristianstads kommun. Ett smärre vattendrag rinner tidvis genom sumpskogen. Medelåldrig klibbal dominerar, men inslag finns främst av björk, gran och rönn. Överlag enskiktad skog, men viss åldersvariation finns, dock inga gamla träd. Sparsam förekomst av död ved. Viss sockelbildning indikerar viss trädkontinuitet. Ingen särskild flora, utan älggört dominerar eftertryckligt.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Al med bohål, alsocklar, alhögstubbe, allågor, björklågor, stenmur, bäckar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade.

ARTRIKEDOM

Ungefär lika artfattigt som i omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling.



128. ALSKOGAR VID KRISTINETORP

Naturvärdesklass: 2

Sammanhängande nätverk av alkärr och lövsumpskogar omgivna av granskog. Äldre alskog dominerar trädskiktet i kärren, men inslag finns av trädslag som till exempel björk, rönn och gran. Hägg dominerar ofta i buskskiktet, där sådant finns. I fältskiktet märks bland annat vitsippa, kabbleka, kärrviol, mannagräs och älggräs. Stora alsocklar och stillastående vatten karakteriserar flertalet kärr. Bäckdråg och smärre bäckar länkar samman delobjekten. Död ved i form av högstubbar, lågor och torrträd finns i alla delar av objektet, men i olika mängd. Förekomst av flera naturvårdsarter.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Grova alsocklar, rotvältor, lågor, stillastående vattensamlingar, mossblock, bäckdråg, tickor på al och björk, torrträd, hackspethål

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, bäckbräsmå* S, gullpudra* S, lopplummer* S, alsidenmossa* N

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd av tre alsumpskogar / Nyckelbiotoper, sumpskogar

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Sumpskogarna är känsliga miljöer för hydrologisk påverkan, markskador i samband med avverkning och direktexponering vid hyggeskanter.



129. ALSKOGAR VID HARPHULT

Naturvärdesklass: 2

Objekt med en koncentration av alsumpskog, ofta relativt högvuxna äldre alskogar med översilningsmark och bäckdråg, men också mer lågvuxna alkärr med stora sockelbildningar och stillastående vatten. I trädskiktet finns även bok, björk, rönn, ask, gran och ek. En grovvuxen bokskog med högstubbar, lågor och torrträd ingår också i objektet. Totalt sett förekomst av en hel del död ved i olika former. Artrik kärlväxtflora, och delar av alskogen kan karaktäriseras som allund. I fältskiktet dominerar arter som vitsippa, älgört, harsyra, hultbräken, ormbunkar, kabbleka och svalört.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp, klubbalkärr, bokskog av ristyp

BIOTOPKVALITET

Rotvältor, torrträd, bäck- och källdråg, översilning, källmark, alsocklar, örtrik mark, block, rännilar, levande grov högstubbe, bokhögstubbar, grova boklågor, hamlade bokar, rikligt med tickor på träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Sydlig sotticka* VU, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, gulsippa* S, ask* EN, gullpudra* S, bäckbräsmå* S, rankstarr* S, gulnål* S, stjärntmes* §, blåmossa §

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Tre av sumpskogarna är biotopskyddade / Nyckelbiotoper, objekt med naturvärde, sumpskogar



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik hydrologisk påverkan och körskador. Lämna skyddszoner vid avverkning intill sumpskog.



130. BRÅÅN VID ÅKARP

Naturvärdesklass: 3

Längs gränsen mot Eslövs kommun meandrar Bråån genom ett ursprungligt område. Inom området finns det gott om översvåmningszoner och kontinuiteten är lång. Troligtvis har området slåttrats med efterbete. Gamla meanderslingor (s.k. korvsjöar) och mindre våtmarker finns längs hela sträckan. Trädskiktet består till största delen av olikåldrig al, men en del ek förekommer också varav några grova spärrgreniga. Även grov lind noteras. Floran är förvånansvärt trivial, trots att området är kalkrikt och bitvis tuvigt. Inom hela området förekommer en hel del humleblomster och ängsbräsmå. Intressantast är de östra delarna där det växer bl.a. svinrot, darrgräs, blodrot, stenmåra och gökärt. Noteras tecken på stödutfodring. Själva ån hyser stora naturvärden med sina grusbottenar och tjockskalig målarmussla noteras. Området är en fin fågellokal och fungerar som spridningskorridor. Naturområden är ovanliga i helåkersbygden vilket ytterligare förstärker naturvärdet. En intressant detalj är att stengårdsgårdarna på norra sidan av ån följer meandringen - gissningsvis är detta den gamla häradsgränsen (innan rätningen) mellan Frosta och Färs härad.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Trädbärande betesmark, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Naturligt vattendrag, strömmande partier, viss översilning, grus och sand på åbotten, lövlågor, grov död ved, klen död ved, blöt ved, hagtorn, apel, hässlebuketter, blommande träd och buskar, hålträd, stenmurar, husgrund,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270)



NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, tjockskalig målarmussla* EN, §, gök* §, härmsångare* §

ARTRIKEDOM -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd, Biotopskyddsområde, nationellt särskilt värdefullt vatten / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helts utökad beteshävd av igenväxande gräs- och hagmarker, håll området rent från plast, träden längs ån lämnas för fri utveckling, undvik negativ hydrologisk påverkan framförallt slamflykt från uppströms liggande områden



131. BETESMARKER VID HÖRBY

RADIOSTATION

Naturvärdesklass: 2

Öppen mest fuktig betesmark med inslag av solitära träd, ofta vidkroniga ekar, eller ansamlingar av yngre till medelåldriga vidkroniga ekar. Mängder av enestubbar i stora delar av objektet vittnar om en tidigare tätvuxen enefälad. Nu dominerar öppna fuktängar med högre vegetation och stenbunden tuvig mark. Kärrtistel är en av de dominerande högvuxna arterna i fältskiktet. Det finns även inslag av övriga strukturer som smärre grusvägar, stenmurar, diken och dammar. Förekomst av en rad naturvårdarter av fåglar, kärlväxter och fjärilar. Särskilt stora är populationerna av borsttåg och jordtistel. I anslutning till grusvägarna, som ingår i objektets kantzoner, finns en imponerande prunkande artflora av blåeld, rödklöver, gul lusern, getvåppling med flera, som drar till sig mycket insekter. Sammantaget ett värdefullt objekt som kan utveckla än mer värden för hävdgynnade arter när effekterna från avverkningen av enbuskar ebbat ut och beteshävderna fortsatt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska gräsmarker, fuktängar

BIOTOPKVALITET

Öppen betesmark, blockrik tuvig mark, vidkronig ek, damm, dike, stenmur, röse

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, jordtistel* NT, borsttåg* NT, jungfrulin* N, sotnätfjäril* NT, ängsmetallvinge* NT, tornfalk §, gulsparr* VU, ängsplomlärka* NT, buskskvätta NT* §, stenskvätta* §



ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.



132. BETESMARKER VID ÖSTRA SALLERUP

Naturvärdesklass: 2

Mosaikartat objekt med öppna betade hagmarker eller ekhagmarker och mer slutna lövskogar, främst klibbalskog. Betesmarkerna är näringspåverkade och överlag relativt artfattiga, men några naturvårdsarter påträffades. Ett rinnande vattendrag korsar objektet och bidrar med variation och ytterligare naturvärde. Sammantaget ett värdefullt objekt som kan utvecklas än mer för hävdgynnade arter.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska gräsmarker, fuktängar, enefälad, klibbalskog av översilningstyp, blandädellövskog, bäck

BIOTOPKVALITET

Öppen betesmark, blockrik tuvig mark, vidkronig grov ek, grov lind, savande ek, grov hassel och fläder, damm, stenmur, röse, asktorrträd, blommande buskar, enbuskmarker

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270, 9080, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, jordtistel* NT, borsttåg* NT, mindre bastardsvärmare* NT, lind* S, tjockskalig målarmussla EN, § i vattendraget

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / ArtData, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.



133. ÄDELLÖVSKOG VID GRANKARP

Naturvärdesklass: 2

Objekt sammansatt av tre olika skogsmiljöer: På ömse sidor av en skogsbäck växer en grov bokdominerad blandädellövskog. Rikliga inslag finns av främst avenbok, men även alm, ask, och skogslönn förekommer. Olikåldrig och flerskiktad skogsmiljö. Längst söderut finns en gammal betad bokskog/ädellövskog med mycket gamla grova bokar, ofta rötskadade och med håligheter och mulm. Emellan dessa två nyckelbiotoper finns en gles betad askhagmark, med blommande buskar och inslag av andra trädslag. Förekomst av naturvårdsarter av växter både i mullrik lövskog som i översilad källmark. Sammantaget utgör dessa tre skogstyper ett värdefullt skogsobjekt i en annars skogsfattig bygd.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövlund, askkärr, hagmarksbokskog, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Grova bokar varav flera jätteträd, rötskadade träd med mulm, grova högstubbar och lågor, rinnande vatten (bäck), källmark, översilning, stenmur

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av hotad Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Bokvärtlav NT, vårärt* S, mörk lungört* S, ask* EN, skogsalm* CR, gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog och lokalt ett viktigt objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekad strandskydd / ArtData, nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållet bete av hävdad mark (askkärret och bokhagmarken). Fri utveckling för ädellövskogen kring bäcken.



134. ÄDELLÖVSKOG VID HUGGELSEKE

Naturvärdesklass: 2

En örtrik ädellövskog på kalkrik mark. Trädskiktet består av äldre och grova avenbokar med inslag av ask, bok, lind, lönn och ek. I buskskiktet finns bl.a. hassel, hägg och benved. I det täta fältskiktet förekommer bl.a. skogsnycklar, storrams, kransrams, blåsippa, lundbräken, ängsfräken, kärrfibbla, ekorrbär och humleblomster. Svampen trollsmör förekommer också. Området i väster är av torrare karaktär och består av yngre träd samt att fältskiktet är betydligt magrare. Dock finns goda förutsättningar för att detta mindre område ska få bra naturvärde och bör skyddas från avverkning.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, lövsumpskog

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, torrträd, grov ek, stenmurar, rösen, rötskadad senvuxen avenbok, grova lågor, död småved, tickor och trädsvampar, blockrik betesmark, spärrgrenig bok, rönn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130, 9080)

NATURVÅRDSARTER

Storrams S, skogsnycklar* S §, ask* EN,

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna,

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Nyckelbiotop (skogsstyrelsen) / ArtData, objekt med naturvärde



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling, undvik rationellt skogsbruk, spar död ved och gynna grova träd



Trollsmör



135. BETESMARK ÖSTER OM HALLABACKEN

Naturvärdesklass: 3

En rest av ett äldre odlingslandskap med ekhagar, enefäläd, välbevarade stengårdsgårdar och en hel del odlingsrösen, fågator och purror. I enefäläden noteras bl.a. arterna liten blåklocka, gråfibbla, ärenpris, blodrot och gökärt. Viss näringspåverkan finns. Delar av fäläden är nyligen planterade med gran och hävden var till synes otillräcklig vid besöket. Arealen betesmark kommer således minska i framtiden. På vissa partier växer björksly fram. Ett alskogsparti förekommer också centralt i enefäläden. I den södra delen växer flera grova och värdefulla ekar (ca 10 st.). Det är bl. a. i anslutning till dessa som gran planterats. Ekhagarna består i övrigt av stora och solitära träd som både har vida och smala kronor. Fältskiktet är trivalt. En kraftig låga och en torraka av ek finns, och viss självföryngring av ek förekommer. Inom objektet finns även en mindre bok- och askskog med inslag av ek, i buskskiktet finns hassel och ask. Fältskiktet består till största delen av liljekonvalj, harsyra och vitsippa. I nordost finns ett skogsparti med värdefulla exemplar av bl.a. ek men som annars har ett väldigt tätt framväxande buskskikt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, våtmark,

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, stenrösen, solitära träd, grova ekar, vidkroniga ekar, vidkroniga bokar, apel, rönn, gamla ekstubbar, torrträd, hässle, igenväxande enefäläd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270, 6230, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN,



ARTRIKEDOM

-

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd, spara död ved, gynna och frihugg grova träd, ingen tillförsel av konstgödning bör ske, röjning av sly, röjning och borttagning av gran



136. HAGMARKER OCH BETAD LÖVSKOG

VID BOALT

Naturvärdesklass: 3

Igenväxande betesmarker, trädbärande hagmarker, betad skog och blandlövskog runt om ett fält med en betesvall med omgivande öppna jordbruksmarker. Betesmarkerna är mestadels igenväxande med högt gräs och lövsly, medan hagmarkerna har något bättre hävdstatus. Vidkronig äldre ek dominerar som solitärträd, särskilt eftersom förekommande ask håller på att dö. I den betade skogen har ett yngre trädskikt av främst björk vuxit upp mellan de tidigare solitära ekarna. Förutom ask finns inslag av lind, asp och gran. Även hassel, hagtorn och apel kan påträffas lokalt rikligt. Artfattigt fältskikt överlag. Förekomst av diken och en större bäck. Vid en bättre hävd kan objektets naturvärde troligen öka till högt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, betad lövskog

BIOTOPKVALITET

Vidkronig ek, hassel, solitär apel och hagtorn, diken, bäck, stenmurar, rösen, enbuskar, grov rötskadad bok

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, kransrams* S, skärmstarr* S, lärkfalk*, §

ARTRIKEDOM


Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och helst utökat nötbete. Röjning av igenväxande betesmarker och av uppväxande lövsly.



137. ÄDELLÖVSKOG VID HÄRRÖD

Naturvärdesklass: 2

Variationsrikt lövskogsområde med äldre grov och gallrad bokskog i söder, medan blandädellövskog, igenväxningsmarker, hässlen och alkärr dominerar i den norra delen. Infilikat i norr finns en skjutbana med röjda siktgator. Vattendrag rinner genom objektet, även sommartid, och är ett tillhåll för klövvilt. Den norra delen är trädslagsrik, olikåldrig och flerskiktad. Där finns också en hel del död ved i både stående träd och liggande. I terrängsvackor finns alkärr med stora alsocklar. Gott om grova ädellövträd och grov hassel. Örtrikt fåltskikt. Även om södra delen är gallrad finns en hel del död bokved och även viss olikåldrighet och skiktning. Förekomst av flera naturvårdsarter.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, igenväxande ekhagmark, hässle, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, hålträd, allåga, grova bokar och ekar, rötskadade lövträd, grov hassel, bäckdrag, högörtängar, bäckar, diken, stenmurar, rösen, asktorrträd, asklägor, hagtorn, rönn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9020, 9130, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, desmeknopp NT

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, nyckelbiotop



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationellt skogsbruk. Spara grova träd och död ved.



138. MOSAIK BETESMARKER OCH ALSUMPSKOGAR VID FRÄNNARP

Naturvärdesklass: 2

Mosaiklandskap av öppna stenbundna enefälader och ganska lågvuxna alsumpskogar av varierande ålder. Betesmarken är mestadels välhävdat och ogödslad, men det finns ytor som både är sämre hävdade och som tydligt indikerar näringspåverkan. Totalt sett en artrik flora, med framför allt en mycket stor population av den rödlistade växten slättergubbe. Även förekomst av en artrik svampflora på betesmarken. Ett värdefullt objekt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalkärr, klibbalskog av översilningstyp, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, stenbunden välbetad grässväl, diken, bäck, stenmurar, rösen, enbuskar, grov rötskadad bok

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, gullpudra* S, kransrams* S, bäckbräsm* S, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt nötbete. Successiv röjning av igenväxande enbuskmarker och av uppväxande lövsly.



139. IGENVÄXANDE BETESMARKER NORR OM BESSINGE

Naturvärdesklass: 3

Öppna stenbundna och ofta tuviga enefälader. Samtliga fallor inom objektet är igenväxande med högt gräs (tuvatel, veketåg), även de som betas. I fuktsänkor växer också högvuxen vegetation av älgört. Ogödslade betesmarker finns främst i den nordvästra delen, som ännu hyser en värdefull hävdgynnad kärlväxtflora. Floran är i en så kallad "älsklig fas", och stora ytor blommar nu med ängsvädd och ljung. Denna vegetation kommer dock snart att försvinna. Här behövs betydande restaureringsinsatser om dessa naturbetesmarker ska kunna bibehållas. Om så görs kan naturvärdet höjas till högt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, björkhage

BIOTOPKVALITET

Stenbunden ogödslad grässvål, högörtängar, diken, stenmurar, rösen, enbuskar, asktorrträd, hagtorn, rönn, damm

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6430).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, jordtistel* NT, ask* EN, borsttåg* NT, granspira NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete med nöt. Återupptagen hävd på igenväxande enbuskmarker och röjning av uppväxande lövsly.



140. BETESMARKER OCH RIKKÄRR VID FRÄNNARP

Naturvärdesklass: 2

Beteslandskap söder om Frännarp. De södra delarna betas av häst och ligger vid en anlagd våtmark. Enbuskmarker och stenbundna välbetade tuviga gräsmarker dominerar där. Floran är artrik och det finns många dagfjärilar. De nötbetade markerna i norra delen är mer variabla, och inrymmer inte bara stenbundna marker utan också olika fuktmarker och rentav en kalkfuktäng/rikkärr samt betad ung-medelåldrig ekskog. Gräsmarkerna är mest ogödslade och välbetade, men det finns också partier med viss näringspåverkan på vegetationen. I en gammal husbehovstäkt för grus växer rikligt med den rödlistade våtmarksväxten rödulanke. Totalt sett många naturvårdsarter och flera olika fina hävdade miljöer. Sammantaget ett mycket värdefullt mosaiklandskap vars naturvärde i stora delar gränsar till det högsta – klass 1.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefålad, fuktängar, rikkärr, betad ekskog

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, kalkfuktäng/rikkärr, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova enbuskar, våtmarker

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 7230).

NATURVÅRDSARTER

Rödulanke* NT, borsttåg* NT, backtimjan* NT, jordtistel* NT, ängsnycklar* §, darrgräs* N, granspira NT, törnskata* §, gröngöling* NT, §, silversmygare NT, violettekantad guldvinge NT

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Ingen konstgödning. Rönjning av uppväxande björksly i norra delen, främst för att bibehålla kalkfuktängens/rikkärrets öppna karaktär.



141. ODLINGSLANDSKAPET KÖINGE-HÄRRÖD-BESSINGE

Naturvärdesklass: 2

Mosaikartat betesmarksområde bestående av öppna gräsmarker, nötbetade hagmarker, lövdungar, (björk, ek, bok). Området i öster vittnar om det tidigare har röjts kraftigt och ser mer ut som ett välbetat hygge. Här växer gott om fingerborgsblommor. Marken överlag stenbunden, blockrik och viss tuvighet. Många stubbar från tidigare avverkning, någon lite högre med mycket grov bark, håligheter med mulm och blottad ved. Örtrikt fältskikt. Även om södra delen är gallrad finns en hel del död bokved och även viss olikåldrighet och skiktning.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Frisk gräsmark, trädbärande hagmark

BIOTOPKVALITET

Beteshävd, stenbunden tuvig mark, blockrikt, grov död ved, stubbar med mulm, solexponering, grova björkar, trädbärande betesmark, fuktäng, hålträd, solitära träd, stenmurar, rösen, hagtorn, rönn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410, 6270).

NATURVÅRDSARTER -

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, Riksintresse naturvård,

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd. Spara grova träd och död ved.



142. BETESLANDSKAP VID KÖLLERÖD

Naturvärdesklass: 2

Kuperat beteslandskap vid Kölleröd. De nötbetade markerna är mest ogödslade och välbetade med en stenbunden tuvig enbuskmark och artrik flora. Det finns dock ytor där betet varit svagt och som är igenvuxna med högt gräs. I terrängsvackor finns betade fuktängar med artrik flora och riklig förekomst av fjärilar. I objektet finns också ridåer av alar vid gamla diken. Spritt finns solitära blommande buskar och vidkroniga äldre lövträd av olika trädslag, särskilt av bok. Inom objektet ingår några gödslade gräsmarker med trivial flora samt ett par hyggen. Omväxlande med de öppna betesmarkerna växer ädellövskog (bok, ek) och triviallövskog (al, björk, asp), som ingår i betesområden. Kulturhistoriskt rikt landskap med fågator, stenmurar, gammal torpruin och rösen. Sammantaget ett mycket värdefullt mosaiklandskap.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Utglesning av igenvuxna partier med enbuskar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng, betad lövskog

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova vidkroniga lövträd (oxel, rönn), hagtorn, enbuskar, våtmark, alhögstubbe, alsockel, dammar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Stor sotdyna* NT, borsttåg* NT, backtimjan* NT, jordtistel* NT, ask* EN, gullpudra* S, stenskvätta* §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.



143. FATTIGKÄRR SÖDER OM SIAHULT

Naturvärdesklass: 3

Objektet består av ett fattigkärr där det bl. a växer kärrsilja, kärrspira, topplösa, kråklöver, tuvull, spikblad och hirsstarr. Rikligt med trollsländor. I omgivningarna runt kärret finns gamla utmarksbokar och enefälader som delvis är igenväxta och här noterades grönvit nattviol. I kanten av kärret har vide och björksly börjat etablera sig. På laga skifteskartan över Bessinge by från 1839 har de fuktiga områdena på utmarken färglagts på samma sätt som ängarna på inägorna, vilket kan betyda att de blöta partierna på utmarken har slåtrats. Objektet går under lokalsamnamn "Rammen".

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Fattigkärr, vattensamlingar

BIOTOPKVALITET

Grov död ved, småvatten, klen död ved, stenmurar, fuktsänkor, gungfly, mjukmattor,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp: (7140)

NATURVÅRDSARTER:

Kärrspira* N, grönvit nattviol* N, §,

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ingår i riksintresse naturvård, Ingår i ängs- och betesmarksinventeringen som restaurerbar.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Röjning av uppväxande sly i kanterna, undvik negativ hydrologisk påverkan



144. BETESMARKER VID GUDDASTAD

Naturvärdesklass: 2

Beteslandskap med varierande hävdstatus, näringspåverkan och naturvärde. De sydvästra delarna är minst näringspåverkade och har betats med nöt intill nyligen. Där finns blomrik (liten blåklocka, röllika, fibblor, ljung, johannesört) stenbunden mark också med naturvårdsarter av växter och mycket fjärilar. Övrig mark är intensivt hästbetad, med överlag näringsgynnad vegetation och artfattig flora utom längst i norr. I terrängsvackor finns betade fuktängar med artrik flora och riklig förekomst av fjärilar. I objektet finns också ridåer av alar vid gamla diken. Spritt finns äldre lövträd av olika trädslag. Inom objektet ingår också ytor på hyggen, välbetade men artfattiga. Några gödslade gräsmarker med trivial flora samt ett par hyggen. Nyrensat dike i norra delen.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng, högörtäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova vidkroniga lövträd, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, backtimjan* NT, ask* EN

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Utglesning av igenvuxna partier med enbuskar.



145. HAGMARK NORR OM HÖNSAMOSSEN

Naturvärdesklass: 3

En stenbunden hagmark med representativ flora. En fågata leder till objektet och centralt i objektet finns ett fuktstråk. En kanaliserad bäck utgör nordgränsen. Arter som bl. a. stenmåra, gökblomster, gulvial, kråklöver, gåsört, ärenpris, tuvtätel, kabbleka, röllika och blodrot förekommer. Marken visar tecken på viss näringspåverkan och en hel del älggräs förekommer. I södra delen av objektet finns en bokbacke med några grova och bukettformiga exemplar av värde. I öster har betesmarken mer karaktären av enefälad. Dock har några enar tagits bort och partiet är mest öppet idag. Objektet är omgärdat av stengårdsgårdar och spår av en husgrund finns också inom objektet. Väldigt fågelrikt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, husgrund, vattendrag (bäck), grova bokar, spärregreniga bokar, död ved, grov bokhögstubbe, tickor, apel,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130)

NATURVÅRDSARTER

Stenmåra* S, gökblomster* S, kråklöver* S,

ARTRIKEDOM

Fågel- och insektsrikt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd, ingen konstgödning, spara död ved.



146. LÖVSUMPSKOGAR MELLAN BÖNHULT OCH FRÄNNARP

Naturvärdesklass: 3

Lövsumpskogar mellan Bönhult och Frännarp av olika dominerande trädslag, ålder och skoglig påverkan. Mest intressant är förekomsten av äldre alsumpskog med stora alsocklar och en låg sentida skoglig påverkan. I alsumpskogen finns både värdefulla värdeelement och naturvårdsarter. Naturvärdet gränsar där till högt. Björksumpskogen är fattigare på främst naturvårdsarter, men innehåller en hel del död ved, särskilt på björkmossen. Däremellan finns öppna men igenväxande våtmarker, som nu är blomrika högörtängar, men som växer igen med sälg, pil, björk och al. Smärre granplanteringar med lågt naturvärde ingår också i objektet. Totalt sett ett varierat sump- och våtmarksobjekt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Björkmosse, klibbalkärr, klibbalskog av översilningstyp, våtmark

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, björkhögstubbe, björklåga, högörtängar, diken, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6430, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Dvärghäxört* S, gullpudra* S, revlumner* §, stor sotdyna* NT, alsidenmossa* N, blåmossa* §, plattnosbagge NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (delvis) / ArtData, äng och betesmark, nyckelbiotop



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling. Spara död ved och gamla träd.



147. BETESLANDSKAP NORR OM ORMASTORP

Naturvärdesklass: 2

Ett större beteslandskap vid Ormastorp. Stenbundna välbetade tuviga gräsmarker med lågvuxen ljung dominerar. På oödslade ytor finns en artrik flora och många dagfjärilar. De nötbetade markerna inrymmer också flera tuviga fuktängar och högörtängar. Det finns dock partier med viss näringspåverkan på vegetationen, och där är blomrikedomen lägre. Solitära träd växer spritt i objektet. Särskilt ett flertal grova rötskadade sälgar kan nämnas. På en kulle i den norra delen växer gammal grov högvuxen bokskog med många värdeelement, bland annat grov död ved. I terrängsvacka norr därom finns klibbalskog och alkärr. Många naturvårdsarter av olika organismer har påträffats, särskilt av kärlväxter, fåglar och dagfjärilar. Sammantaget ett värdefullt mosaiklandskap av betesmarker, fuktängar, solitära lövträd, klibbalskog och grov betad bokskog.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefäläd, betad bokskog, klibbalkärr, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktängar, högörtängar, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära grova lövträd, våtmarker, grova bokar, hålträd, rötskadade bokar, grova bokhögstubbar och lågor, alsocklar, alhögstubbar, björklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6270, 6410, 6430, 9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, jordtistel* NT, gröngöling* NT, §, buskskvätta* NT, §, gulsparr* VU, §, törnskata* §, silversmygare NT, violett kantad guldvinge NT, sotnätfjäril NT, ängsmetallvinge NT



ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (delvis) / ArtData, äng och betesmark, nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Ingen konstgödning. Röjning av uppväxande sly.



148. FÄLAD VID ÅKESLUND

Naturvärdesklass: 2

En stenbunden fäladsmark i ett småbrutet odlingslandskap med en representativ flora. Stor population av slättergubbe och Jungfru Marie nycklar. För övrigt består fältskiktet bl. a av borsttåg, grönvit nattviol, svinrot, ängsskallra, knägräs, darrgräs och blåtåtel. I öster är arttätheten som störst, minskande västerut. Objektet består av solitära enar och enstaka granar. Den södra delen av objektet är av sumpmarkskaraktär. Objektet har förmodligen varit gammal inägomark. Vidare är området en viktig biotop för fjärilar och andra insekter.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, torräng, friska marker, fuktängar, källmarker

BIOTOPKVALITET

Blomrik högrötsäng, enefälad, diken, fuktsänkor, torrbackar, torrträd, blockrik tuvig mark, stenmurar,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410, 6230, 5130)

NATURVÅRDSARTER

Jungfru Marie nycklar* §, slättergubbe* VU §, darrgräs* N, Grönvit nattviol* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark, ArtData, ingår i Riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beteshävd, röjning av igenväxande partier, undvik konstgödning



149. ODLINGSLANDSKAP VID BYLYCKE

Naturvärdesklass: 3

Ett kuperat kulturlandskap bestående av bitvis blockrika betesmarker omgärdade av gamla välbevarade stengärdsgårdar. Betesmarken har stora öppna ytor med några enstaka björkar och ekar. I de norra betesmarkerna förekommer fuktstråk. Fältskiktet är triviale och marken är näringspåverkad. Arter som till exempel kärrtistel, veketåg, kärrdunört, tuvtätel, lomme, toppdån och mjukdån förekommer i de mer fuktigare partierna. I övrigt förekommer även liten blåklocka, gråfibbla, brunört, gatkamomill, teveronika och fältveronika. Ett dike förekommer centralt i objektet där bl. a. kaveldun, älggräs och mjölkört växer. I nordost och i angränsning till torvtåkten förekommer en björk- och gransumpskog som till sist övergår till mosse. I fältskiktet här växer bl. a. blåbär. I objektet finns ett parti där man tidigare brutit torv som idag delvis är en öppen vattenspegel. I angränsning till betesmarken i väst finns en mindre bokskog med tämligen grova exemplar. Denna bokskog omges av bokföryngring som i sin tur omges av nästintill avverkningsmogen granskogsplantering. Vid stengärdsgårdarna förekommer individer av bl.a. bok, hassel, ek och björk varav vissa är särskilt värdefulla.

En gammal torparruin finns i nordost längst med vägen. I öster finns en bokskog med nästan obefintligt fältskikt. Dock växer här krustätel och blåbär. Objektet är rikt på klövvilt, fåglar och spår av räv noterades vid återinventeringen.





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, blandlövskog, öppna våtmarker

BIOTOPKVALITET

Diken, småvatten, stenmurar, stenrösen, husgrund och raserad jordkällare av sten, stenbunden mark, grov bok, hässle, boklågor, bokhögstubbe, tickor, spärrgrenig bok,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) - NATURVÅRDSARTER

Mjukdån* NT,

ARTRIKEDOM

Måttligt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad hävd av gräs- och betesmarker. Ingen spridning av konstgödning, röjning av sly

150. ALSUMPSKOG NORR OM BÖNHULT

Naturvärdesklass: 3

I huvudsak alsumpskogar på relativt plan mark. Medelåldrig till äldre högvuxen alskog med inslag av björk, rönn, ek och bok. I fältskiktet arter som älgört och strandklo. Det finns partier med stillastående vatten och viss sockelbildning. Enskiktad och överlag likåldrig alskog. Sparsamt med död ved överlag.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Lövsocklar, klen död ved, stillastående vatten, alhögstubbar, grov ek, rötskadade träd, torrträd, grova bokar, björkhögstubbar, boklågor, bokhögstubbar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, dvärghäxört* S, kransrams* S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM


Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (en mindre del) / Nyckelbiotoper, sumpskogar, skyddsvärda träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk negativ påverkan. Fortsatt bete av hagmarken.



151. ALSUMPSKOG OCH EKHAGMARK

Naturvärdesklass: 2

I huvudsak alsumpskogar på relativt flack mark. Äldre högvuxen alskog och partier med stillastående vatten och viss sockelbildning. Inslag av björk, rönn, ek, bok och sälg. Mycket älgört i fältskiktet. Sparsamt med död ved överlag. Nära gården finns en betad ekhagmark med grova vidkroniga ekar och tallar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp, klubbalkärr, ekhagmark

BIOTOPKVALITET

Lövsocklar, klen död ved, stillastående vatten, alhögstubbar, grova ekar, grässvål, rötskadade träd, torrträd, grova bokar, björkhögstubbar, boklägor, bokhögstubbar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och bete, sumpskog, skyddsvärda träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk negativ påverkan. Fortsatt bete av hagmarken.



152. ALSKOGAR SÖDER OM BÖNHULT

Naturvärdesklass: 2

I den södra delen av objektet växer en högvuxen äldre alsumpskog med stora sockelbildningar. Skogen är där relativt enskiktad och inslag finns av björk, rönn, bok, ask, och oxel. Förekomsten av död ved är måttlig. En bäck kantad av artrik flora rinner genom objektet västerut. Vanliga arter i fältskiktet är kärrviol, älgört, harsyra, ormbunkar, gulplister, hampflockel och ekorrhör. I de mellersta delar växer en äldre blandädellövskog av ek och bok med inslag av björk och tall. I kantzoner mot öppen mark växer grova ekar och bokar och i buskskiktet olvon, hägg och hassel. Ett högvuxet askkärr finns i den norra delen av objektet. I terrängsvackan med ask har många grova döda träd fallit och bildar nu lågor och rotvältor. Omgivande källmarker översilas. Artrik kärnväxtflora med flera naturvårdsarter.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, askkärr

BIOTOPKVALITET

Stora alsocklar, torrträd, allågor, högstubbar, bäckfårar, asklågor, jätteek, rötskadad grov bok

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Kärrfibbla* S, bäckbräsmå* S, gullpudra* S, rankstarr* S, skärmstarr* S, lundstjärnblomma* S, stor häxört* S, grönvit nattviol* S, kransrams* S, rutlungmossa* S, aklejruta* S, ask* EN, dvärghäxört* S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nyckelbiotop, sumpskog, skyddsvärda träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling av sumpskogen. Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Fortsatt bete av hagmark.



153. LÖVSKOGAR OCH JÄTTETRÄD VID HARPHULT

Naturvärdesklass: 2

Mosaik av äldre bokskogar, alkärr och öppna betesmarker med träd-solitärer. Förutom al och bok är björk, ek och rönn vanliga trädslag. Markfuktigheten varierar från fuktig till frisk. Skogen är mestadels skogsbetad av nöt och då glesare än normal skog. Överlag relativt gott om död ved, mest som grova bokhögstubbar och lågor. Medelåldrig högvuxen bokskog finns på flera platser och är mest gallringspåverkad och har lägre naturvärde. Förekomst av ett stort antal grova träd, främst av bok. Även förekomst av ett flertal rödlistade arter knutna till trädmiljöer. Betesmarkerna har dock lägre naturvärde, antingen är de obetade och igenväxande eller betade men relativt örtfattiga. Totalt sett ändå ett ovanligt och värdefullt objekt i dagens produktionslandskap.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av örtfattig typ, klibbalkärr, ädellövskog, björkhage, högtörtangar i fuktsvackor

BIOTOPKVALITET


Jätteträd av bok, grov klibbal, björk, gran och asp, grova rötskadade bokar, grova bokhögstubbar och grova boklågor, grova björkhögstubbar och lågor, gamla alar, alhögstubbar med lågor, grova alsocklar, periodvis stillastående vatten, döda grova ektorrträd, rösen, stenmurar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080, 9130).

NATURVÅRDSARTER

Kärrfibbla* S, rankstarr* S, skärmstarr* S, gullpudra* S, bäckbräsa S, dvärghäxört* S, stor sotdyna* NT, jätteticka* N, bokfjädermossa* NT, trädporrella* S, bokvårtlav NT, jättesvampmal* NT



ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (liten del) / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och gärna utökad beteshävd av nöt.



154. AL- OCH BOKSKOG VID JÄGERTSLUND

Naturvärdesklass: 3

Lövskogsområde bestående av alsumpskog och äldre bokskog. Inslag finns av ask, björk, rönn, asp, ek, sälg och gran. Alsumpskogen är mest medelåldrig. Viss sockelbildning förekommer och det finns totalt sett en hel del död ved. Bokskogen är grovvuxen med inslag även av grövre ek samt enstaka senvuxna rötskadade bokar, högstubbar och lågor. Få sentida avverkningsspår ses i skogen, men diken dränerar sumpskogsmiljöer i närheten.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, bokskog av fryletyp

BIOTOPKVALITET

Torrträd, lågor, rotvältor, periodvis stillastående vatten, grova lövträd, grova ädellövträd, rötskadade senvuxna bokar, äldre ekar, alhögstubbar, bokhögstubbar, klen lövved, stenmur, dike

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, ask* EN, kärrfibbla* S, kransrams* S, buskstjärnblomma* S, platt fjädermossa* S, lönnlav* S

ARTRIKEDOM

Måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturvårdsavtal (civilrättsligt avtal) / Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik negativ hydrologisk påverkan och markskador, särskilt i sumpskogen.



155. BETESMARK OCH ALSUMPSKOG VID HUNNABACKEN

Naturvärdesklass: 2

Mosaiklandskap av träddungar, björkhagar, alsumpskog, enefälader och fuktängar. Vid sidan av fuktängarna frisk gräsmark eller torrare kortväxt stenbunden ljungmark. Förekomst av en värdefull hävdgynnad flora. Sälunda växer slättergubbe rikligt i objektet. Markerna betas av nötkreatur.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalskog av översilningstyp, fuktäng, trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Blomrik fuktäng med rik flora, stenbunden betad mark, enbuskmarker, stenmurar, rösen, diken, solitär säl

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Sotnätfjäril* NT, violettkantad guldvinge NT, slättergubbe* VU, §, granspira* NT, borsttåg* NT, jordtistel* NT, jungfru Marie nycklar* §, jungfrulin* N, ask* EN, rankstarr* S, skärmstarr* S, kärrfibbla* S, gullpudra S, gulsparr* VU, §, gröngöling* NT, §, buskskvätta* NT, §, stenskvätta* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturresevat (delvis) / ArtData, äng och bete

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd.



156. FJÄLLMOSSEN

Naturvärdesklass: 1

Stor öppen högmosse. Den sydligaste större högmossen i Sverige. I kantzoner kring mossen förekommer en rad olika naturtyper, som enbuskmarker, hedar, bokskog och lövsumpskogar. Mosseplanet är koncentriskt och vegetationen utgörs av enstaka lågvuxna tallar och ung björk. Vegetationen domineras av för denna mosstyp typiska växter som rosling, tranbär, klockljung, ljung, vitag (halvgräs), silesår och vitmossa. Endast liten och begränsad påverkan av hydrologi och tidigare torvbrytning. En av Sveriges sydligaste spelplatser för orre, som dock minskat under senare år och kan vara på väg att försvinna. Värdefullt fågelliv även i övrigt. Fjällmossen har en stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Kärnområdet är svårtillgängligt från Hörby kommun, men det är bättre åtkomst till översikt över mossen från fågeltorn i Kristianstads kommun.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Högmosse

BIOTOPKVALITET

Öppet mosseplan, skogsholmar, laggkärr

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen samt förekomst av Natura 2000-naturtyper, som delas med reservatet Viggårums-Fjällmossen (4030, 5130, 6230, 6410, 7110, 7120, 7140, 9070, 9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Orre §, storspov NT, §, trana §, mindre hackspett NT, §, gulspurv VU, §, ängsپیلärka NT, §, tibast S, revlumner §, vanlig groda §, mindre bastardsvärmare NT, mindre purpurmätare NT, violett kantad guldvinge NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än liknande myrar i kommunen.



OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Naturresevat (delvis), naturvårdsavtal (delvis), Natura 2000-område (delvis) / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Enligt bevarandeplan (Natura 2000).



157. FJÄLLMOSSEN-VIGGARUM NATURRESERVAT

Naturvärdesklass: 3

Mosaiklandskap av öppna betade frodiga gräsmarker, fuktängar, träddungar, björkhagar och olikstora öppna dammar. Överlag näringsgynnad örtfattig flora, ofta mest med brännässla och smörblommor. Förekomst av intressanta växter främst i fuktstråk och i dammar. Inslag här och var av solitära rötskadade träd och döda träd. Naturvärdet inom objektet varierar betydligt, från högt (klass 2) till visst (klass 4). Bete sker genom får och hästar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Fuktäng, björkhagmark, dammar

BIOTOPKVALITET

Betad mark, fuktängar, dammar, enbuskmarker, stenvägar, rösen, grov solitär björkhögstubbe, döda alar i damm, solitär rötskadad säl, rötskadad ek, vidkronig grövre ek

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper som delas med objektet Fjällmossen (4030, 5130, 6230, 6410, 7110, 7120, 7140, 9070, 9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Sotnätfjäril* NT, hagtornsfjäril S, borsttåg* NT, krypfloka* EN, §, rödlänke NT, buskstjärnblomma S, trana* §, skalbaggen *Scaphisoma subalpinum* NT,

ARTRIKEDOM

Ungefär lika artrik som omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturresevat / ArtData, äng och bete

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beteshävd. Viss röjning av igenväxta hagmarksdelar.



158. FUKT- OCH HÖGÖRTSÄNGAR ÖSTER OM VIGGARUM

Naturvärdesklass: 2

Mosaiklandskap av alsumpskogar, björkhagar, enefälader och inte minst fukt- och högörtsängar. Stenbunden eller tuvig mark. Vid sidan av fuktängarna frisk gräsmark eller torrare kortväxt ljungmark. Inslag av översilad alsumpskog i olika stråk i objektet. Varierande hävd, men något svag. Mycket rik flora med många hävdgynnade arter. Stor population av bland annat slättergubbe. Även ett rikt fjärilsliv, med en stor population av sotnätfjäril. Mycket värdefullt objekt. Vid optimal skötsel vore detta ett objekt av högsta klass. Det måste därför uppmärksammas i naturvårdsplanering och skötsel framdeles.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Fuktäng, högörtäng, klibbalskog av översilningstyp, björkhagmark, enefälad, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Blomrik högörtsäng, fuktängar med rik flora, stenbunden betad mark, damm, enbuskmarker, aspholme, alsumpskog, bäck, igenväxta åkrar, stenmurar, rösen, diken

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 6430, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Sotnätfjäril* NT, violettekantad guldvinge* NT, hagtornsfjäril* S, ängsmetallvinge* NT, slättergubbe* VU, borsttåg* NT, granspira* NT, darrgräs* N, svinrot* N, jungfru Marie nycklar* §, blågrönt mannagräs* VU, småvänderot* N, ängsfiol* NT, §, grönköping* NT, §, buskskvätta* NT, §, gulspurv* VU, §, bokpraktbagge* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och bete.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beteshävd, Rójning av igenväxande delar av betesmarken



159. ALSUMPSKOGAR VID RY

Naturvärdesklass: 3

Sammanhängande stråk av alsumpskog i olika ålder och sentida skoglig påverkan. Merparten är dock överlag äldre alskog med stora välutbildade socklar. Sparsamt med död ved, även om det finns enstaka hålträd, högstubbar, torrträd och lågor. Enskiktade och mest likåldriga sumpskogar med ett begränsat inslag av andra trädslag. Inslag finns dock av björk, bok, gran och ek. Om våren finns stillastående vattensamlingar och smärre bäckar i objektet. I fältskiktet mest arter som älgört, ormbunkar, kärrfibbla och vattenmåra. En gallrad äldre bokskog ingår i smärre delar liksom en betad grov bokskog med bukettformigt växtsätt. Invid och mellan alsumpskogarna växer mest planterade yngre granskogar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalkskog av översilningstyp, klubbalkärr, bokskog av fryletyp

BIOTOPKVALITET

Högstubbar, lågor, torrträd, hålträd, sockelbildningar, vattensamlingar och smärre bäckstråk (uttorkade vid besöksstillfället), stenblock, grova bokar, bokhögstubbar med tickor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, gullpudra* S, skärmstarr* S, bivråk* NT, slåttergubbe VU, §, borsttåg NT

ARTRIKEDOM

Måttlig



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nyckelbiotop, objekt med naturvärde, sumpskog, ängs- och bete, ingår i riksintresse för naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan.



160. ÖPPEN MARK VID KVARNHEM

Naturvärdesklass: 2

En mycket örtrik enefälad och öppen hagmark som ligger i en relativt flack och intensivt uppodlad bygd. Två mindre vattenspeglar förekommer. Objektet har ett glest trädskikt bestående av ask, apel, alm och rönn. Buskskiktet består av glest förekommande enar och nypon, samt björksly. Fältskiktet består av flera arter som är känsliga för gödsling och svag hävd. Viss gödselpåverkan finns i den sydliga delen. En pestkyrkogård ska ha funnits i området och ett stengärde finns i norra delen. Fågellivet är rikt med t.ex. glada, gravand, tofsvipa, stenskvätta, storspov, hämpling och sånglärka.

Fältskikt: gråfibbla, darrgräs, teveronika, gåsört, gulvial, småhavrerot, ängsbräsma, stenmåra, kärrstjärnblomma, jordtistel, hönsarv, jordreva, kråkvicker, humleblomster (stort antal), mandelblomma, Sankt Pers nycklar, svinrot och gökärt. Tidigare noteringar är bl.a. smörbollor, buskviol, slättergubbe och revfigibbla

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska bitvis trädbärande gräsmarker,

BIOTOPKVALITET

Småvatten, rönn, enebuskar, ornitologiska värden, apel

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Sankt Pers nycklar* §, jordtistel* NT, ask* EN, alm* CR, storspov* NT, §, glada* §, gravand* §, tofsvipa* §, stenskvätta* §, hämpling* §, sånglärka* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd





161. FÄLAD VID PÅARP

Naturvärdesklass: 3

En örtrik enefälad som ligger i en relativt flack helåkersbygd strax norr om sluttningarna ner till Vombsänkan. Större delen av objektet är öppet men med glest förekommande breda enar. Ett tätt buskskikt med bland annat sälgsly och björk förekommer mellan det nordöstliga enbeståndet. Objektet verkar ha tappat i naturvärde på senare år som följd av igenväxning. Förekommer även små friska-fuktiga markpartier i objektet. Ett örtrikt fältskikt med arter som t.ex. gökärt, stenmåra, gråfibbla, humleblomster, ärenpris, gåsört, mjuknäva, teveronika, krustistel, ängsbräsmå, svinrot, grusstarr och luddtåtel. Tidigare har noterats backtimjan, buskviol och jordtistel. I nordsydlig riktning finns en avlång stendeponi. Betesmarken är stenmursomgärdad och odlingsrösen och en fågata förekommer. I öster finns en svag gödselpåverkan och spår av stödutfodring noteras. Fågellivet är rikt i objektet.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska öppna gräsmarker, enefälad

BIOTOPKVALITET

Blommande träd och buskar, stenbunden och tuvig mark, småvatten, stenmurar, rösen, fågata, ornitologiska värden,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 5130)

NATURVÅRDSARTER

Svinrot* S, sånglärka* NT, §, gök* §, gulspurv* VU, §, stenskvätta* §, gransångare* §, glada* §, tofsvipa* §, storspov* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningen



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Förbättrad beteshävd, röjning av sly och av igenväxande partier



162. EKAHAGE VID ASKERÖD

Naturvärdesklass: 3

I direkt anslutning till Askeröd ligger en mindre ekhage med inslag av bok, ask och rönn med höga naturvärden. Inom objektet finns stråk av fuktig mark och några öppna vattenspeglar. I fältskiktet förekommer bl.a. vitsippa, gulsippa, ängsbräsmå, vårarv och kabbleka. Tidigare har noterats smörboll. Buskskiktet består av nypon, fläder och hassel. Objektet är även intressant för rekreation och det fungerar som en refug i det annars jordbruksdominerade landskapet.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Träbärande hagmark,

BIOTOPKVALITET

Småvatten, stenbunden mark, högstubbe, lövlåga, hässle, blommande träd och buskar, rest av hamlade träd, torrakor, död ved

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6530)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, ängsbräsmå* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen hävd, röjning av sly i igenväxningspartier, bevara död ved.



163. BORSTBÄCKENS DALGÅNG

Naturvärdesklass: 1

En ädellövskog i Borstbäckens flacka dalgång. Borstbäcken utgår från Sjömossen och vissa somrar torkar bäcken ut. Stora delar av objektet är starkt kuperat och blockrikt utan synlig kvävepåverkan. Torrakor förekommer, främst ask. Intressanta arter som kan nämnas i fältskiktet är pipstäkra, skogslysing, hässleklocka, storrams, ramslök, kransrams, långsvingel och blekbalsamin. Skogspartiet består till stor del av avenbok och bok men även av t. ex ask och al. Dalgången är mycket vacker och har ett stort värde för landskapsbilden. Viktigt objekt för sländor. En del har nyligen blivit gallrad och här noteredes orkidéer. En fin äldre stenvalvsbro korsar bäcken. I objektet ingår även en ängs- och betesmark med trivial flora som darrgräs och humleblomster. Objektet gränsar till Eslöv och Sjöbo kommuner. Den invasiva arterna Gul skunkkalla och blekbalsamin är noterade i objektet.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog i bäckravin

BIOTOPKVALITET

Naturlig skogsbäck, källmark, översilning, grova lövlågor, rotvältor, asktorrträd, död grov ved, död småved, grov eklåga med mulm, stenbunden mark med block, stenbunden tuvig mark, stenmurar, stenvalvsbro över vatten, grus och sand på bäckbotten,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080)

NATURVÅRDSARTER

Lundviva NT, darrgräs N, ask* EN, bäckbräsm S, försärla §,

ARTRIKEDOM

En av Skånes artrikaste svamplokaler ligger utmed bäcken nedströms, i bokskogen i Eslövs kommun.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Natura 2000-område, Biotopskydd, gränsar till naturreservat Borstbäcken, rikt på fornminne, Riksintresse naturvård, ingår i utpekad strandskydd / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan i dalgången, granfri utveckling, spar död ved, frihugg grova ekar, träd som riskerar dämna vattenflödet bör rensas bort.



164. ÄDELLÖVSKOGSPARTI NORR OM VÄSTERSTAD

Naturvärdesklass: 3

Ett litet bokdominerat ädellövskogsområde direkt norr om Västerstads kyrka. Ett litet inslag av ask, björk och al förekommer. Bortsett från 7 st. grova och spärrgreniga ekar som står i sydöstra delen av objektet (i direkt anslutning till kyrkogården) samt 2 längs med infarten, förekommer i princip inte träd av grövre dimension (brhd > 60 cm). Skogens täthet varierar i objektet där man i vissa delar nyligen och/eller tidigare har gallrat en stor del av trädskiktet. De nyligen gallrade delarna saknar nästan helt ett buskskikt och andra delar har ett väldigt tätt buskskikt med föryngring av bl.a. bok och björk. Fältskiktet var genomgående trivialt med bl.a. arter som harsyra, ekorrbär, stor häxört, vanlig gulplister och vecketåg. På de blottade ytorna har älggräs börjat växa fram. Den östliga delen av objektet är helt avverkat med några få individer kvarlämnade. Granskogen norr om objektet var också avverkat. Ädellövskogen utgör i sin helhet ett tämligen stort skogsparti, som är värdefullt i det annars enformiga åkerlandskapet. Västerstad och området runt omkring åskådliggör många av de landskaps- och bystrukturella förändringar som är typiska för 1800-talet, som t.ex. att gårdarna ligger skiftade. Objektet är av värde som ett tätortsnära rekreationsområde för Västerstad. På sina ställen även rikligt med död ved och torrakor som är av värde.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog,

BIOTOPKVALITET

Grova spärrgreniga ekar, död ved, torrakor, tickor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) -

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik ett rationellt skogsbruk, granfri utveckling.





165. SVARTE MOSSE SÖDER OM VÄSTERSTAD

Naturvärdesklass: 3

En f.d. mosse som har varit utsatt för torvtäkt och dikning. Idag är mossen snarast att beskriva som björksumpskog. Inom objektet finns även öppna vattenspeglar och enstaka grova björkar. I övrigt är träden varierande grova med inslag av bl.a. asp och ask. I fältskiktet har tidigare noterats bl.a. kärrsilja, tallört, storrams och kärrfibbla varav tallört och kärrfibbla bekräftades vid återinventeringen. I övrigt noterades ett fältskikt som på flera partier domineras av älggräs och hallon. I buskskiktet förekommer det förutom brakved, rikligt med föryngring av rönn. I det mer öppna området där träden inte fått fäste växer ett tätt bestånd av vass. I sydost finns en kvävepåverkad betesmark med trivial flora. Arter som noterades var bl. a. trädklöver, gulmåra och gåsört. Objektet kan anses vara viktigt för amfibier och sländor tack vare de befintliga vattenspeglarna. Förutom rikligt med klövviltsspår observerades även gärdsmyg och morkulla. Objektet fungerar som en refug i det annars intensivt odlade landskapet och har ett visst värde för landskapsbilden.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Björkmosse

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, klen död ved, tickor, småvatten, rönn,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp -

NATURVÅRDSARTER -

ARTRIKEDOM

Måttligt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, ängs- och betesmark,



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk negativ påverkan, spar död ved



166. BETESMARK VID AMALIETORP

Naturvärdesklass: 3

Öppen nötbetad gräsmark i ganska flack terräng. En avlång bevattnings-damm ligger i objektets centrala delar. Betesmarken väster om denna damm har en påfallande näringspåverkad vegetation där högt gräs eller högört dominerar. Öster om denna damm ökar tuvigheten i fuktstråk samt kortbetade smärre höjder med riklig förekomst av jordtistel. Gott om trollsländor i dammen. Förekomst även av solitära träd, ofta vidkroniga ekar eller bokar i bryn, främst i objektets södra del. Stenmurar och djupa diken ingår också i gräsmarksområdet. Relativt fågelrikt objekt med häckning av flera naturvårdsarter.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska gräsmarker, fuktängar, ädellövskog

BIOTOPKVALITET

Öppen betesmark, fuktäng, vidkronig ek och bok, grova rötskadade ädellövträd, grova lågor och högstubbar, grov oxel, bevattningsdamm, dike, stenmur, röse

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410, 6430, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, jordtistel* NT, borsttåg* NT, gulspurv* VU, ängsplärka* NT, buskskvätta NT* §, stenskvätta* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom utpekad strandskydd/ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd. Låt död ved vara kvar, gärna i solöppna lägen.



167. HAGMARK VÄSTER OM ÖSTRABY

Naturvärdesklass: 2

Ett stort, öppet och sammanhängande objekt med betesmarker med gräshedsvegetation som bitvis är blockrika och i stora delar välbetat. I florin har bl.a. jordtistel, borsttåg, gökblomster och liten blålocka noterats. Vid återinventeringen noterades blodrot, gulmåra, kråkvicker, brunört och rikligt med darrgräs i vissa partier. I den sydvästra delen finns ett fuktstråk där bl. a. kärrtistel växer. Buskskiktet är i stort sett obefintligt förutom vid stengårdsgårdarna. Törnskata observerades vid återinventeringen. Betesmarkerna som i vissa partier var starkt tuvad, omges av stengårdsgårdar och diken. Ett djupt dike löper i den nordöstra gränsen och delar av objektet. Norr om diket finns ett litet skogsparti (f.d. ekhage) med några gamla och grova ekar. I trädsiktet finns förutom ek även lind, björk, asp, körsbär och alm. En del död ved förekommer, framför allt i form av några grova lågor med riklig påväxt av vedsvamp. I det medeltäta till täta buskskiktet förekommer främst hassel, men även rönn och alm. I fåltsiktet förekommer bl. a. getrams, stinknäva, hallon och stor häxört. Skogspartiet är värdefullt då det fungerar som en refug i åkerlandskapet.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Torra hedar, hävdpräglad gräsmark

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, rösen, blockrika marker, tuvig mark, grova eklågor, döda grova ektorrträd, död ved, klen lövved, torrakor, fuktstråk, småvatten, blommande träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 6270)



NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, borsttåg* NT, lind* S, alm* CR, stor häxört* S, darrgräs* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningen

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, Fornminne

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd, undvik rationellt skogsbruk i skogspartiet, röjning av uppväxande sly





168. SJÖMOSSEN

Naturvärdesklass: 3

Skogsbevuxet stort och relativt svårtillgängligt mossområde omgivet av intensiv odlingsbygd. Mossen är kraftigt påverkad av tidigare dikningar och torvtäkter. Det finns inget helt ostört öppet mosseplan på myren. Dock finns öppna partier med bland annat klockljung. Även en smärre myrgöl ansluter till den största öppna mossytan. Björkskog dominerar i objektet, men smärre koncentrationer av aspskog och granplanteringar ingår. Tall och klibbal finns nästan inte alls. Längs med den södra delen växer ett bälte med rikare skogsparti, innehållande ask, alm, oxel och rönn. Björkskogen är mest medelåldrig, men det finns spridda grova äldre björkar och en del död ved, ofta med fnöskticka. Odon, lingon, ljung, klockljung och kråkris är vanligt ris på kvarvarande mossepartier i och mellan torvgravar. Blåtåtel är ofta helt dominerande på småvägar och stigar. I den gamla torvtäktens flarkar finns stillastående vattensamlingar, ofta med vitag. Låg skoglig aktivitet i objektet, som verkar mest nyttjas för jakt. Otillgängligt objekt för friluftslivet – det finns inga allmänna tillfartsvägar eller parkeringsplatser.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Björkmosse, sekundär lövskog, aspskog

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, videsnår, asphögstubbar med lågor, rötskadade aspar med bohål, tickor, klen död ved, småvatten, öppna flarkar med vitag, diken, myrgöl

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, stor häxört* S, skärmstarr* S, revlumner* §, blåmossa* §



ARTRIKEDOM

Ej påtagligt artrikare än omgivande landskap.

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel i objektets lövskogar och ytterligare hydrologisk negativ påverkan. Spara död ved.



169. HAGMARK SÖDER OM SÖDERGÅRD

Naturvärdesklass: 3

Friskäng och fuktäng där bl.a. smörbollar och vårstarr har noterats. Vid återinventeringen observerades arter som hundstarr, gökblomster, darrgräs, ängsfryle, humleblomster, kärrstjärnblomma, kabbleka, sparvnäva och ängsull i de fuktigare partierna i nordväst. Antydning till viss näringspåverkan och älggräs förekommer fläckvis rikligt. I de torrare delarna förekommer bl.a. jordtistel, ärenpris, blåsuga och käringtand och några få lågväxta enar. Trädskiktet består av solitära exemplar av al, ek, bok, körsbär och pilar. I sydväst finns en särskilt stor och grov bok och värdefulla ekar förekommer längs stengärdsgårdarna. Invid betesmarken finns en gammal åker eller slåttervall med tydliga terrasser och trivial flora. Rikt fågelliv förekommer i objektet som annars även är viktigt för landskapsbilden då det omges av ett brett jordbrukslandskap. Objektet gränsar mot Sjöbo kommun.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Hävdpräglad gräsmark,

BIOTOPKVALITET

Solitära ek och bok, solexponering, grova bokar ekar och bokar, spärrgrening bok, viktigt ornitologiskt objekt, blommande träd, döda torrträd, stenmurar, delvis stenbunden mark, hässle

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000 naturtyp (6270, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT,

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Skyddsvärda träd, ArtData, Ängs- & betesmark,

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och helst utökad beteshävd, undvik näringstillförsel



170. HAGMARK NORR OM RÖNÅS

Naturvärdesklass: 2

En kuperad, stenbunden och öppen betesmark som ligger i en mestadels uppodlad bygd vid foten av Linderödsåsen. Objektet har ringa kvävepåverkan. Inslag av enbuskar och några få träd i form av sälg och rönn förekommer. Objektet har ett värde för landskapsbilden då det ligger i ett annars högproducerande åkerlandskap precis intill väg 13. Markfuktigheten i objektet varierar mycket som därmed hyser en hög biologisk mångfald i fältskiktet. Älggräs har börjat dominera i de fuktigare svackorna som visar tendens att växa igen. I svackorna finns även små dungar och solitära av en och enstaka alar, rönnar, körsbärsträd och pilar. Inom objektet finns det ett flertal stengärdsgårdar i bra skick, samt några få odlingsrösen. Rik fågelfauna förekommer med bl.a. gräshoppsångare och stenskvätta. Objektet gränsar i söder mot Sjöbo kommun.

Fältskikt: jordtistel, darrgräs, gökblomster, brunört, äkta ängsskallra, orkidéer, gulvial, ängsbräsmå, sjöfräken, knapptåg, ärenpris, blodrot, kabbleka, kråkvicker, kärringtand, kråklöver, stenmåra, sammetsdagbkåpa, gråfibbla

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Torräng, friska gräsmarker, fuktäng,

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, stenmurar, rösen, solitära träd, tuvig mark, småvatten, blommande träd,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 6270, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, Sankt Pers nycklar* §, grönvit nattviol* §, gräshoppsångare* §, stenskvätta* §, kråklöver* N



ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna,

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen konstgödning bör ske, gärna utökad beteshävd



171. KARL XI STENARNA

Naturvärdesklass: 2

En parkanläggning precis söder om prästgården som i fältskiktet vid inventeringen mest bestod av tuvtåtel-kruståtel-dominerad vegetation. Bok och ek dominerar i trädskiktet samt en del högstubbar. En del träd är skadade och har långa revor i barken. De flesta träden är gamla med grov bark, håligheter och mulm. I den norra delen av anläggningen finns en alsumpmark med öppna vattenytor, detta har varit en parkdamm. Mellan åren 1648 och 1689 var Jöns Hendriksson präst i Östra Sallerup, kanske var det han som anlade parkanläggningen på 1680-talet för att visa trohet mot den svenska kungen. I parken finns bl.a. en stor stenformation som formar texten ”CAROLSVS XI MONARCHA SVECLÆ”, vilket betyder Karl XI Sveriges monark.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Trädbärande betesmark, jätteträd

BIOTOPKVALITET

Grova gamla ekar, grov bark, skadade träd, naken ved, ihåliga träd med mulm, högstubbar stenbunden mark, flack moränmark, delvis sumpig skogsmark, al- och ädellövskog, tickor, dammar och våtmarker

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070)

NATURVÅRDSARTER

Mer än 20 olika trollsländarter, skyddsvärda träd

ARTRIKEDOM

Rikt insektsliv

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, ingår i riksintresse naturvård, fornminne



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och helts utökat bete



172. BETESMARK VID SALLERUP

Naturvärdesklass: 2

En helt öppen och stenbunden (bitvis blockig) betesmark som ligger i ett flackt till något kuperat odlingslandskap. Området har ringa kvävepåverkan. Floran är varierad med bl.a. liten blåkllocka, gråfibbla, och blodrot, men relativt trivial, enstaka exemplar av jordtistel finns. Området är inringat av stengärdsgårdar i bra skick och i sydöstra delen finns ett antal odlingsrösen som också är i bra skick. I mitten av området finns ett anlagt vattenhål. I väster finns en spärrgrenig gammal ek.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Öppen betesmark

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, tuvig mark, stenmurar, rösen, vidkronig ek, våtmark

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs och betesmark, ingår i riksintresse för naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Ingen konstgödning bör ske.



Jordtistel



173. BETESMARKER VID OMSED

Naturvärdesklass: 2

Betade marker som varierar betydligt sett till hävdstatus och näringspåverkan, vilket ger tydliga effekter på vegetation och flora. Stora ytor har fårbetad grässvål och stenbunden tuvig mark, men det finns också betydande delar som är igenvuxna med älggräs, vecketåg, kärtistel och tuvtåtel. Därtill har talrika aluppslag skuggat ut markvegetation längs bäcken med sällsynta växter som krypfloka. Inga av de exklusiva nämnda kärlväxterna sågs, och de kan ha försvunnit. Däremot noterades ett par hävdgynnade rödlistade arter i goda populationer på välbetad tuvig mark. Enbuskar har fläckvis röjts bort för att öppna upp i de tätande enbuskmarkerna. Tydligt näringspåverkad vegetation i stora delar av objektet, men det finns också fläckvis ogödslade partier på öppen mycket stenbunden betesmark. Objekt med varierande karaktär, och som verkar ha tappat i naturvärde på senare år som följd av igenväxning, röjgödslingseffekter, utskuggning och torka. Ännu finns dock höga värden i delar av objektet.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmarker, trädbärande betesmark, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, torrbackar, stenbunden mark, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, enbuskar, rötskadad sälk och pil

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130, 6230).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, jordtistel* NT, krypfloka EN, §, pipståkra VU, darrgräs* N, gulspärv* VU, §, törnskata* §, silversmygare* NT



ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beteshävd av nöt. Röjning av albuskar och av igenvuxna partier.



174. ÄDELLÖVSKOG VID OMSED

Naturvärdesklass: 3

Smärre lövskogsområde i jordbruksbygd. Skogen domineras av högvuxen medelåldrig gallringspåverkad bok och ask, med ett inslag av bland annat klibbal och skogslind. Enstaka grövre bokhögstubbar, rotvältor och lågor förekommer. I delar av objektet finns en rikare vegetation och flora, särskilt i partier med mycket ask. Många askar har dock dött och är nu torrträd, rotvältor eller lågor. Den totala mängden av död ved blir därför relativt hög. Det finns även smärre partier med aldominerad blandlövskog. Området utgör ett värdefullt lövskogsobjekt i ett annars dominerande jordbrukslandskap.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp

BIOTOPKVALITET

Grova bokar och askar, grova bokhögstubbar och grova boklågor, asktorrträd, asklågor, alsocklar, stenmurar, bryn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skogsalm* CR, underviol* S, kärrfibbla* S, blåsippa* S, skogslind* S, storrams* S, skogsbingel* N, spillkråka* N'T, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla träd och död ved.



175. LÖVSKOG VID PÄRUP

Naturvärdesklass: 3

Lövskogsområde i jordbruksbygd. Skogen domineras av högvuxen medelåldrig till äldre bokskog. Den är gallringspåverkad, men varsamt utförd, mer som plockhuggning. Skogen är därför mest flerskiktad och olikåldrig. Enstaka grövre bokhögstubbar och lågor förekommer i dessa delar. I andra delar av objektet finns en rikare vegetation och flora, särskilt partier med ask-alskog. Många askar har dött och är nu torrträd, rotvältor eller lågor. Det finns även smärre alkärr. Ett par smärre bäckar rinner också genom området. I den norra delen finns en trädbärande hagmark, som är välbetad, men där floran är relativt trivial. Några naturvårdsarter knutna till rikare ädellövskog och askskog påträffades. Lövskogsområdet utgör ett värdefullt skogsobjekt i ett annars dominerande jordbrukslandskap.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, klubbalkärr, ask-alskog, trädbärande betesmark, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Grova rötskadade bokar, grova bokhögstubbar och grova boklågor, asktorrträd, asklågor, alsocklar, periodvis rinnande vatten i bäckar, döda grova ektorrträd, stenvägar, hasselbuskar, gräsväl, solitära lövträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9020, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, kärrfibbla* S, desmeknopp NT, vanlig groda* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla träd och död ved. Undvik åtgärder kring bäckar.



176. BETESMARKER OCH ALSUMPSKOGAR VID KILLERÖD

Naturvärdesklass: 2


Stort mosaiklandskap av betesmarker och alskogar vid Killeröd. De betade markerna i den norra delen av objektet har generellt sett en mycket god hävdstatus och flora. På stora ytor breder välbetad grässvål ut sig på en stenbunden tuvig mark och med lågvuxen ljung som dominerande art. Det finns också stora ytor i den södra delen av objektet som är obetade och där igenväxning sker. Björksly etablerar sig där snabbt och gräset är högvuxet. Ljungen blommar där i en tillfällig älsklig fas. Få ytor med tydligt näringspåverkad vegetation i objektet, men då främst i den västra delen. Gott om fjärilar, bland annat svingelgräsfjäril en masse. Sammantaget ett mycket värdefullt objekt, som i de norra delarna gränsar till högsta naturvärde – klass 1.



Alsumpskog och alkärr är av olika ålder och tidigare skoglig påverkan, från ganska ung homogen skog till äldre alskog. Varierande inslag av död ved, men högstubbar och lågor påträffas mest sparsamt. Grova ädellövträd och lövträd förekommer också, särskilt i brynzoner mellan betesmark och alskog. Viss sockelbildning förekommer i vissa alskogar.



Silversmygare



Granspira





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr, igenväxande betesmark, enefäläd

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, asktorrträd, grova vidkroniga lövträd, dammar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, ask* EN, alm* CR, kärrfibbla* S, gullpudra* S, stor häxört* S, granspira NT, majnycklar NT, §, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd i de norra delarna. Återupptagen hävd på de igenväxande betesmarkerna i söder. Röjning av sly och putsning av igenvuxna partier.

177. BETESMARKER MELLAN ODERUP OCH TOLLSTORP

Naturvärdesklass: 2

Mosaiklandskap av huvudsakligen enefälader och alskogar samt betad lövskog. Öppna välbetade gräsmarker och fuktängar växlar med buskar, bryn, trädsolitärer och slutna skogspartier. Många blommande buskar av hagtorn och rosor samt väl utvecklade solexponerade bryn förekommer i stort sett i hela objektet. Rikligt med enbuskar på enefäladerna och där finns ofta väl utvecklad tuvad grässvål. De artrikaste och minst näringspåverkade markerna med lång beteshävd ligger söder om Tollstorp. Särskilt fuktängarna är värdefulla. I många fall finns här ett art- och blomrikt fältskikt. I andra delar av objektet kan näringspåverkan vara påtaglig, och fältskiktet mer artfattigt och trivialt. Alskogarna är mest medelåldriga och homogena, men inslag finns av äldre med viss sockelbildning och död ved. I eller i anslutning till sumpskogarna finns diken och partier med översilad källmark. Förekomst av ett flertal naturvårdsarter, främst kärlväxter och fjärilar. Troligen finns även en intressant svampflora. Totalt sett ett värdefullt objekt, inte minst på grund av sin storlek och mosaikartade struktur.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, torräng, frisk gräsmark, fuktäng, klubbaskog av översilningstyp, damm, stenmur, källmark

BIOTOPKVALITET

Grov vidkronig ek, gran och tall, gammal vidkronig björk, grova solexponerade granlågor, blomrika bryn med hagtorn, rosor och enbuskar, blomrika välbetade grässvålar, blockrik tuvig mark, översilad källmark, diken, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 6270, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, slättergubbe* VU, §, backtimjan* NT, jordtistel* NT, borsttåg* NT, majnycklar NT, §, ängsnycklar* §, ängsnattviol* NT, §, Sankt Pers nycklar* §, ängsstarr NT, jungfru Marie nycklar* §, jungfrulin* N, darrgräs* N, sotnätfjäril* NT, fläckig glansspinnare* NT, gulspurv* VU, stenskvätta* §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivande jordbruksbygd.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL


Bibehållen beteshävd, och återupptagen på igenväxta delar av de mellersta



178. ENEFÄLAD OCH ALSUMPSKOG VID ODERUP

Naturvärdesklass: 3

Mosaikobjekt av huvudsakligen enefälad och alskog. På enefäladen växlar smärre öppna gläntor med en omfattande förekomst av grova äldre enbuskar, ofta i större grupper tillsammans med rosor, slån och/eller fläder. Fältskiktets närings-påverkan är måttlig till påtaglig och florán är därför mest trivial. Hävdgynnade kärlväxter verkar till stor del ha försvunnit. Strukturen är dock i många stycken ännu värdefull, med i många fall en stenbunden tuvad mark med kortbetad grässvål. Det finns också många blommande buskar samt solexponerade gläntor och bryn. I de täta alskogarna är trädskiktet mest medelåldrigt och relativt homogent. Tendens till sockelbildning förekommer på olika platser. Mängden av död ved är begränsad. Enstaka naturvårdsarter noterades eller har rapporterats under senare år.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enfälad, klubbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Grova enbuskar, grov fläder, blommande buskar som slån, rosor och fläder, gläntor med välbetad grässvål, blockrik tuvig mark, rötskadade alar, alhögstubbar, allågor. översilad mark, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel NT, gulsparv* VU, §

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ogynnsam nuvarande hävdstatus. Omfattande röjningsinsatser behövs av enbuskar i de mest igenväxta delarna av betesmarken. Därefter behövs en utökad beteshävd i hela objektet.



179. SNIBERUPS FÄLAD

Naturvärdesklass: 1

Mosaiklandskap av huvudsakligen enefälader, men även alskogar och betad lövskog. Naturreservatet i västra delen utgörs av betad enefälad i svagt sluttande terräng. Här växlar öppna kortbetade torrbackar på smärre höjder med lägre liggande fuksänkors med högväxtvegetation. Detta område är gammal fäladsmark med en lång beteskontinuitet i stort sett utan påverkan från gödsling. Sniberups fäladsmark är en rest av gammal ljunghed. I de östra delarna, utanför reservatet, ökar näringspåverkan och hävdstatus är överlag inte lika gynnsam. Även i de östra delarna förekommer dock artrika gräsmarker. Där finns också gamla vidkroniga björkar och en spridd grupp av grova solitära granar och tallar. Många blommande buskar av hagtorn och rosor samt väl utvecklade solexponerade bryn förekommer i stort sett i hela objektet. Rikligt med enbuskar på enefäladen och väl utvecklad tuvad grässvål i betesmarkerna. Blomrika marker med backtimjan, rotfibbla och stenmåra. Alskogarna är mest medelåldriga och homogena. Det finns där diken och partier med översilad källmark samt om hagtorn. Totalt sett en mycket omfattande förekomst av naturvårdsarter från en rad olika organismgrupper. Särskilt kärlväxter, fjärilar och svampar är väl företrädda. Totalt sett ett mycket värdefullt objekt.



Plattsäv



Ljungfru Marie nycklar





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefålad, torräng, friska gräsmarker, fuktängar, klubbalskog av översilningstyp, dammar, stenmurar, källmark

BIOTOPKVALITET

Grov vidkronig ek, gran och tall, gammal vidkronig björk, grova solexponerade granlågor, blomrika bryn med hagtorn, rosor och enbuskar, blomrika välbetade grässvålar, blockrik tuvig mark, översilad källmark, diken, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 6270, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, slåttergubbe* VU, backtimjan* NT, jordtistel* NT, plattsäv* NT, borsståg* NT, loppstarr VU, granspira* NT, ängsstarr* NT, jungfru Marie nycklar* §, Sankt Pers nycklar §, jungfrulin* S, sotnätfjäril* NT, gulspurv* VU, §, göktyta* §, törnskata* §, stenskvätta* §, brandticka* NT, knoppvaxing* NT m.fl. arter.

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat, Natura 2000-område (delvis) / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Återupptagen på igenväxta delar av de mellersta avsnitten. Viss röjning av igenväxta delar av betesmarken.

180. BETESMARKER SÖDER OM KÖLLERÖD

Naturvärdesklass: 2

Högt beläget och lätt kuperat beteslandskap vid Kölleröd. De nötbetade markerna är mest ogödslade och välbetade med stenbunden tuvig enbuskmark med fin flora. I ytterkanten av objektet finns dock ytor med upphört bete och som växer igen med högt gräs. I terrängsvackor finns betade fuktängar med artrik flora och riklig förekomst av fjärilar. Beteshävderna verkar dock ha avtagit generellt under senare och uppslag av lövsly kan ses i olika delar av objektet. I objektet finns också ridåer av alar vid gamla diken. Spritt växer solitära blommande buskar och vidkroniga äldre lövträd av olika trädslag. Restaurering av igenvuxna delar har utförts under året, och stora högar av röjda enbuskar väntar på borttransport. Sammantaget ett mycket värdefullt mosaiklandskap av betesmarker, träddungar med grova träd och kulturlämningar som fågator.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova vidkroniga lövträd, blommande solitära buskar, enbuskar, våtmark

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, backtimjan* NT, granspira NT, darrgräs* N, gröngöling* NT, §, gulsparv* VU, §, trana* §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.



OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Fortsatta röjningsinsatser behövs.



181. BETESMARKER SÖDER OM GUMMARP

Naturvärdesklass: 1

Variationsrikt och småskaligt betes- och lövskogslandskap. De nötbetade gräsmarkerna är mest ogödslade och välbetade med stenbunden tuvig enbuskmark och en särdeles fin vegetation av kortvuxen ljung. I terrängsvackor finns betade fuktängar, också de med en fin flora. Det finns rikligt med fjärilar i dessa delar av objektet. Betesmarken tillhör toppskiktet i kommunen och de norra delarna kan bedömas ha högsta naturvärde. I objektet finns också betad alskog med viss sockelbildning och långsmala våtmarker med öppna kärr samt något näringspåverkade betesmarker i den södra delen. Dessa har klart lägre naturvärden än de norra delarna. Sammantaget är objektet ett värdefullt mosaiklandskap av betesmarker, alskog med små åkrar ingärdade av stenmurar.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad alskog, kärr, högörtäng, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, lågvuxen ljung, stenbunden mark, betade fuktängar, blockrik tuvig mark, enbuskmark, dammar, diken, stenmurar, rösen, alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, solitära lövträd, grov sälg

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, granspira* NT, ängsnattviol NT, §, ängsstarr NT, ask* EN, silversmygare* NT, violett kantad guldvinge NT, sotnätfjäril NT, mindre hackspett NT, §, gröngöling NT, §, spillkråka NT, §, stare VU, §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd i delar av objektet.



182. LÖVSKOGAR VID TOLLSTORP

Naturvärdesklass: 3

Mosaik av medelåldrig till äldre bok- och alskog med gläntor stadda i igenväxning av gräs och sly. Förutom al och bok är björk, ek och rönn vanliga trädslag. Även ask och lind är ställvis vanliga, och bildar partier av blandadellövskog. Markfuktigheten är överlag frisk, men fuktigare partier finns vid bäckar. Skogen är mest tät av unga uppväxande lövträd av bok och björk samt hasselbuskar. Sparsam till måttlig förekomst av död ved, dock mest som grova bokhögstubbar och lågor. Gallringspåverkad medelåldrig bokskog växer på flera platser och har lägre naturvärde än skogen i övrigt. Totalt sett förekomst av ett stort antal grova träd, främst av bok. Även förekomst av ett flertal naturvårdsarter knutna till lundar och alskogar. Betesmarkerna i norra delen är obetade och igenväxande eller betade, men relativt örtfattiga. Gott om klövvilt, till exempel kronhjort, och förekomst av häckande rovfågel. Lövskogsområdet utgör ett värdefullt skogsobjekt i ett jordbrukslandskap.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, klibbalskog av översilningstyp, hässle, trädbärande igenväxande betesmark, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Jätteträd av bok, grov klibbal, alsockel, grova rötskadade bokar, grova bokhögstubbar och grova boklågor, asktorrträd, asklågor, grov lind, periodvis rinnande vatten i bäckar, döda grova ektorrträd, stenmurar, hasselbuskar, gläntor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000): -

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, gullpudra* S, underviol* S, lundelm* S, lind* S, kransrams* S, myskmadra* S, stor häxört* S, vanlig groda* §



ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla träd och död ved. Undvik åtgärder kring bäckar.



183. ENEFÄLAD VID TOLLSTORP

Naturvärdesklass: 2

Enefälad på stenbunden tuvig mark. Hedartad vegetation med mycket ljung. I fältskiktet växer även arter som kruståtel, rotfibbla, blodrot och gråfibbla. Gott om enbuskar, björnbär och rosor, spridda björkar, någon ask, apel, klibbal och ek. Objektet verkar inte hävdas längre och växer igen med främst al och björk. Ännu finns en värdefull flora med rikliga förekomster av slättergubbe. Värdefullt objekt för olika organismgrupper, särskilt insekter och kärlväxter. Efter restaurering och därefter fortgående lämplig skötsel har objektet potential att nå högsta naturvärde.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad

BIOTOPKVALITET

Grässvål, stenbunden mark, låg näringspåverkan, blommande buskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, jordtistel* NT, grönvit nattviol §, storfibblemå* NT, gulspurv* VU, §, fläckig glansspinnare NT, skogslysing NT, ängsmetallvinge NT, silversmygare NT, violettekantad guldvinge NT, sotnätfjäril NT

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, ängs- och bete, ingår i riksintresse för naturvård



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bete, buskröjning och naturvårdsbränning. Stora och omedelbara behov.



184. BETESLANDSKAP VID TATTARP

Naturvärdesklass: 3

Variationsrikt betes- och lövskogslandskap vid Tattarp. De nötbetade markerna är mest näringspåverkade på frisk till fuktig mark med ofta med högt gräs eller fuktig högört i terrängsvackor, som dikats tidigare. Uppslag av lövsly kan också ses här och var. Men det finns också partier med välbetade ljungtuvor på stenbunden mark med fin flora, till exempel liten blåklocka, rödklöver och ängsvädd. Det finns inslag av grova ädellövträd med spärrgreniga trädkronor. I terrängsvackor finns betade fuktängar och högörtängar. Gamla kulturmarker med stenmurar och fägator.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, betad al- och bokskog, högörtäng, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor med högört, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova vidkroniga bokar och ekar, döende askar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6430, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, törnskata* §, buskskvätta NT, §, mindre bastardsvärmare NT, bredbrämad bastardsvärmare NT, ängsmetallvinge NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd.



185. BETESMARKER OCH BOKSKOG SÖDER OM HENSET

Naturvärdesklass: 2

Variationsrikt betes- och lövskogslandskap vid Henset. De nötbetade markerna är mest ogödslade och välbetade med stenbunden tuvig enbuskmark och en artrik flora. Det finns dock ytor som är igenvuxna med högt gräs. I terrängsvackor finns betade fuktängar och högörtängar med en riklig förekomst av fjärilar. Beteshävden verkar ha avtagit under senare år och uppslag av lövsly kan ses i olika delar av objektet. I objektet finns också betad alskog med viss sockelbildning och ridåer av alar vid gamla diken. Centralt i objektet finns bokbackar med mycket grova bokar, grova högstubbar, lågor och uppsprickande stammar. Fnöskticka förekommer rikligt på dessa stammar. Den mest välutvecklade delen av bokskogen är biotopskyddad. Sammantaget är objektet ett mycket värdefullt mosaiklandskap, gränsande till högsta naturvärde, av betesmarker, trädungar med grova träd och kulturlämningar.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad al- och bokskog, högörtäng, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor med högört, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, solitära lövträd, grova vidkroniga bokar, grova bokhögstubbar, grova boklågor, grov sålg



SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 6430, 9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, §, borsttåg* NT, ask* EN, silversmygare* NT, gröngöling* NT, §, gulsparr VU, §, buskskvätta NT, §, violett kantad guldvinge NT, sotnätfjäril NT, ängsmetallvinge NT, stenticka NT, sydlig sotticka VU

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (delvis av bokskogen) / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd.

186. MYRGÖLAR OCH BJÖRKSUMPSKOG VID SVARTEMOSSE

Naturvärdesklass: 3

Mosaikområde av lövskog, smärre våtmarker och dygölar. Mellan dessa finns fuktdråg. Medelåldrig björksumpskog dominerar skogsmarken. I anslutning till våtmarkerna blir vegetationen frodigare med ett tätt flerskiktat busk- och trädskikt. Inslag finns av viden, brakved m.m. Ljung, starr, sileshår, vitag, tranbär m.m. växer på stränder och små öar i den mest välutvecklade dygölen Svartemosse. I den sydöstra delen finns parti av lövsumpskogen med många döda björkar och björkhögstubbar. Mängden av död ved i övrigt är mer måttlig. Artrik trollsländefauna vid dygölarne. Egenartat objekt som med tiden kan utveckla ett högt naturvärde.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Björksumpskog, dygölar

BIOTOPKVALITETER

Öppna vattenspeglar, gungflyn, mjukmattor, döda björkar, lövlågor, björkhögstubbar, videbuskage

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7140, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, spillkråka NT, §, kronhjort* N, brun sikelvinge NT, silversmygare NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling



187. IGENVÄXANDE BETESMARK ÖSTER OM TOLLSTORP

Naturvärdesklass: 3

Långsträckt igenväxande betesmark mellan skog och åkrar. Beteshävdan har upphört under senare tid och högväxt turtåtel och veketåg dominerar nu fältskiktet. Uppslag av lövsly kan även ses i delar av objektet. Här och var växer dock ännu ljung och olika ris på stenbunden mark. Restpopulationer av naturvårdsarter påträffades även. Solitära björkar och granar finns spridda i objektet. Även rönn, hagtorn och enbuskar påträffas. Objekt stadd i förfall, men som troligen snabbt skulle kunna öka i naturvärde vid återinsatt beteshävd.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, björkhagmark

BIOTOPKVALITETER

Stenbunden mark, fuktsänkor med högört, diken, stenmurar, rösen, solitära björkar och granar, hagtorn, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, silversmygare* NT, sotnätfjäril NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återinsatt beteshävd.



188. BETESMARK VID HENSET

Naturvärdesklass: 3

Betesmarker, enefälader, alsumpskog och ädellövskog i ett småbrutet odlingslandskap. Betesmarken har karaktären av en stenbunden enefälad med representativ flora. Betesmarken i nordväst kan anses vara frisk till fuktig där arter som till exempel gökblomster, humleblomster, gåsört, kabbleka, bäckveronika, ältranunkel, gräsull, ängsbräsmå, kärrfibbla, gråfibbla, stenmåra och knapptåg förekommer. Strax söder om den nordvästra betesmarken finns ytterligare en betesmark men som nästan helt är igenväxt med bl.a. älggräs. I sydväst finns en betad enefälad med stundvis täta enebestånd. Här är marken relativt torr jämfört med de andra betesmarkerna. Arter som förekommer är bl. a. stenmåra, ärenpris, gråfibbla och slättergubbe. Den norra delen av objektet består av produktionsinriktad ädellövskog, med stor dominans av bok. Delar av skogen har nyligen avverkats och är idag föryngrad bokskog. I brynet mot betesmarkerna i väst finns en del äldre spärrgreniga träd och några torrakor. I sydöst finns en betad alsumpskog med bl.a. grönvit nattviol och kabbleka. Här finns också en öppen vattenspegel. Söder om landsvägen finns en rest av en enefälad, som är kraftigt igenväxt av framför allt björk. Väster om detta område finns en Alsumpskog där bl. a. kabbleka och topplösa förekommer. Den tidigare noterade bokskogen med pelarbok och torrakor, samt en alsumpskog öster om Henset kunde inte identifieras vid återinventeringen.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, öppen betesmark, alsumpskog,

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, tuvig mark, bitvis välbetad grässvål, stenmurar, björkhögstubbe, tickor, våtmark, död ved, torrträd, grov spärrgrenig tall



SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130)

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, stare VU, §.

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, Riksintresse naturvård, Fornminne (fornåker)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd, röjning av igenväxande partier i enefäladen, ingen konstgödning bör ske, undvik rationellt skogsbruk i sumpskogarna



189. BETESMARK ÖSTER OM HENSET

Naturvärdesklass: 3

Ett varierat och småbrutet äldre odlingslandskap. Inom objektet förekommer betad ädellövskog, alsumpskog, enefälad, våtmarker med öppna vattenspeglar och öppen betesmark. Floran är i stort sett representativ för de olika miljöerna. Längst i öster samt i sydväst förekommer viss näringspåverkan, i övrigt är näringspåverkan att betrakta som ringa. Betesmarkerna har goda förutsättningar för en särskilt rik flora då markfuktigheten varierar. Slåttergubbe har tidigare noterats. I nordväst finns det torrare partier där ett enebestånd förekommer. Några av enarna har förmodligen på grund av ett tungt snötäcke brutits och dött.

Strax söder om alsumpskogen finns tecken på näringspåverkan med ett tätt bestånd av brännässlor och en jätteloka. Inom objektet finns det en hel del stengårdsgårdar och odlingsrösen i varierande skick, samt en fågata. Längst i nordost finns en bokbacke med äldre och spärrgreniga bokar. Längst i väst finns en betesmark som var svagt betad vid återinventeringen med enstaka apel, druvfläder och en som buskskikt. Buskskiktet är glest men björksly växer fram. I den nordvästra delen av objektet finns en bokskog och några spärrgreniga ekar. Detta skogsparti omges i norr och öst av en glesare skog som är stundvis sumpig. Skogspartiet består av framför allt al och björk. Fältskiktet i bokskogen är nästintill obefintligt och i björk- och alskogen växer bl. a. blåbär och ett stort bestånd av bräken. Här finns även en öppen vattenspegel. Våtmarkerna hyser en riklig förekomst av sländor.

Fältskikt: gråfibbla, blodrot, kärtistel, kråkvicker, rotfibbla, stenmåra, ärenpris, gökärt, jordistel och gökblomster i de öppna betesmarkerna. Kärrfräken kring våtmarkerna och kråklöver, ängsull, tjärblomster, veketåg och knapptåg förekommer i ett fuktigt och magert parti i nordväst. I alsumpskogen finns arter som kabbleka, sjöfräken, ekorrbär och skogsbräken.



Kärfräken





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad lövskog, friska gräsmarker, fuktängar

BIOTOPKVALITET

Öppen betesmark, blockrik tuvig mark, stenmurar, rösen, fågata, stenbunden mark, högörtäng, våtmarker och dammar, blommande träd och buskar, grova vidkroniga lövträd, boklågor, bokhögstubbe, död ved, tickor,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT,

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna, främst sländor

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, Riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad betshävd, undvik rationellt skogsbruk i lövskogspartierna, undvik negativ hydrologisk påverkan, ingen konstgödning bör ske.

190. BETESMARKER OCH FUKTÄNGAR VID LÅNGARÖD

Naturvärdesklass: 2

Långsträckt betesmark med lite olika karaktär. Generellt välutvecklad öppen stenbunden tuvig ljungmark eller enbuskmark, men också öppna ytor i terrängsvackor med betade fuktängar. Ogödslad blomrik naturbetesmark med en artrik flora, bland annat kungsmynta och ängsvädd. Det finns även ädellövträd som vidkroniga askar. Ansamling av hävdgynnade naturvårdsarter. Ett mycket värdefullt objekt.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefålad, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark med lågvuxna ljungtuvor, betade fuktängar, diken, stenmurar, rösen, vidkroniga askar, asktorrträd, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, borsttåg* NT, ask* EN, silversmygare* NT, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av enbuskar, sly och putsning av igenvuxna partier.



191. ODLINGSLANDSKAP MELLAN INGEMANSTORP OCH LÅNGARÖD

Naturvärdesklass: 3

Större område med betesmarker och smärre alsumpskogar. Generellt sett en stenbunden tuvig mark med fuktängar i terrängsvackor. Vegetationen är dock tydligt näringspåverkad och i igenväxande. Källpåverkad ställvis översilad alsumpskog.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klubbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Grässvål, stenbunden mark, betade fuktängar, diken, stenvägar, rösen, enbuskar, källmark, översilning

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg NT

ARTRIKEDOM

Artfattigare än omgivande betesmarker, som har högt naturvärde.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd.



192. MYRGÖLAR OCH FUKTÄNGAR ÖSTER OM TORMASTORP

Naturvärdesklass: 2

Våtmarksmosaik som till stora delar nötbetas. Stor fuktig högörtäng i den centrala och betade östra delen med trampad tuvig mark. Kärrsilja dominerar, men artrik vegetation. Insektsrikt parti av objektet. I kantzoner av högörtängen finns högre beläget välbetade partier med lågvuxna ljungtuvor på stenbunden mark med rik flora. De västra delarna är källområden där utflöde av vatten sker i myrliknande gölar, som är relativt enhetliga starrbeväxta. Avrinningsvattnet leds i olika fuktdrag till högortsängen. Fuktdragen inramar dessutom en björkmosse. Variationsrikt och särpräglat objektet. Objektet nås bäst från den östra sidan, där anlagd passage finns genom stängslet in till betesmarken.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Högörtäng, fuktäng, enefälad, kärr, vattensamlingar, björkmosse

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, ogödslad mark, fuktsänkor, högörtvegetation, blockrik mark med lågvuxna ljungtuvor, diken, björk med bohål, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230, 6410, 6430).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, loppstarr VU, grönvit nattviol §, gröngöling* NT, §, sotnätfjäril NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och putsning av igenvuxna partier.



193. BETESMARKER VÄSTER OM INGEMANSTORP

Naturvärdesklass: 2

Betesmarker i svaga sluttningar och släntzoner med överlag välbetad grässvål och välutvecklad stenbunden mark. Friskare marktyp med en mycket örtrik vegetation, särskilt liten blåklocka dominerade eftertryckligt. Enstaka grova vidkroniga ädellövträd eller smärre dungar av sådana. Stora populationer finns av hävdgynnade naturvårdsarter. Ett värdefullt objekt.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, frisk gräsmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, blomrik mark, stenbunden mark, fuktsänkor, diken, stenmurar, damm, rösen, grov vidkronig bok, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, jordtistel* NT, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.



194. BETESMARKER SÖDER OM INGEMANSTORP

Naturvärdesklass: 3

Betesmarksobjekt med en varierande hävdstatus och flora. Tydligt näringspåverkad vegetation förekommer, mest i den östra delen, men det finns även kvar stora ytor i de centrala delarna av lågvuxna ljungtuvor på stenbunden mark med rik flora. Enstaka spridda buskar och lågvuxna yngre lövträd växer spritt i hagmarken. I den centrala delen växer också en hel del grova språrrgreniga ekar och döda och döende askar. Förekomst av ett par olikstora våtmarker i objektet.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefålad, ädellövskog, björkhage, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, stenmurar, damm, rösen, hagtorn, rönn, grova vidkroniga ekar, grov ask, asktorrträd, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN

ARTRIKEDOM

Ungefär lika artrik som omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.



195. HAMLADE LINDAR PÅ LÅNGARÖD KYRKOGÅRD

Naturvärdesklass: 3

Kyrkogård med förekomst av åtskilliga hamlade lindar. Många har stamhåligheter och flera noterades ha mulm i hålen. De flesta träd är äldre, men få är grova. Vid entrén växer några få äldre skogslönnar. Totalt sett artfattig epifytflora, men potential finns för intressant insektsfauna knuten till de rötskadade och ihåliga ädellövträden.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Kyrkogård med vårdträd

BIOTOPKVALITET

Grov skogslönn, grov lind, hamlade ädellövträd, stamhåligheter (hålträd), mulmträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynta natur- och skogstyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Guldlockmossa* S

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Skyddsvärda träd.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt vård av hamlade träd. Skapa förutsättningar för efterträdare. Lägg gärna nedtagna träd som solexponerad faunadepå.



196. FÄLAD SÖDER OM RUGERUP

Naturvärdesklass: 2

Stenbunden och öppen betesmark med representativ flora. I fältskiktet förekommer bl.a. slåttergubbe, gökärt, ängsbrämsa, gråfibbla, ärenpris och stenmåra. Tidigare noterade svinrot och vit blåkllocka observerades inte vid återinventeringen. Buskskiktet består av enar och centralt i betesmarken finns några äldre exemplar av björk och asp. I nordväst finns ett tätare bestånd av medelgrova bokar där även lågor förekommer. Viss näringspåverkan förekommer, mest märkbart i de västra delarna. I angränsande omgivning finns en brydesstuga.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefäläd

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, boklägor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270)

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd





197. SJÖKÖPSOMRÅDET

Naturvärdesklass: 2

Mosaiklandskap av öppna betade frodiga gräsmarker, våtmarker, en sjö och ädellövskog. I norr finns några välbetade stenbundna betesmarker av enefäladskaraktär med representativ flora. Betesmarkerna är något kuperade och i svackorna har vegetationen karaktären av fuktäng. I betesmarken påträffas bl.a. slättergubbe. Delområdet har ingen eller ringa gödselpåverkan. En del äldre ekar, boka och björkar förekommer, enarna är bitvis storvuxna och konformade. I den centrala delen av området finns det en bokdominerad ädellövskog som till största delen är produktionsinriktad.

I södra delen finns Sjököpssjön som dikades ut under senare delen av 1910-talet för torvtäkt, för att sedan under 1930-talet åter däckas upp. I dag är sjön till stor del igenväxt och mer mossebetonad med stora gungflyn, sjön utgör ett intressant exempel på en igenväxande sjö i ett urbergsområde. Fågel- och insektslivet är artrikt och sjön är viktig för den lokala faunan, samt ett estetiskt inslag i landskapsbilden. Vid sjön finns stora bestånd av kalmus. Inom området som helhet finns fyra olika lokaler med skogslysing.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark, myr / Äng, mosse, blandskog, bokskog av artfattig typ

BIOTOPKVALITET

Betad stenbunden tuvig mark, fuktängar, dammar, enbuskmarker, stenmurar, rösen, linbastu, fågata, grova solitära lövträd, apel, grov död lövved, klen död ved, boklåg, tickor, torrträd, spärrgrenig bok, bohål, diken, gungfly, öppen mosse, småvatten

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410, 5130, 4030)



NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, skogslysing* NT, grönvit nattviol* §, skogsduva* §, trana* §, gulsparv* VU, §,

ARTRIKEDOM

Bitvis artrikare än omgivningarna,

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inom utpekad strandskydd (mossen) / ArtData, ängs- och betesmark, sumpskog, fornminne (fornåker)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd, viss röjning av igenväxande hagmarksdelar, spar död ved, undvik rationell skogsskötsel i objektets lövskogar och ytterligare hydrologisk negativ påverkan på myren.





198. BETESMARKER, BOKBACKE OCH DRÅG VÄSTER OM ÖNNEKÖP

Naturvärdesklass: 2

Variationsrikt betes- och lövskogslandskap väster om Önnköping. De betade markerna i den västra och centrala delen av objektet varierar till sin hävdstatus och flora. Stora ytor har välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark, men det finns också enbuskmarker som är igenvuxna med högt gräs som kruståtel. Beteshävderna verkar där ha avtagit under senare år. Tydligt näringspåverkad vegetation finns på vissa ytor. Gott om fjärilar, bland annat svingelgräsfjäril och vitfläckad guldvinge.

I fällan med den igenväxande centralt belägna beteshagen finns en extraordinär bokbacke med mycket grova bokar, högstubbar, lågor, uppsprickande stammar. Här finns goda förutsättningar att hitta intressanta vedinsekter.

I skogsområdet längre österut växer en örtrik ask-alskog längs med ett långsträckt bäckdråg och gammalt dike. Den är flerskiktad och olikåldrig. Floran är artrik och flera naturvårdsarter förekommer. Inslag finns dessutom av död ved som asktorrträd och lågor. Viss alsockelbildning förekommer.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, bäckdråg, igenväxande enefälad, trädklädda betesmarker

BIOTOPKVALITET

Delvis välbetad grässvål, fuksänkor med högört, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, alhögstubbbar, alsocklar, alrotvältor, asktorrträd, askrotvältor, grova vidkroniga bokar, grova bokhögstubbbar, grova boklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270, 9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN, kärrfibbla* S, gullpudra* S, dvärghäxört* S, buskstjärnblomma* S, skärmstarr* S, rankstarr* S, kransrams* S, gytttrad taggsvamp* S, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom utpekad strandskydd / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd.





199. ALSUMPSKOG OCH BETESMARK NORR OM ÖNNEKÖP

Naturvärdesklass: 3

Betes- och lövskogslandskap norr om Önnköping. Mosaikartat objekt med varierande karaktär, men totalt sett förekomst av en hel del naturvårdsarter och värdefulla värdeelement.

De betade markerna i den nordöstra delen varierar till sin hävdstatus och flora. Vissa ytor har välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark, men det finns också stora ytor som är igenvuxna med älggräs, knapptåg och lövsly. Det verkar där som om beteshävdens minskat på senare år. Tydligt näringspåverkad vegetation överlag, men gott om blommande ängsvädd, och det finns småskaliga ytor av lågvuxen blommande ljung. Gott om fjärilar, bland annat svingelgräsfjäril.

Alsumpskog och alkärr av olika ålder och tidigare skoglig påverkan, från ganska ung homogen skog i öster till äldre olikåldrig askog längre västerut. Varierande inslag av död ved, men grova asklägor finns fläckvis. Grova ädellövträd och lövträd förekommer också, särskilt i brynzoner mellan betesmark och askog. Viss sockelbildning av klubbalk. I fuktigare partier nära (uttorkad) bäck växer också ask i sumpskogen. Värdefullt fågelliv.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalkskog av översilningstyp, klubbalkkärr, igenväxande ädellövskog, igenväxande betesmark

BIOTOPKVALITET

Delvis välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, hagtorn, solitära grova granar, alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, asktorrträd, askrotvältor, grova vidkroniga ekar, grov solitär gran, bäckar



SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN, lind* S, kärrfibbla* S, buskstjärnblomma* S, stor sotdyna* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och putsning av igenvuxna partier.



Stor sotdyna



Borsttåg

200. BETESMARKER VID ÖNNEKÖP

Naturvärdesklass: 2

Betesområdet varierar till sin hävdstatus och flora. Vissa ytor har mycket välbetad grässvål och välutvecklad stenbunden tuvig mark, men det finns också ytor som är igenvuxna med älggräs, knapptåg och uppväxande lövsly. Det verkar som om beteshävdens minskat generellt sett på senare år. Tydligt näringspåverkad vegetation förekommer, men det finns även kvar stora ytor i de centrala delarna av lågvuxna ljungtuvor på stenbunden mark med rik flora. I västra delen växer en hel del grova spärrgreniga ekar, grova döda och döende askar samt björkar med bohål. Det finns även savande ekar och olika träd med mulmhål. Stora populationer finns av hävdgynnade naturvårdsarter. Ett mycket värdefullt objekt.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, ädellövskogsmark, björkhage, igenväxande betesmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik mark med lågvuxna ljungtuvor, diken, stenmurar, damm, rösen, hagtorn, grova vidkroniga ekar, grov ask, asktorrträd, grova solexponerade eklågor, björk med bohål, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, jordtistel* NT, borsttåg* NT, ask* EN, lind* S, tät korallorangelav* VU, silversmygare* NT, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd. Rójning av sly och putsning av igenvuxna partier.



201. BETESMARK SÖDER OM FARHULT

Naturvärdesklass: 3

Betesmarker med enstaka partier med lövträd och enefälader i ett mosaikartat landskap. I fältskiktet förekommer bl.a. stagg, jordtistel, jordreva, gråfibbla, stenmåra, gåsört och gökärt. I buskskiktet förekommer framför allt enbuskar men även fläder och nypon. I den västra ädellövskogen förekommer ängskovall och en hel del sly i form av rönn och björk. Området runt skogspartiet visar tecken på näringspåverkan. Området söder om detta skogsparti hade växt igen med hundkåx och älggräs. I objektets nordöstra del finns en ekbacke med trivialt fältskikt. Stora ornitologiska värden.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, enefälad

BIOTOPKVALITET

Delvis välbetad grässvål, blockrik tuvig mark, fuktsänkor med högört, solitära träd, torrbackar, stenmurar, rösen, våtmark, grova enar, enefälad, dike, blommande träd och buskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030)

NATURVÅRDSARTER

Borståg NT, stagg* N, jordtistel* NT, slättergubbe VU

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, Fornminne fornåker

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Återupptagen hävd på igenväxande delar. Ingen spridning av konstgödning.



202. LÅNGEMOSSE

Naturvärdesklass: 3

Mosse bevuxet till stora delar av ung till medelåldrig björk med rik inblandning av gran och enstaka klibbal. Troligen tidigare en mosse där torvtäkt bedrevs. Förekomst även av öppna översilande dråg och stråk med kärrvegetation. Tuvull, tranbär, vattenklöver och olika starrarter dominerar i fältskiktet. Viss förekomst av död ved. Art- och individrik insektsfauna, bland annat av fjärilar och trollsländor. Mossen omges av djupa dyiga diken, som kan vara förrädiska att passera.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Våtmarkstyp/er: Mosse

BIOTOPKVALITET

Bäckdråg i laggen, öppen mosse, lövved, diken

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 2000-naturtyp (91D0).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade.

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationell skogsskötsel och en negativ hydrologisk påverkan.



203. LÖVSKOGAR VID FARHULT

Naturvärdesklass: 2

Relativt högvuxen alsumpskog i terrängsvacka med omgivande översilade källmarker. Tidigare gallringspåverkad skog, men viss olikåldrighet finns. Förutom klibbal finns även ask, bok, björk, gran och rönn i trädskiktet. En tidigare kanaliserad, men nu igenväxande, bäck korsar sumpskogen och fortsätter söderut förbi en bäckalskog med stora sockelbildningar och en hel del död ved till en högvuxen glesare och enskiktad allund med sparsam förekomst av död ved. Buskskikt med brakved, hägg, måbär och olvon. Värdefull flora. Vanliga arter i fåltskiktet är harsyra, kärrviol, älgört, humleblomster, ormbunkar, vitsippa, kärrsilja, strandklo och videört. Totalt sett ett variationsrikt område med olika karaktär. Högst naturvärde i den norra delen, i terrängsvackan.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, bäckdråg, källmark, översilning, lågor, alhögstubbar, askrotvälta, grov al, bäck, björkhögstubbar med fnösketickor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Bäckbräsmå* S, kärrfibbla* S, rankstarr* S, gullpudra* S, gulsippa* S, grönvit nattviol* §, buskstjärnblomma* S, alsidenmossa* N, dvärghäxört S, skogslysing NT, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Sumpskog



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationell skogsskötsel och en negativ hydrologisk påverkan.



204. FJÄRRMOSSEN

Naturvärdesklass: 3

En liten mosse med ett tätt trädskikt bestående av björk av klen dimension. Omgivande marker består i huvudsak av föryngrad bokskog med inslag av björk och gran. Mossen har varit utsatt för mycket torvtäkt, vilket har haft till följd att mossen varit väldigt våt. Tranbär, vitmossa, björnmossa och tuvull dominerar i fältskiktet. Även lingon, blåbär, rundsilesår, ängsull och ljung noterades. I omgivningen runt mossen förekommer bl. a. brakved, ängskovall, kruståtel, vårfryle och bunkestarr. Tidigare har skogslysingen och ängsvädd noterats.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Mosse

BIOTOPKVALITET

Delvis öppen mosse, lövved

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

Tranbär* N, brakved* N

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Nej

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan



205. NATURBETESMARK VID FARHULT

Naturvärdesklass: 3

Ett område som ur kulturhistorisk synvinkel är mycket intressant. Förekomsten av välbevarade gamla stengårdsgårdar, fågator och ruiner är stor. Landskapet är småbrutet och består av hävdade öppen hagmark och utmark av trivial typ, dock finns här arter som knägräs, granspira, blåtåtel och borsttåtel i fältskiktet. Området har fuktiga partier bevuxna med tåg. En del purror av ek, pil och rönn förekommer. I sydost finns en blockrik ljunghed som har röjts. Även en stenmursomgärdad restaurerbar enefäladsmark med rödven, stenmåra, ljung och lingon finns inom objektet i sydost. Trädsiktet består av bok, björk, enstaka granar och tallar. En del skogsmarker har slutavverkats.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Ljungmark, igenväxande fäladsmark, trädklädd betesmark,

BIOTOPKVALITET

Blockrik mark med lågvuxna ljungtuvor, delvis välbetad grässvål, fuktäng, grova vidkroniga bokar, bokhögstubbar, tickor, bohål, solitära träd, stenmurar, rösen, ruiner, fågator, våtmarker och dammar,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanligt objekt i kommunen. Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 6230, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Gröngöling* NT, §, ljung* N,

ARTRIKEDOM

Bitvis artrikt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Äng och betesmark



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling, bibehållen och helst utökad beteshävd, undvik näringstillförsel



206. FÄLADSMARK OCH RULLSTENSÅS VID STÄNKELÖSA BOSTÄLLE

Naturvärdesklass: 1

Mycket kuperade och örtrika hag- och fäladsmarker som utgör en värdefull rest av det gamla odlingslandskapet. I objektet har många arter som indikerar lång tid av bete och slätter noterats, t.ex. jungfrulin, slättergubbe, darrgräs, backtimjan och knägräs. Objektet är variationsrikt och innehåller i sänkorna fuktigare partier där arter som trivs på områden med fuktängskaraktär noterats, som t.ex. harstarr, loppstarr, gökblomster och luddtåtel. Vid återinventeringen noterades även åkerpilört, blåtåtel, kärrsilja och kråklöver. På de torra backarna är växtligheten mer av en karaktär som är typisk för en ljunghed och här växer också några enstaka tallar på den sandiga marken. I objektet finns ett antal lyckor som är omgärdade av fina gamla stengårdsgårdar. En del odlingsrösen förekommer. Objektet är mycket kuperat och igenom objektet går en grusås som antagligen är en gammal rest från istiden. Det rinner en meandrande bäck genom objektet där fisk förekommer. Längs med bäcken växer i huvudsak al. Näringspåverkan i objektet varierar men är att betrakta som ringa. I objektet finns några enstaka ekar, björk, rönn, säl, och en del al och asp vid bäcken. I väst finns en ekdunge med ek av klenare dimension som är belägen på en kulle. I objektet förekommer det även exemplar av grövre och spärrgrenig ek, till exempel i norr samt på en centralt belägen ekbacke. I skogspartiet i norr har ett bestånd av äldre ek frihuggits. Här förekommer också al- och björksumpskog och en bokskog. Buskskiktet i betesmarkerna består nästan enbart av en, björksly och purror av hassel. Arter som förekommer i fältskiktet förutom ovan nämnda är liten blåkllocka, vita blåkllockor, gråfibbla, gulmåra, stagg, prästkrage, svinrot, smällglim, höskallra, blåmunkar (monke), ängsvädd, blodrot, kråkvicker, ärenpris, brunört, borsttag och nysört. Det finns rikligt med fjärilar och andra insekter. Området är utdikad på vissa ställen.





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, småvatten, enefäläd,

BIOTOPKVALITET

Välbetad ogödslad grässvål, stenbunden mark, stenmurar, rösen, blockrik tuvig mark, högörtsängar, solitära träd, solexponering, död ved och lågor, torrträd, grövre spärrgrenig ek, torrbackar, fuksänkor, diken, lövsumpskog, hässle, rönn, rikt fjärilsliv

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 5130, 6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Slättergubbe* VU, darrgräs* N, backtimjan* NT, stagg* N, svinrot* N, höskallra* N, ängsvädd* N, blodrot* N, borsttåg* NT,

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, ingår i riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshäv, spara grov död ved, rötskadade och grova träd samt gamla träd i lövdungarna, röjning av björksly och utbredande enar.

207. ALSKOGAR OCH KÄLLMARKER VID JÖNSTORP

Naturvärdesklass: 2

Större sammanhängande objekt med källpåverkade översilade alsumpskogar och alkärr med bunkestarr, vilka knyts ihop med smärre bäckdalar med rännilar och bäckar. Stora ytor är översilad källmark med artrik flora. Vitsippa, gulplister, kirska, kabbleka och älgört är bland dominerande växter i fältskiktet. Hassel och benved i buskskiktet. Olikåldrig och flerskiktad lövskog med klibbal, björk, ask, rönn, bok och lind. Det finns en hel del död ved i form av lågor och torrträd. Inslag finns även av grova gamla träd, som jätteaskar. Liten sentida påverkan från ett rationellt skogsbruk. Allt sammantaget ger området ett naturskogsartat intryck.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Block, bäck, alsocklar, mossblock, lövlågor, asklågor, rotvältor, källmarker, översilning, ljusöppna gläntor, jätteträd (ask)

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Gulsippa* S, skärmstarr* S, kärrfibbla* S, bäckbräsm* S, ask* EN, rankstarr* S, lind* S, blåsippa* S, skogsbingel* S, gullpudra* S, guldlockmossa* S, alsidenmossa* N, klippfrullania S

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ett par sumpskogsobjekt är biotopskyddade / Nyckelbiotoper, sumpskog



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik körskador och annan påverkan som kan skada objektets hydrologi.



208. HAGMARKER VID JÖNSTORP

Naturvärdesklass: 2

Öppna trädbärande hagmarker i ett ålderdomligt böljande betesmarkslandskap. Välutvecklad grässvål, inslag av stenmurar och grova vidkroniga ädellövträd, som ek och bok, samt smärre alridåer i terrängsvackor. Hassel, en och hagtorn i buskskiktet. Vitsippsmattor i fältskiktet om våren. Värdefull häckfågelfauna.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Ekhage, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Grova ädellövträd, bäckdråg, blommande buskar, bäckar, rösen, stenmurar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Brun glada* NT, §, gröngöling* NT, §, buskskvätta* NT, §, stare* VU, §, gullpudra* S, bäckbräsmå* S, kärrfibbla* S, ask* EN, åkerrödtoppa NT

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Objekt med naturvärde, ängs- och bete, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete.



209. RIKKÄRR VID HEMMENEKÖP

Naturvärdesklass: 1

Öppet betat rikkärr med inslag av enstaka buskar och lågvuxna yngre solitära lövträd, mest björk. Värdefulla förekomster av kalkgynnade kärlväxter, brunmossor och snäckor i rikkärret. Mycket sällsynt och hotad naturtyp.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Rikkärr

BIOTOPKVALITET

Kalkpåverkan, översilning, solexponerad våtmark

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt och hotad naturtyp i kommunen samt Natura 2000-naturtyp (7160).

NATURVÅRDSARTER

Majviva* NT, kalkkärrgrynsnäcka NT, §, gräsull S, tätört N, darrgräs N, grönstarr N, småvänderot* N, smörbollar N, näbbstarr N, vildlin N, buskskvätta* NT, §

ARTRIKEDOM

Hög

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Inget utpekad, men rikkärr ingår i generellt biotopskydd i odlingslandskapet / ArtData, äng- och bete

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt extensivt bete, helst sent betespåsläpp.



210. VERKAÅN SÖDER OM HEMMENEKÖP

Naturvärdesklass: 3

Verkaån meandrar här genom ett varierat landskap, bl.a. bestående av bokskog, produktionsskog och alsumpskog. Inom objektet finns en äldre kvarndamm i dåligt skick och en del stengårdsgårdar och odlingsrösen. Borstsäv har noterats i objektet och andra arter som noterades vid återinventeringen var bl. a. kärrfibbla, rörflen, kabbleka, humleblomster, gökblomster, blekbalsamin, svärdsilja och stor vattenmåra. Delar av objektet gav ett intryck av att vara näringsbelastat där arter som brännässla och kåltistel dominerade fältskiktet. I sydväst finns en värdefull bokbacke. Objektet hyser klövvilt och ett rikt fågelliv. Objektet har även ett värde för landskapsbilden. Gemensamt intresse med Sjöbo kommun.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Vattendrag (å), översilning, döda träd, lövlågor, rotvältor, död ved, tickor, stenmurar, rösen, damm, stående vatten vid sidan om bäcken

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080)

NATURVÅRDSARTER

Kärrfibbla* S, borstsäv EN

ARTRIKEDOM

Måttligt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekad strandskydd / Riksintresse naturvård, tangerar nyckelbiotop bäckdal

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan och körskador



211. BETESMARK VID JÖNSTORP

Naturvärdesklass: 2

En stenbunden och kuperad betesmark som delvis har karaktären av enefälad. Floran är representativ där arter som t.ex. stenmåra, ärenpris, gråfibbla, grässtjärnblomma, brunört, gökärt och blodrot förekommer. En bäck rinner genom objektet och här växer grov och spärrgrenig ek och bok där en hel del rödlistade lavar, bl.a. rosa lundlav, dvärgbägarlav, bokvårtlav och liten respektive kortskaftad parasitspik har noterats. I de mer fuktiga partierna förekommer bl.a. gökblomster, humleblomster, knapptåg, kabbleka och vecketåg. Objektet är omgärdat av stengårdsgårdar och en del odlingsrösen förekommer också. En 1-3 meter hög rullstensås löper genom området, den är av stort geovetenskapligt värde eftersom isälvsmaterial är sällsynt i regionen. I nordöst finns en torrare backe med några exemplar av grova ädellövträd. Vissa delar av objektet är kvävepåverkat där täta men mindre bestånd av brännässlor tagit över. Många exemplar av grövre ek och bok förekommer och bör bevaras och hållas fria. Buskskitet består av enar, lågbevuxen hagtorn, nypon, hassel och alsly. Längs med bäcken och i de södra delarna av objektet växer alsly upp med inslag av björksly som bör tas bort.





DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, ädellövhagmark,

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, rösen, torrbackar, stenbunden mark, blockrik
tuvig mark, delvis välbetad grässvål, dike, hagtorn, grov
spärrgrenig bok, grov solexponerad bokhögstubbe, tickor,
hässle, grov spärrgrenig ek, lövlågor, solitära lövträd,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130, 4030, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Stenmåra* N, blodrot* N, liten parasitstek EN,
kortskaftad parasitstek VU, jordtistel NT, borsttåg NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Rökning av sly och putsning av
igenväxande partier.

212. HAGMARK VID TRULSHÄRAD

Naturvärdesklass: 1

Objektet utgörs av betesmarker i ett svagt kuperat odlingslandskap. I väster finns några hagmarker med bl.a. ärenpris, gråfibbla, stenmåra, gåsört och brunört. Viss näringspåverkan förekommer. I betesmarken finns en kulle med några grövre ädellövträd, samt en gödselpåverkad fuktäng. I öster finns en örtrik alsumpskog, som delvis växer på socklar och här har bl.a. bäckbräsmå, gullpudra och kärrfibbla noterats. Av dessa bekräftades kärrfibbla och andra noteringar var skogslysing, humleblomster och stinknäva. Genom objektet rinner en mindre bäck. Centralt finns en mer öppen betesmark där hävden varit otillräcklig. Älggräs samt högt gräs har börjat växa fram. Däremot förekom fortfarande arter som ärenpris, blodrot, golvial, kärringtand. Söder om denna öppna betesmark finns en betesmark av enefäladskaraktär med bl.a. slättergubbe, svinrot och borsttåg. Stora partier av enefäladen är igenvuxen med älggräs. I norra delen av enefäladen finns några björkar och grova ekar (brösthöjdsdiameter mer än 130 cm). Purror förekommer samt mindre partier med en och lite sly. Två stycken fågator leder in till enefäladen som är omgärdad av stengårdsgårdar. Inom objektet har man tidigare noterat flikig sköldlav och liten respektive kortskaftad parasitpik. Precis norr om objektet finns också en lokal med skogslysing.



DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Igenväxande enefälad, fuktdrag, bäckdrag, klubbalskog av översilningstyp,

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, fågator, rösen, lövtorrträd, björkhögstubbe, död ved, tickor, grov spärrgrenig bok, alsocklar,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410, 5130, 4030)

NATURVÅRDSARTER

Blodrot* N, svinrot* N, slättergubbe* VU, borsttåg* NT, skogslysing* NT,

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / ArtData, Ängs- och betesmark, nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd, röjning av sly och putsning av igenväxande partier, ingen konstgödning, undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan i sumpskog, spar gamla träd och död ved.



213. BETESMARK VID KAGARPS BOSTÄLLE

Naturvärdesklass: 2

Ett småbrutet äldre odlingslandskap i kuperad terräng. Betesmarker med representativ flora och bl.a. har knägräs, backtimjan, svinrot och borsttåg har noterats här. Vid återinventeringen noterades arter som borsttåg, brunört, gåsört, gökblomster, ängsvädd, kräklöver, humleblomster, orkideér, gråfibbla och slättergubbe. Söder om betesmarken finns en gammal och grov spärrgrenig ek av hagmarkstyp. Delar av betesmarken är mer fuktig och hyser arter som kabbleka, kärrfibbla, blekstarr, veketåg och knapptåg. Betesmarkerna i sydväst och nordost var de mest artrika och är enefälader. Centralt i objektet förekommer en helt öppen betesmark som var betydligt artfattigare. Här förekommer även en öppen vattenspegel. I södra delen av objektet löper ett fuktstråk som delvis domineras av al. Inslag av gran och pil finns också. Enbuskar, hassel, hagtorn, slån och nypon finns i buskskiktet. En del självföryngring av lövträd finns också. Genom fuktstråket rinner en mindre bäck. I de östra delarna av objektet förekommer en sumpskog med trivial flora, dock observerades en nattviol i angränsning mot betesmarken i norr. Kulturhistoriska spår i form av stenmurssystem, fågator och terrasserade gamla åkrar bidrar till objektets biologiska och kulturhistoriska värde. Inom objektet växer skogslysing.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalskog av översilningstyp, trädbärande hagmark,

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, rösen, stenbunden mark, tuvig mark, bitvis välbetad grässvål, bäckdråg, våtmark, grov vidkronig ek, solitära träd, hässle, blommande buskar, torrträd, död ved, rotvältor, lövlågor, högstubbar, torrbackar, högörtäng



SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070, 4030)

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, grönvit nattviol* §, ängsvädd* N, slättergubbe* VU, brunört* N, skogslysing* NT

ARTRIKEDOM

Bitvis artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / Ängs- och betesmark, skogsstyrelsen sumpskog och objekt av naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd i betesmarkerna. Röjning av sly i igenväxande partier. Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan i sumpskogen. Spar död ved och gamla träd. Vid behov brunnsröjning kring grova ekar.



Slåttergubbe



214. ALSKOGAR VID KAGARPS BOSTÄLLE NORRA

Naturvärdesklass: 2

Högvuxen alsumpskog, mest enskiktad på grund av tidigare gallringspåverkan. Rönnsk, ek, ask, björk och gran växer också i objektet. Åldern varierar från yngre till äldre partier av alskog, som överlag är hassel- och örtrik samt inrymmer många mossblock och genomkorsande källpåverkade bäckdråg. I fältskiktet noterades vitsippa, skogsfräken, älgört, svalört, skogsviol, kabbleka, hultbräken, gulplister, dvärgvårlök och brudborste. Totalt sett en stor och sammanhängande areal av alsumpskog med olika karaktär. Värdefullt objekt även om det finns en sentida skoglig påverkan.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, alhögstubbar med hackspethål, grov rötskadad ek, mossblock, källmark med översilning, bäckdråg, rännil, lövlågor, björkrotvälta, döda askar, grov askrotvälta

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Gullpudra* S, jungfru Marie nycklar* S, §, skärmstarr* S, gulsippa* S, kärrfibbla* S, ask* EN, bäckbrämsa* S, rankstarr* S, grönvit nattviol* §, vanlig groda* §

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekad / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationellt skogsbruk och negativ påverkan på hydrologi.



215. ÅLSKOGAR VID KAGARPS BOSTÄLLE SÖDRA

Naturvärdesklass: 2

Medelåldriga till gamla alkärr och översilade alsumpskogar omgivna främst av granplanteringar. I trädskiktet även gran, bok, skogslönn och björk. Ålskogarna hänger samman i ett nätverk. Kärrsilja, starrarter, kärrviol, vattenblink, vitsippa, kabbleka, kärrtistel, hultbräken, vitsippa, och harsyra kan nämnas i fältskiktet. På alsocklar skuggstjärnmossa och skogsbjörnmossa. Ofta rör det sig om stora sockelbildningar, särskilt i alkärren med stillastående vatten. Ställvis rikliga förekomster av död ved, som lövlågor och torrträd. Bitvis en artrik flora, men också partier med trivial vegetation.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klubbalskog av översilningstyp, klubbalkärr

BIOTOPKVALITET

Stora alsocklar, stillastående vatten, allhögstubbe med hackspetthål, stenmur, bäckdråg, mossblock, gamla alar, lövlågor, lövlågor, torrträd, asklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Bäckbräsmå* S, gullpudra* S, kärrfibbla* S, rankstarr* S, småvänderot* N, skogslysing NT

ARTRIKEDOM

Måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Alsumpskogen i den västra delen är biotopskyddad / Nyckelbiotop



ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationell skogsskötsel och negativ påverkan på hydrologi.



REFERENSER OCH LÄSTIPS

- ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015.
- Hallingbäck, T. (red.) 2013. Naturvårdsarter. ArtDatabanken SLU. Uppsala.
- Hörby kommun 2001. Naturvårdsplan för Hörby kommun
- Hörby kommun 2015. Miljömålsprogram för Hörby kommun
- Hörby kommun, 2016. Översiktsplan 2030, Mål, strategier och framtidsvisioner
- Hörby kommun, 2016. Översiktsplan 2030, 1.7 Natur- och kulturmiljö
- Hörby kommun, 2016. Översiktsplan, Bakgrund och nuläge, 3.2 Natur- och kulturmiljö
- Hellrup, E. 2014. Naturvärden i Hörby kommun. Natuvård - BIOR23, Lunds universitet
- Jordbruksverket, 2017, Rapport 2017:9. Ångs- och betesmarksinventeringen
- Lagercrantz, K. 2020. Landskapets betydelse - ELC och EST som inspiration för ett hållbart landskap
- Lunds Botaniska förening, 2003. Floran i Skåne, Vegetation och utflyktsmål
- Länsstyrelsen i Skåne län, 2014. Rapport 2014:9, Här finns höga naturvärden i Skåne.
- Länsstyrelsen i Skåne län, 2015. Rapport 2015:23, Vägarna till ett biologiskt rikare Skåne
- Länsstyrelsen i skåne län, 2016. Rapport 2016:10, Invasiva arter i Skåne i urval
- Länsstyrelsen i Skåne län, 2017. Rapport 2017:03, Kommunal ansvarsarter i Skåne
- Länsstyrelsen i Skåne län, 2017. Rapport 2017:11. Pärigräs och Ängabollar
- Länsstyrelsen i Skåne län, 2019. Rapport 2019:3. Handlingsplan för grön infrastruktur
- Länsstyrelsen i Skåne län & Skogsstyrelsen, 2019. Rapport 2019:21, Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län
- Malmqvist, A. 1999. Rödlistade lavar i Hörby och Höör kommuner
- Malmqvist, A. 2002. Inventering av vedlevande skalbaggar i Höör och Hörby kommuner, Naturcentrum AB.
- Naturvårdsverket, 1998. Rapport 4835. Biologisk mångfald i kulturlandskapet
- Risberg, J. 2015. Förändrad markanvändning, förändrad vegetation? Högskolan Kristianstad
- Skogsstyrelsen, 2000, Signalarter, Johan Nitare
- Skogsstyrelsen, 2020. Ett urval av naturvårdsarter och andra indikatorarter



- ArtDatabanken, www.artdatabanken.se
- Artportalen, www.artportalen.se
- Artfakta, www.artfakta.se/artbestamning
- Jordbruksverket, TUVÅ, www.jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/e-tjanster-och-databaser-stod/tuva
- Naturvårdsverket, Natura 2000 i Sverige, www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Skyddad-natur/Natura-2000
- Naturvårdsverket, Skyddad natur, www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/kartor/Kartverket-Skyddad-natur/
- Skogsstyrelsen. Skogens pärlor, www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
- Sländan - databas med foto, www.slandan.mixerdata.com/Modules/Home/main.php?disp=home_start
- Svensk standard SS 19900:2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. SIS Förlag AB, Stockholm
- Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Komplement till SS 19900. SIS Förlag AB, Stockholm

